

MINOX 5% TOPICAL SOLUTION (EXTRA STRENGTH)

Minoxidil (5%w/v)

Apakah Yang Ada Pada Risalah Ini

1. Apakah kegunaan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)
2. Bagaimana Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength).
4. Cara menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength).
5. Semasa menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength).
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength).
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah Kegunaan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Ia digunakan secara topical untuk rawatan corak kebotakan bagi kedua-dua lelaki dan perempuan.

Bagaimana Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) Berfungsi

Minoxidil, bahan aktif dalam Minox 5% Topical Solution (Extra Strength), merangsang pertumbuhan rambut dan melambatkan kadar perkembangan botak dengan membantu aliran darah ke sel-sel kulit kepala yang tumbuh rambut.

Sebelum Menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) jika anda:

- Mempunyai sejarah tindakbalas alahan kepada minoxidil, d-panthenol dan Propylene glycol.
- Mengandung atau menyusu.
- Di bawah umur 18 tahun atau lebih 65 tahun.

- Mengalami keguguran rambut dengan tiba-tiba atau tidak dapat dijelaskan.
- Kulit kepala anda adalah merah, radang, dijangkiti atau menyakitkan. Elakkan dari terkena mata anda.
- Jangan sapu pada bahagian-bahagian badan selain daripada kulit kepala. Produk ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja.
- Jangan menyedut kabus semburan.
- Jangan guna pada masa yang sama dengan persediaan topikal lain pada kawasan kulit kepala yang sama. Semburan rambut dan produk rambut biasa boleh digunakan selepas Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) telah digunakan.
- Tidak mempunyai sejarah kehilangan rambut dalam keluarga.

Sebelum menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Tanya doktor atau ahli farmasi

- Jika anda sedang menggunakan, baru selesai atau baru mula menggunakan ubat yang lain.
- Jika anda mempunyai masalah jantung atau sedang mengambil ubat untuk merawat tekanan darah tinggi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) dengan ubat untuk menurunkan tekanan darah tertentu boleh menyebabkan penurunan tekanan darah apabila berdiri.

Cara Menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa (18 hingga 65 tahun): Sembur satu dos (10 semburan atau 1ml) Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) pada kawasan botak atau keguguran rambut, dua kali sehari. Dos ini harus digunakan tanpa mengira saiz kawasan botak. Jangan melebihi dua dos (20 semburan atau 2ml) setiap hari.

Basuh tangan selepas guna.

Bila perlu digunakan

Dua kali sehari, sebaik-baiknya pada pagi dan malam.

Berapa lama perlu digunakan

Keberkesanan minoxidil hanya boleh dijangka selepas penggunaan berterusan selama 4 bulan atau lebih pada kawasan berkenaan. Permulaan dan tahap rangsangan pertumbuhan rambut berbeza di antara individu. Rawatan berterusan dengan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) diperlukan untuk menjaga rambut baru dan juga menghentikan kehilangan rambut tambahan. Selepas menghentikan rawatan, proses botak akan bermula sekali lagi.

Adalah penting untuk anda memahami bahawa Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) tidak bekerja dengan baik dalam semua orang, dan bagaimana ia berfungsi bergantung kepada beberapa perkara. Anda perlu berbincang apa hasil yang anda jangkakan dari rawatan dengan ahli farmasi atau doktor anda.

Jika anda bertindak balas kepada rawatan dengan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength), pertumbuhan semula pada mulanya mungkin lembut, rambut halus seperti bulu, dan tidak boleh dilihat. Selepas rawatan lanjut, kemungkinan besar pertumbuhan semula rambut anda akan berubah dan menjadi warna yang sama dan tebal sebagai seluruh rambut anda.

Hentikan penggunaan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) jika keadaan tidak berubah dalam tempoh satu tahun.

Jangan ubah dos Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) anda atau berhenti menggunakannya tanpa meminta nasihat daripada ahli farmasi atau doktor terlebih dahulu.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) dan sudah

MINOX 5% TOPICAL SOLUTION (EXTRA STRENGTH)

Minoxidil (5%w/v)

tiba masanya untuk menggunakan dos seterusnya, abaikan dos yang anda telah terlepas dan kembali ke jadual biasa anda. Jangan gunakan lebih daripada 1ml setiap aplikasi. Jangan gunakan lebih daripada dua kali sehari untuk menggantikan dos yang anda terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sila hubungi doktor dengan segera.

Semasa Menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Perkara yang perlu dilakukan

Pastikan kulit kepala dan rambut kering sepenuhnya. Gunakan hanya pada kulit yang sihat dan kukuh.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mencuci rambut atau basah kulit kepala sekurang-kurangnya 4 jam selepas aplikasi. Ia adalah dinasihatkan supaya berhenti menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) selama 24 jam sebelum membuat rawatan rambut lain seperti pewarnaan atau pengeritingan rambut.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) tidak sengaja terkena pada mata, membran mukus atau kulit terkikis, kawasan itu perlu dibilas dengan banyak air sejuk.
- Jika tidak sengaja tertelan, terus pergi ke hospital terdekat anda dengan produk tersebut. Sebahagian daripada tanda-tanda dan gejala yang mungkin berlaku adalah kadar jantung yang cepat, tekanan darah rendah, bengkak atau keadaan bengkak pada badan. Pengekalan air boleh diuruskan dengan terapi diuretik yang sesuai dan *tachycardia* boleh dikawal oleh pengambilan agen *beta-adrenergic agonist*.

Kesan-Kesan Sampingan

Semua ubat mempunyai kesan sampingan tetapi anda mungkin tidak

akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan termasuk kulit bersisik, kulit kering, *erythema* / kemerahan, dermatitis, sensasi kebakaran dan ruam. Jika anda tidak berasa sihat apabila menggunakan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength), rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers -> Reporting).

Cara Penyimpanan Dan Pelupusan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength)

Penyimpanan

Jauhkan Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) dari jangkauan kanak-kanak.

Simpan pada suhu bawah 30°C. Pastikan bekas tertutup rapat dan lindungi dari cahaya.

Pelupusan

Jangan gunakan apabila telah lepas tarikh luputnya.

Jangan buang ubat tersebut di dalam air atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Minox 5% Topical Solution (Extra Strength) adalah larutan yang tidak berwarna hingga sedikit keemasan.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Minoxidil

Bahan Tidak Aktif:

D-Panthenol, Propylene Glycol, dan Purified water.

Nombor MAL

MAL16025045AZ

Pengilang Dan Pemegang Pendaftaran Produk

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

07/04/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200319/393