

Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab

Azithromycin 500mg

Apakah Yang Ada Pada Risalah Ini

1. Apakah kegunaan Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab
2. Bagaimana ia berfungsi
3. Sebelum anda mengambil
4. Cara penggunaan
5. Semasa anda menggunakan
6. Kesan sampingan
7. Penyimpanan dan pelupusan
8. Deskripsi produk
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab

Ubat ini biasanya disyorkan untuk merawat:

- Jangkitan dada, tekak, telinga atau hidung seperti bronkitis, pneumonia, tonsillitis, faringitis, otitis media akut dan resdung
- Jangkitan kulit dan tisu lembut
- Penyakit seksual akibat Chlamydia, Haemophilus atau Gonorrhoea

Bagaimana ia berfungsi

Azithromycin tergolong dalam kumpulan antibiotik makrolida. Ia menghentikan pertumbuhan bakteria tertentu.

Sebelum anda mengambil

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda alah kepada antibiotik azithromycin, erythromycin, macrolide atau ketolide, atau mana-mana bahan dalam ubat ini.

Kehamilan dan penyusuan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusu sebelum mengambil sebarang ubat. Anda tidak boleh menggunakan ubat ini semasa mengandung atau menyusu, melainkan diberi oleh doktor.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai mana-mana yang berikut:

- Alahan kepada ubat-ubatan, makanan, pengawet atau pewarna
- Mengandung, merancang untuk hamil atau menyusu

- Masalah kesihatan, termasuk :
 - i. Masalah hati
 - ii. Masalah buah pinggang
 - iii. Masalah jantung
 - iv. Kencing manis
 - v. Intoleransi fruktosa yang berketurunan
 - vi. Masalah penyerapan glukosa-galaktosa atau kekurangan enzim saccharise-isomaltase

Mengambil ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi atau ubat herba. Adalah penting untuk dinyatakan sebelum mengambil mana-mana ubat ini:

- Antasid untuk senak perut. Ubat ini tidak boleh diambil bersama antasid.
- Digoxin untuk kegagalan jantung. Paras Digoxin mungkin meningkat. Doktor anda akan memeriksa paras darah anda.
- Derivatif ergot untuk migrain. Penggunaan serentak Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab dengan derivatif ergot tidak disyorkan.
- Warfarin atau ubat serupa untuk mencegah pembekuan darah. Penggunaan serentak boleh meningkatkan risiko pendarahan.
- Cyclosporin untuk menekan sistem imun. Jika penggunaan serentak diperlukan, doktor anda boleh menyesuaikan dos anda dengan sewajarnya.
- Theophylline untuk asma
- Nelfinavir untuk jangkitan HIV. Penggunaan serentak boleh meningkatkan kepekatan azithromycin.
- Ubat anti-aritmia untuk degupan jantung yang tidak teratur.

Cara penggunaan

Ikut semua arahan daripada doktor atau ahli farmasi anda dengan berhati-hati teliti. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada risalah ini, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak dan bila diambil

Dos biasa ialah 1 tablet sekali sehari dengan atau tanpa makanan. Jumlah dos maksimum yang disyorkan untuk sebarang rawatan ialah 1500mg. Doktor atau ahli farmasi anda akan menerangkan cara mengambil.

Ubat ini hanya boleh diberikan kepada kanak-kanak yang beratnya melebihi 45kg.

Berapa lama untuk mengambil

Doktor anda akan memberitahu anda berapa lama anda perlu mengambil tablet.

Jika anda terlupa mengambil

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Ambil tablet meja sebaik sahaja anda ingat.

Jika anda mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke hospital terdekat jika anda atau sesiapa sahaja mungkin terlebih mengambil ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaian atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa anda menggunakan

Perkara yang mesti anda lakukan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda sedang atau mungkin hamil, atau sedang menyusu semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini melainkan dinasihatkan oleh doktor. Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda. Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Tiada kajian dijalankan mengenai kesan azithromycin pada pemanduan atau penggunaan mesin. Walau bagaimanapun kemungkinan kesan yang tidak diinginkan seperti pening dan sawan perlu dipertimbangkan.

Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab

Azithromycin 500mg

Kesan sampingan yang mungkin

Seperti semua ubat, Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jampa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Kesan yang sangat biasa termasuk cirit-birit, sakit perut, loya, dan kembung perut (angin). Kesan sampingan yang biasa termasuk senak, pening, sakit kepala, rasa kesemutan atau tercucuk-cucuk, perubahan rasa, penglihatan yang tidak normal, kehilangan pendengaran, muntah, hilang selera makan, ruam, kegatalan, sakit sendi, keletihan, dan penurunan atau peningkatan dalam bilangan sel darah tertentu.

Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab boleh menyebabkan alahan yang teruk dan masalah kulit yang serius. Berhenti menggunakan Azithromycin Film-coated Tablets 500mg Lesvi Lab dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Jika anda mendapati bahawa kanak-kanak muntah dan/atau kerengsaan semasa menyusu, hubungi doktor dengan segera kerana ia mungkin disebabkan oleh Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis (IHPS).

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan di atas atau melihat kesan sampingan yang lain, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Penyimpanan dan pelupusan

Simpan pada suhu sederhana di bawah 30°C. Jauhkan ubat daripada kanak-kanak. Jangan ambil atau berikan ini ubat melepasi tarikh luput. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan bantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi produk

Mana rupanya

Tablet bersalut filem. Tablet bujur, biconvex, dijaringkan pada satu sisi dan dengan tulisan "500" di sebelah yang lain.

Bahan-bahan

Bahan aktif: Azithromycin 500mg

Bahan tidak aktif:

- Calcium hydrogen phosphate
- Croscarmellose sodium
- Sodium laurilsulfate
- Pregelatinised starch
- Magnesium stearate
- Purified water
- Opadry white

MAL number:

MAL15045057AZ

Pengilang

Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L.
Avda. Barcelona, 69
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Spain

Pemegang Pendaftaran Produk (Malaysia)

Ziwell Medical Sdn. Bhd.
Lot A2-14, PJ Industrial Park
Jalan Kemajuan, Section 13
46200 Petaling Jaya, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk (Singapore)

Ziwell Medical (S) Pte Ltd
1 Ubi Crescent
#05-03 Number One Building
Singapore 408563

Tarikh kemaskini RiMUP

29/09/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)231017/1160