

BURINEX[®] TABLET 1MG

Bumetanide (1mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Burinex[®] tablet
2. Bagaimana Burinex[®] tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Burinex[®] tablet
4. Cara menggunakan Burinex[®] tablet
5. Semasa menggunakan Burinex[®] tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Burinex[®] tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Burinex[®] tablet
Burinex[®] digunakan sebagai diuretik untuk rawatan edema dan / atau tekanan darah tinggi.

Bagaimana Burinex[®] tablet berfungsi

Bumetanide, bahan aktif dalam tablet Burinex[®] adalah diuretik (tablet air). Mereka membantu buah pinggang anda menghasilkan lebih banyak air kencing dalam jangka masa yang singkat. Ini membantu badan anda untuk membuang lebih banyak air dengan cepat.

Sebelum menggunakan Burinex[®] tablet

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan gunakan Burinex[®] jika:

- anda alah kepada bahan aktif atau satu atau lebih ramuan lain
- anda mengalami gangguan serius dalam keseimbangan cecair dan garam (gangguan elektrolit)
- anda mengalami kegagalan buah pinggang, di mana pengeluaran air kencing berhenti
- anda menghidap penyakit hati yang teruk
- anda mempunyai terlalu sedikit natrium dalam darah anda

Kehamilan

Kehamilan: Anda hanya boleh mengambil tablet Burinex[®] jika dinasihatkan oleh doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan Burinex[®] tablet

Sebelum mengambil tablet Burinex[®], beritahu doktor anda jika:

- anda alah kepada ubat untuk jangkitan saluran kencing (sulphonamides) atau diuretik (thiazides), kerana ada risiko anda juga alah pada tablet Burinex[®]
- anda pernah mengalami ruam kulit yang teruk atau kulit mengelupas, melepuh dan/atau luka mulut selepas mengambil Burinex[®] atau ubat yang mengandungi sulfonamida, seperti *loop diuretics*
- anda mempunyai gangguan metabolisme (porphyria)
- anda menghidap diabetes
- anda mempunyai gout, tablet Burinex[®] mungkin memburukkan keadaan ini
- anda mempunyai tekanan darah rendah
- anda mempunyai kecenderungan untuk jangkitan atau pendarahan disebabkan oleh penurunan jumlah darah putih dan platelet darah
- anda mengambil antibiotik (amino glikosida) atau mengambil ubat lain yang boleh mengganggu pendengaran anda
- awak mengandung

Semasa menjalani ujian darah dan air kencing, selalu maklumkan bahawa anda menerima rawatan dengan tablet Burinex[®].

Tablet mengandungi laktosa. Rujuk doktor anda sebelum mengambilnya, jika doktor anda memberitahu anda bahawa anda tidak boleh bertoleransi dengan jenis gula tertentu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk ubat

yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Tablet Burinex[®] dapat mengubah kesan ubat lain, sama seperti ubat lain dapat mengubah kesan tablet Burinex[®]. Hubungi doktor anda sekiranya anda mengambil:

- terapi digitalis (ubat untuk kegagalan jantung dan irama jantung yang tidak normal)
- garam litium
- antirheumatik bukan steroid

Cara menggunakan Burinex[®] tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mereka mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

Dewasa: ½-1 tablet (0.5-1 mg) setiap hari.

Kanak-kanak: Tablet Burinex[®] hanya boleh diberikan kepada kanak-kanak jika dinasihatkan oleh doktor.

Warga emas: Ikut arahan doktor.

Fungsi hati berkurang: Anda perlu menyesuaikan dos. Ikut arahan doktor.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Tablet Burinex[®] mesti diambil dengan segelas air.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil tablet Burinex[®] selama yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

BURINEX[®] TABLET 1MG

Bumetanide (1mg)

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Sekiranya anda terlupa mengambil tablet Burinex[®], jangan mengambil dos berganda, teruskan dengan dos biasa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Sekiranya anda mengambil terlalu banyak tablet Burinex[®], anda mungkin:

- mengalami peningkatan kencing
- mengalami kekurangan cecair
- mengalami dahaga dan kekeringan di mulut
- berasa lemah
- berasa lesu, mengantuk, kekeliruan
- mengalami gangguan pencernaan, kegelisahan, sakit otot dan kekejangan

Semasa menggunakan Burinex[®] tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil tablet Burinex[®].

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Reaksi kulit yang serius termasuk sindrom Stevens-Johnson dan *toxic*

epidermal necrolysis, telah dilaporkan berkaitan dengan rawatan Burinex[®]. Berhenti menggunakan Burinex[®] dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda melihat mana-mana simptom yang berkaitan dengan tindak balas kulit yang serius ini yang diterangkan dalam bahagian "Kesan Sampingan".

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan tablet Burinex[®] kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh mempengaruhi kemampuan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Sekiranya tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan segera hubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, tablet Burinex[®] boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Segera berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan setelah mengambil ubat ini. Beritahu doktor anda sekiranya anda mengetahui perkara berikut:

- kekejangan otot atau sakit
- ruam,
- ketidakselesaan perut

Berhenti menggunakan Burinex[®] dan dapatkan rawatan perubatan dengan

segera jika anda melihat mana-mana gejala berikut:

- Tompok kemerahan, tidak timbul, berbentuk sasaran atau bulat pada badan, sering dengan lepuh di bahagian tengah, pengelupasan kulit, ulser pada mulut, tekak, hidung, kemaluan dan mata. Ruam kulit yang serius ini boleh didahului oleh demam dan simptom seperti selesema (sindrom Stevens-Johnson, *toxic epidermal necrolysis*).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Burinex[®] tablet

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan di bawah 30 °C.

Jangan gunakan tablet Burinex[®] selepas tarikh luput, yang dicetak pada bungkusan.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet Burinex[®] adalah tablet rata bulat putih, dicetak di satu sisi dengan angka 133.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Bumetanide

BURINEX[®] TABLET 1MG

Bumetanide (1mg)

- Bahan tidak aktif
Agar; lactose monohydrate;
povidone; magnesium
stearate;
corn starch; polysorbate 80;
colloidal anhydrous silica
and talcum.

- Nombor MAL:
MAL19913216ACZ

Pengilang

allphamed PHARBIL
Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12 Göttingen,
Niedersachsen,
37081, Germany

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd
B-11-01, The Ascent, Paradigm, No.
1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

08/09/2025

Nombor Siri
NPRA (R1/1) 11112022/309