

BLOPRESS PLUS TABLET 16/12.5MG

Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide (16/12.5mg)

What is in this leaflet

1. Apakah kegunaan Blopress Plus
2. Bagaimana Blopress Plus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Blopress Plus
4. Cara menggunakan Blopress Plus
5. Semasa menggunakan Blopress Plus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Blopress Plus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Blopress Plus

Blopress Plus digunakan untuk merawat hipertensi (tekanan darah tinggi), jika monoterapi tidak cukup berkesan.

Bagaimana Blopress Plus berfungsi

Candesartan cilexetil ialah sejenis ubat yang digelar antagonis reseptor *angiotensin* II, dengan menyekat kesan hormon *angiotensin* II, salur darah akan mengendur dan ini akan menurunkan tekanan darah.

Hydrochlorothiazide tergolong dalam kelas ubat yang digelar diuretik. Kesannya akan menggalakkan penyingkiran natrium, klorida dan air melalui air kencing lalu menurunkan tekanan darah.

Sebelum menggunakan Blopress Plus

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah terhadap mana-mana bahan kandungan Blopress Plus atau terhadap ubat-ubatan terbitan sulfonamida.
- Jika anda hamil.
- Jika anda menyusukan anak

dengan susu badan.

- Jika anda menghidap penyakit hati yang teruk.
- Jika anda menghidap penyakit buah pinggang yang teruk.
- Jika anda menghidap gout.
- Jika anda menhidapi penyakit kencing manis atau masalah fungsi buah pinggang dan sedang dirawat dengan ubat tekanan darah tinggi yang mengandungi *aliskiren*.

- Sebelum mula menggunakan Blopress Plus

Sebelum anda mengambil Blopress Plus, beritahu doktor anda jika:

- Anda hamil atau merancang untuk hamil
- Anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda mempunyai masalah hati dan/atau kolestasis.
- Anda mempunyai hipokalemia refraktori dan hiperkalsemia.
- Anda menghidap gout.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain. Blopress Plus boleh menjejaskan cara ubat-ubatan lain berfungsi dan beberapa ubat-ubatan boleh memberi kesan kepada Blopress Plus.

Jika anda menggunakan ubat tertentu, doktor anda mungkin perlu melakukan ujian darah dari semasa ke semasa.

Khususnya, beritahu doktor anda jika anda menggunakan mana-mana ubat berikut:

- Perencat *ACE* atau *aliskiren*.
- Litium (ubat untuk masalah kesihatan mental).
- Ubat anti-radang bukan steroid (*NSAIDs*) (ubat untuk melegakan kesakitan dan keradangan).
- Antihipertensi.
- Suplemen kalium atau

pengganti garam yang mengandungi kalium (ubat yang meningkatkan jumlah kalium dalam darah anda).

Cara menggunakan Blopress Plus

- Berapa banyak harus digunakan

Dos ubat ini adalah satu tablet sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Diambil setiap hari sebelum atau selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Blopress Plus seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jangan berhenti mengambilnya tanpa berbincang dengan doctor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Ambil dos seterusnya seperti biasa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Anda mungkin mengalami tekanan darah rendah. Anda harus dibaringkan dengan kaki ditinggikan. Jika ini tidak mencukupi, tambahkan kandungan plasma anda, contohnya mengambil air isotonik atau ubat simpatomimetik.

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Semasa menggunakan Blopress Plus

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda jika anda rasa kesan Blopress Plus terlalu kuat atau terlalu lemah, atau tekanan darah anda tidak stabil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jika anda berhenti mengambil Blopress Plus, tekanan darah anda mungkin akan meningkat kembali.

BLOPRESS PLUS TABLET 16/12.5MG

Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide (16/12.5mg)

Oleh itu, jangan berhenti mengambil Blopess Plus tanpa arahan doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor anda jika anda akan menjalani pembedahan. Blopess Plus apabila digabungkan dengan sesetengah jenis bahan anestetik, mungkin akan merendahkan tekanan darah anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Blopess Plus boleh mendatangkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Jika anda mengalami mana-mana kesan ini, atau jika anda mendapat sebarang gejala yang tidak biasa atau tidak dijangka, bincang dengan doktor anda.

Kesan sampingan biasa mungkin termasuk:

- Jangkitan paru-paru
- Pening/vertigo
- Sakit kepala

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web

np.ra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Blopess Plus

- Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhkan Blopess Plus daripada capaian kanak-kanak.

- Cara pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Langkah-

langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Blopess Plus ialah tablet rata berbentuk bujur berwarna merah jambu muda dengan garisan skor dan bertanda 16|C pada kedua-dua belah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap tablet Blopess Plus mengandungi 16mg *candesartan cilexetil* dan 12.5mg *hydrochlorothiazide*.

- Bahan tidak aktif:

Carmellose calcium, hydroxypropyl cellulose, iron oxide red, lactose monohydrate, magnesium stearate, maize starch, polyethylene glycol dan purified water.

- Nombor MAL:

MAL08021476ACRZ

Pengilang

Delpharm Novara S.r.l.

Via Crosa, 86, 28065, Cerano (NO) Italy.

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH MALAYSIA SDN. BHD.

B-11-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/05/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/1) 5092022/269