

BLOPRESS PLUS TABLET 16/12.5MG

Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide (16/12.5mg)

What is in this leaflet

1. Apakah kegunaan Blopess Plus
2. Bagaimana Blopess Plus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Blopess Plus
4. Cara menggunakan Blopess Plus
5. Semasa menggunakan Blopess Plus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Blopess Plus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Blopess Plus

Blopess Plus digunakan untuk merawat hipertensi (tekanan darah tinggi), jika monoterapi tidak cukup berkesan.

Bagaimana Blopess Plus berfungsi

Candesartan cilexetil ialah sejenis ubat yang digelar antagonis reseptor *angiotensin II*, dengan menyekat kesan hormon *angiotensin II*, salur darah akan mengendur dan ini akan menurunkan tekanan darah.

Hydrochlorothiazide tergolong dalam kelas ubat yang digelar diuretik. Kesannya akan menggalakkan penyingkiran natrium, klorida dan air melalui air kencing lalu menurunkan tekanan darah.

Sebelum menggunakan Blopess Plus

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah terhadap mana-mana bahan kandungan Blopess Plus atau terhadap ubat-ubatan terbitan sulfonamida.
- Jika anda hamil.
- Jika anda menyusukan anak

dengan susu badan.

- Jika anda menghidap penyakit hati yang teruk.
- Jika anda menghidap penyakit buah pinggang yang teruk.
- Jika anda menghidap gout.
- Jika anda menhidapi penyakit kencing manis atau masalah fungsi buah pinggang dan sedang dirawat dengan ubat tekanan darah tinggi yang mengandungi *aliskiren*.

- Sebelum mula menggunakan Blopess Plus

Sebelum anda mengambil Blopess Plus, beritahu doktor anda jika:

- Anda hamil atau merancang untuk hamil
- Anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda mempunyai masalah hati dan/atau kolestasis.
- Anda mempunyai hipokalemia refraktori dan hiperkalsemia.
- Anda menghidap gout.
- Sila rujuk doktor anda sekiranya anda mengalami sakit perut, loya, muntah, atau cirit-birit selepas mengambil Blopess. Doktor anda akan menentukan rawatan selanjutnya. Jangan berhenti mengambil Blopess tanpa nasihat doctor.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain. Blopess Plus boleh menjejaskan cara ubat-ubatan lain berfungsi dan beberapa ubat-ubatan boleh memberi kesan kepada Blopess Plus.

Jika anda menggunakan ubat tertentu, doktor anda mungkin perlu melakukan ujian darah dari semasa ke semasa.

Khususnya, beritahu doktor anda jika anda menggunakan mana-mana ubat berikut:

- Perencat *ACE* atau *aliskiren*.
- Litium (ubat untuk masalah kesihatan mental).
- Ubat anti-radang bukan steroid (*NSAIDs*) (ubat untuk melegakan kesakitan dan

keradangan).

- Antihipertensi.
- Suplemen kalium atau pengganti garam yang mengandungi kalium (ubat yang meningkatkan jumlah kalium dalam darah anda).

Cara menggunakan Blopess Plus

- Berapa banyak harus digunakan

Dos ubat ini adalah satu tablet sekali sehari.

- Bila perlu digunakan

Diambil setiap hari sebelum atau selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Blopess Plus seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jangan berhenti mengambilnya tanpa berbincang dengan doctor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Ambil dos seterusnya seperti biasa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Anda mungkin mengalami tekanan darah rendah. Anda harus dibaringkan dengan kaki ditinggikan. Jika ini tidak mencukupi, tambahkan kandungan plasma anda, contohnya mengambil air isotonik atau ubat simpatomimetik. Hubungi doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin.

Semasa menggunakan Blopess Plus

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda jika anda rasa kesan Blopess Plus terlalu kuat atau terlalu lemah, atau tekanan darah anda tidak stabil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jika anda berhenti mengambil Blopess Plus, tekanan darah anda mungkin akan meningkat kembali.

BLOPRESS PLUS TABLET 16/12.5MG

Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide (16/12.5mg)

Oleh itu, jangan berhenti mengambil Blopess Plus tanpa arahan doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor anda jika anda akan menjalani pembedahan. Blopess Plus apabila digabungkan dengan sesetengah jenis bahan anestetik, mungkin akan merendahkan tekanan darah anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Blopess Plus boleh mendatangkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Jika anda mengalami mana-mana kesan ini, atau jika anda mendapat sebarang gejala yang tidak biasa atau tidak dijangka, bincang dengan doktor anda.

Kesan sampingan biasa mungkin termasuk:

- Jangkitan paru-paru
- Pening/vertigo
- Sakit kepala

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku mungkin termasuk:

- Angioedema usus – pembengkakan pada saluran usus yang mungkin disertai dengan simptom seperti sakit perut, loya, muntah, dan cirit-birit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Blopess Plus

- Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhkan Blopess Plus daripada capaian kanak-kanak.

- Cara pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk Blopess Plus ialah tablet rata berbentuk bujur berwarna merah jambu muda dengan garisan skor dan bertanda 16|C pada kedua-dua belah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap tablet Blopess Plus mengandungi 16mg *candesartan cilexetil* dan 12.5mg *hydrochlorothiazide*.

- Bahan tidak aktif:

Carmellose, calcium, hydroxypropyl cellulose, iron oxide red, lactose monohydrate, magnesium stearate, maize starch, polyethylene glycol dan purified water.

- Nombor MAL:

MAL08021476ACRZ

Pengilang

Delpharm Novara S.r.l.

Via Crosa, 86, 28065, Cerano (NO) Italy.

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH MALAYSIA SDN. BHD.

B-11-01, The Ascent, Paradigm, No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

30/12/2025

Nombor Siri

NPRA (R1/1) 5092022/269