

FUCIDIN® CREAM

Fusidic acid (20 mg/g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fucidin® Cream
2. Bagaimana Fucidin® Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fucidin® Cream
4. Cara menggunakan Fucidin® Cream
5. Semasa menggunakan Fucidin® Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fucidin® Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Fucidin® Cream

Fucidin® Cream digunakan untuk merawat kulit yang dijangkiti kuman (bakteria), seperti:

- “Impetigo” (tompok kulit yang renggang, berkerak dan bengkak)
- Jangkitan Dermatitis (keradangan kulit) dan bintik-bintik
- Jangkitan pada Kawasan pemotongan
- Doktor anda mungkin bagi ubat ini untuk sebab lain. Tanya doktor anda jika anda tidak pasti sebab ubat ini telah dipreskripsi untuk anda.

Bagaimana Fucidin® Cream berfungsi

Fucidin® Cream mengandungi asid Fusidik. Ia adalah jenis antibiotik.

Fucidin® Cream berfungsi dengan membunuh kuman (bakteria) yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil Fucidin® Cream

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Fucidin® Cream

- Jika anda alah (hipersensitif) terhadap mana-mana bahan lain dalam ubat anda.
- Jika anda mempunyai jangkitan yang disebabkan oleh organisma yang tidak mudah terdedah.

Kehamilan dan penyusuan

Sekiranya anda hamil atau menyusu, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk mempunyai bayi, tanya doktor anda atau ahli farmasi untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan ubat ini. Beritahu doktor anda jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Anda tidak boleh menggunakan ubat ini untuk jangka lama atau dalam jumlah yang besar.

- Sebelum mula mengambil

- Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap apa-apa ubat, makanan atau pengawet lain.
- Beritahu doktor anda jika anda merancang untuk hamil atau menyusu.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain atau menggunakan persediaan topikal lain (termasuk ubat sendiri).

Fucidin® Cream adalah penyediaan siap sedia dan oleh itu, jangan bercampur dengan ramuan atau persediaan lain.

Cara menggunakan Fucidin® Cream

Sentiasa gunakan Fucidin® Cream seperti yang dinasihat oleh doktor anda. Anda perlu merujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Ubat ini hanya untuk digunakan pada kulit anda. Jangan menelannya. Jangan letakkan di dalam badan anda.

Keluarkan penutup. Periksa dan memastikan meterai tidak rosak terlebih dahulu sebelum menggunakan krim. Kemudian tolak bahagian tajam pada penutup terhadap meterai pada tiub.

Sentiasa cuci tangan sebelum menggunakan Fucidin® Cream. Gosok ubat ini perlahan-lahan pada kulit. Jika anda menggunakannya pada muka anda, berhati-hati untuk mengelakkan mata anda.

Jika anda bukan menggunakan krim untuk merawat tangan anda, sentiasa basuh tangan anda selepas menggunakan Fucidin® Cream.

Jika ubat ini terkena mata anda secara tidak sengaja, basuh dengan air sejuk dengan segera. Kemudian bersihkan mata anda dengan air cuci mata jika boleh. Mata anda mungkin akan berasa menyengat. Jika anda mula mengalami sebarang masalah penglihatan atau mata anda sakit, hubungi doktor anda dengan serta-merta.

- Berapa banyak harus digunakan

Fucidin® Cream digunakan pada kawasan yang terjejas 2-3 kali sehari, secara amnya selama 7 hari, kecuali dalam rawatan jerawat di mana terapi perlu dilanjutkan untuk tempoh yang lebih lama mengikut sifat penyakit ini.

- Bila perlu digunakan

Kebiasaannya, guna ubat ini dua hingga tiga kali sehari.

FUCIDIN® CREAM

Fusidic acid (20 mg/g)

- Berapa lama perlu digunakan

Secara amnya, Fucidin® Cream digunakan pada kawasan yang terjejas untuk tempoh 7 hari, kecuali dalam rawatan jerawat di mana terapi perlu dilanjutkan untuk tempoh yang lebih lama mengikut jenis penyakit.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa menggunakan ubat ini, gunakannya sebaik sahaja anda teringat. Kemudian menggunakan ubat ini mengikut masa yang biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda menggunakan krim secara berlebihan atau tertelan sedikit krim secara tidak sengaja, ia tidak mungkin menyebabkan sebarang bahaya. Jika tertelan kuantiti krim yang banyak secara tidak sengaja atau anda risau, sila hubungi doktor, ahli farmasi atau Jabatan Kemasukan dan Kecemasan untuk mendapatkan nasihat.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, sila merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Fucidin® Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Fucidin® Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan berikan Fucidin® Cream kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Fucidin® Cream adalah penyediaan siap sedia dan oleh itu, jangan bercampur dengan ramuan atau persediaan lain.

Kesan-kesan sampingan

Fucidin® Cream disahkan mempunyai toleransi yang bagus dan kekerapan tindak balas hipersensitiviti yang sangat rendah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan Fucidin® Cream

- Penyimpanan

- Simpan ubat ini daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.
- Jangan gunakan Fucidin® Cream selepas tarikh luput yang dinyatakan pada kotak.

Tarikh luput adalah tarikh yang terakhir dalam bulan itu.

- Jangan simpan pada suhu 30°C ke atas.

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak digunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- Fucidin® Cream ialah krim putih.
- Fucidin® Cream terdapat dalam tiub 5g dan 15g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Fusidic acid (20 mg/g)

- Bahan tidak aktif

- Butylhydroxyanisole
- Cetyl alcohol
- Glycerol
- Liquid paraffin
- Potassium sorbate
- Polysorbate 60
- White soft paraffin
- Purified water

Anda boleh mendapatkan maklumat penting mengenai beberapa bahan dalam ubat anda di bahagian "Sebelum anda menggunakannya" risalah ini.

- Nombor MAL:

MAL19913374AZ

FUCIDIN® CREAM

Fusidic acid (20 mg/g)

Pengilang

LEO Pharmaceutical Products A/S
Limited
Industriparken 55
DK-2750, Ballerup
Denmark

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd
B-11-01, The Ascent, Paradigm
No.1, Jalan SS 7/26A, Kelana Jaya
Petaling Jaya Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

12/04/2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)100419/00087