

Apakah kandungan risalah ini

1. Apakah kegunaan MUCOSOLVAN 24 Hours
2. Bagaimana MUCOSOLVAN 24 Hours berfungsi
3. Sebelum menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours
4. Cara menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours
5. Semasa menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MUCOSOLVAN 24 Hours
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MUCOSOLVAN 24 Hours

MUCOSOLVAN 24 Hours mengandungi sejenis *expectorant* yang digunakan untuk menipiskan mukus (kahak) yang hadir dalam penyakit bronkial dan paru-paru yang akut dan kronik, di mana kahak yang tebal dan degil menimbulkan masalah.

Bagaimana MUCOSOLVAN 24 Hours berfungsi

MUCOSOLVAN mengandungi ambroxol yang mencairkan kahak, mengaktifkan silia untuk mempercepat pengeluaran kahak, dan merangsang penghasilan cecair (*surfactant*), yang melindungi paru-paru.

Sebelum menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours

- Bila tidak boleh menggunakan:

Jika anda alah (hipersensitif) terhadap *ambroxol hydrochloride* atau sebarang kandungan di dalam Mucosolvan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda mempunyai alahan, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Anda tidak harus guna Mucosolvan selepas TARIKH LUPUT yang tercetak di atas kotak bungkusannya.

Dalam beberapa kes, penyakit kulit yang serius telah dilaporkan selepas penggunaan ubat *mucolytic* (contoh: *ambroxol hydrochloride*). Justeru itu, jika luka baru dikesan pada kulit atau lapisan mukosa, sila dapatkan nasihat pakar perubatan segera dan hentikan rawatan dengan *ambroxol hydrochloride* sebagai langkah berjaga-jaga.

Jika anda mengalami masalah buah pinggang, sila dapatkan nasihat doktor sebelum mengambil ubat ini.

Dalam beberapa jenis penyakit paru-paru yang jarang berlaku dimana ia berkaitan dengan pengumpulan rembesan (contohnya *primary ciliary dyskinesia*), MUCOSOLVAN 24 Hours hanya boleh digunakan di bawah pengawasan pakar perubatan kerana risiko pengumpulan rembesan mungkin berlaku.

• Kehamilan

Penggunaan Mucosolvan pada trimester pertama adalah tidak digalakkan.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda hamil, atau mungkin akan hamil semasa jangka rawatan anda.

• Penyusuan bayi

Ibu yang sedang menyusukan bayi tidak digalakkan untuk mengambil Mucosolvan. Minta nasihat doktor anda jika anda sedang menyusukan bayi, atau mungkin menyusu semasa jangka rawatan anda.

Manfaat Mucosolvan perlu dinilai terhadap kesan yang mungkin dialami anak anda.

• Kesuburan

Kajian menggunakan haiwan tidak menemui sebarang bukti yang

menunjukkan kesan buruk ke atas kesuburan.

- Sebelum anda mengambilnya

Sebelum mengambil Mucosolvan, anda mesti memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai, atau telah mengalami mana-mana daripada keadaan berikut:

- Masalah hati,
- Masalah buah pinggang.

Jika anda tidak pasti dengan sama ada anda mengalami atau pernah mengalami mana-mana masalah tersebut, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Sebelum mengambil Mucosolvan, adalah mustahak anda memberitahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda sedang mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang diperolehi dengan atau tanpa preskripsi doktor.

Mucosolvan boleh meningkatkan kesan penembusan antibiotik. Antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan. Mucosolvan boleh menyebabkan pengumpulan mukus jika diambil bersama ubat penahan batuk, terutamanya bagi pesakit yang mempunyai masalah paru-paru.

Cara menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours

- Berapa banyak perlu diambil

Selalu mengambil ubat ini mengikut arahan sepertimana yang tercatat atas risalah produk. Tanya doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda kurang pasti.

Sukatan dos yang dicadangkan untuk orang dewasa dan remaja atas umur 12 tahun adalah 1 kapsul sehari.

Kapsul ini tidak boleh dibuka atau dikunyah, ia harus ditelan dengan air yang banyak.

"Pelet peletus" yang kadang-kadang hadir dalam najis telah mengeluarkan bahan aktif semasa melalui sistem

MUCOSOLVAN® 24 Hours

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Ambroxol hydrochloride (75mg)

pencernaan dan oleh itu tidak mempunyai kepentingan. Mucosolvan boleh diambil bersama atau tanpa makanan

- Bila perlu mengambilnya

Ambil seperti mana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu mengambilnya

Anda perlu rujuk pada doktor sekiranya anda rasa lebih teruk atau tidak rasa lebih sihat selepas 4 – 5 hari.

Jika anda terasa kesan MUCOSOLVAN 24 Hours terlalu kuat atau lemah, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda berhenti rawatan sebelum tempoh tamat, gejala penyakit anda mungkin menjadi lebih teruk.

- Jika terlupa mengambilnya

Jika anda terlupa mengambil MUCOSOLVAN 24 Hours atau mengambil dos tidak cukup, tunggu sehingga waktu mengambil dos yang berikutnya dan teruskan pengambilan MUCOSOLVAN 24 Hours mengikut arahan pengambilan yang dijelaskan di atas.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan nasihat perubatan segera sekiranya anda mengambil dos yang berlebihan seperti yang dicadangkan untuk Mucosolvan.

Anda mungkin memerlukan rawatan gejala yang dialami.

Semasa menggunakan MUCOSOLVAN 24 Hours

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang telah diarahkan oleh doktor.

Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil MUCOSOLVAN 24 Hours.

Beritahu doktor anda dengan serta-merta jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak harus dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali atas nasihat doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa merujuk kepada doktor anda.

Jangan berikan MUCOSOLVAN 24 Hours kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau penyakit yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu kereta dan pengendalian mesin

Tiada bukti yang menunjukkan MUCOSOLVAN 24 Hours mempunyai kesan ke atas keupayaan memandu kereta dan pengendalian mesin.

Kesan-kesan sampingan

Anda harus sedar bahawa semua ubat mungkin membawa risiko, serta semua risiko yang mungkin berlaku tidak dapat dikenalpasti pada peringkat ini sungguhpun ujian yang teliti dijalankan.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan tentang kesan-kesan sampingan mengambil Mucosolvan.

Sekali-sekala, MUCOSOLVAN 24 Hours mengakibatkan kesan sampingan yang ringan seperti :

- Loya,
- Cirit-birit,
- Dispepsia (contoh senak, rasa kembung di perut)
- Muntah

➤ Sakit perut

Keadaan alahan (hipersensitif) pernah berlaku dengan pengambilan Mucosolvan. Gejala alahan yang mungkin berlaku termasuk:

- Ruam
- Gatal
- Gegata atau Urtikaria
- Kejutan anafilaksis (*Anaphylactic shock*)
- Pembengkakan di bawah kulit

Apabila anda mengesan tanda pertama alahan, berhenti mengambil MUCOSOLVAN 24 Hours.

MUCOSOLVAN 24 Hours boleh menyebabkan alahan teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti mengambil MUCOSOLVAN 24 Hours dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang simptom berikut:

- Alergi yang teruk: kesukaran bernafas, pening, pembengkakan kulit atau ruam
- Reaksi kulit yang teruk: kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan semasa atau selepas mengambil Mucosolvan, agar gejala tersebut mendapat rawatan yang wajar.

Di samping itu, kesan yang tidak dijangka, yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada mana-mana ubat yang lain.

Anda harus memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda memerhatikan kesan yang luar biasa semasa atau selepas pengambilan Mucosolvan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web

MUCOSOLVAN® 24 Hours

Consumer Medication Information Leaflet (RiMUP)

Ambroxol hydrochloride (75mg)

nppra.gov.my [Consumers →
Reporting Side Effects to Medicines
(ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MUCOSOLVAN 24 Hours

- Penyimpanan

Mucosolvan harus disimpan di tempat yang kering dan suhunya kekal di bawah 30°C.

Jauhi ubat ini daripada jangkauan kanak-kanak.

Sila rujuk kepada informasi yang tercetak atas pek untuk maklumat tentang jangka hayat ubat ini.

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui sistem air kumbahan atau sisa buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul keras bujur yang terdiri daripada penutup yang berwarna merah legap dan sarung yang berwarna oren legap; penutupnya dicetak dengan ungkapan 'MUC 01' yang berwarna putih.

Kandungan kapsul:

Pelet bulat, berwarna kuning-putih dengan permukaan yang licin berkilat, dicampurkan dengan kuantiti serbuk yang kecil.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap kapsul mengandungi 75mg
ambroxol hydrochloride.

- Bahan-bahan tidak aktif

MUCOSOLVAN 24 Hours juga mengandungi:

Kandungan kapsul :

Crospovidone, carnauba wax, stearyl alcohol, magnesium stearate

Sarung kapsul :

Gelatin, air yang ditapis, titanium dioxide (E 171), iron oxides (E 172)

Cetakan atas kapsul :

Shellac, titanium dioxide (E 171)

- Nombor MAL:

MAL07050193XCR

Pengilang

Sanofi Winthrop Industrie
196 Rue du Maréchal Juin
45200 Amilly
France

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd
B-11-01, The Ascent, Paradigm,
No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana
Jaya, 47301 Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

30/09/2025 (Berdasarkan German PIL Mac 2020)

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230823/1128