

DULCOLAX TABLET®

Bisacodyl (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

Apa yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan DULCOLAX Tablet
2. Bagaimana DULCOLAX Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan DULCOLAX Tablet
4. Cara menggunakan DULCOLAX Tablet
5. Semasa menggunakan DULCOLAX Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DULCOLAX Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DULCOLAX Tablet
DULCOLAX Tablet mengandungi ubat yang dipanggil bisacodyl. Ini dikategorikan dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil laksatif.

- DULCOLAX Tablet digunakan untuk melegakan sembelit. Ubat ini tidak mengurangkan berat badan.
- DULCOLAX Tablet juga digunakan dalam penyediaan prosedur diagnostik, dalam rawatan pra dan pasca operasi dan dalam keadaan, yang memerlukan bantuan pembuangan air besar

Bagaimana DULCOLAX Tablet berfungsi

DULCOLAX Tablet adalah laksatif yang bertindak dalam merangsang pembuangan air besar, pengurangan masa transit, dan melembutkan najis. Ini secara khusus merangsang proses pembuangan semula jadi di bahagian bawah saluran gastrousus.

Sebelum menggunakan DULCOLAX Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan, jika:

- Anda alergi (hipersensitif) kepada bisacodyl atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk (disenaraikan dalam seksyen Maklumat lanjut)
- Anda tidak toleran terhadap atau tidak dapat mencerna sesetengah gula (sebab tablet ini mengandungi sejumlah kecil laktosa dan sukrosa)

- Anda mempunyai dehidrasi yang teruk
- Anda mempunyai keadaan usus yang dipanggil "ileus" (tersumbat di dalam usus)
- Anda mempunyai keadaan perut yang akut seperti apendiks
- Anda mempunyai sakit perut yang teruk dengan loya dan muntah
- Anda mempunyai usus tersumbat (halangan usus)
- Anda mempunyai inflamasi usus

Jangan ambil ubat ini jika anda mengalami mana-mana perkara di atas. Jika anda tidak pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu kepada doctor atau ahli farmasi sebelum mengambil DULCOLAX Tablet jika anda mengandung, atau sedang merancang untuk mengandung.

DULCOLAX Tablet tidak boleh diambil semasa mengandung dan menyusu anak melainkan manfaat yang dijangkakan dianggap melebihi daripada risiko yang mungkin dan dinasihatkan oleh ahli preskripsi anda.

- Sebelum menggunakannya

Beritahu pada doktor atau ahli farmasi jika anda memerlukan nasihat atau maklumat yang lebih lanjut.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau baru mengambil ubat-ubatan yang lain.

- Tablet air (diuretik) seperti bendrofluazide atau furosemide (frusemide)
- Ubat steroid seperti prednisolone
- Laksatif yang lain

Sekiranya anda tidak pasti dengan mana-mana di atas, berbincang dengan ahli farmasi atau doktor sebelum mengambil Dulcolax Tablet.

Cara menggunakan DULCOLAX Tablet

- Berapa banyak harus digunakan
Untuk sembelit:

Dewasa dan kanak-kanak umur 10 tahun ke atas

- Ambil satu hingga dua tablet (5 - 10 mg) setiap hari sebelum tidur
- Jika anda tidak mengambil DULCOLAX Tablet sebelum ini, bermula dengan satu tablet dan meningkat kepada dua jika perlu
- Apabila anda membuang air besar telah kembali kepada normal, dos yang biasanya boleh dihentikan

Kanak-kanak umur 4- 10 tahun

DULCOLAX 5 mg Tablet untuk kanak-kanak hanya boleh diberikan kepada kanak-kanak yang berumur di antara 4 dan 10 tahun jika disyorkan oleh doktor. Dos yang biasa untuk kanak-kanak adalah satu tablet (5 mg) setiap hari sebelum tidur.

Kanak-kanak umur bawah 4 tahun

DULCOLAX Tablet tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah 4 tahun.

Untuk prosedur diagnostik dan pra operasi:

Sila guna di bawah pengawasan pakar perubatan.

Dewasa dan kanak-kanak berumur atas 10 tahun:

Ambil dua tablet pada waktu pagi dan dua tablet pada waktu petang, diikuti dengan satu supositori 10 mg pada keesokan pagi.

Kanak-kanak berumur 4 - 10 tahun

Berikan satu tablet pada waktu petang dan satu 5 mg supositori pada pagi yang berikut.

- Bila perlu digunakan

Ubat ini dicadangkan untuk diambil pada waktu malam agar boleh membuang air besar keesokan pagi. Tablet ini perlu ditelan sepenuhnya dengan air.

- Berapa lama perlu digunakan

Ubat-ubat ini tidak harus digunakan setiap hari lebih banyak daripada 5 hari. Sekiranya anda perlu menggunakan laksatif setiap hari, anda perlu jumpa doktor untuk mencari punca sembelit.

DULCOLAX TABLET®

Bisacodyl (5mg)

Kegunaan berlebihan adalah berbahaya.	Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.	Jika anda mempunyai reaksi alergi teruk, berhenti mengambil ubat ini dan hubungi doktor secepat mungkin.
- <u>Jika anda terlupa menggunakan</u> Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.	- <u>Perkara yang tidak boleh dilakukan</u> Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.	• Kolitis (keradangan pada usus besar yang menyebabkan sakit perut dan cirit-birit) • Dehidrasi Reaksi alergi yang mungkin menyebabkan ruam kulit • Pengsan
- <u>Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebi dos)</u> Jika anda ambil Dulcolax Tablet 5mg lebih daripada yang diperlukan Ini adalah berbahaya untuk • Mengambil terlalu banyak Dulcolax Tablet 5mg atau • Menggunakan Dulcolax Tablet 5mg untuk terlalu lama	Jangan berkongsi DULCOLAX Tablet dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda. - <u>Perkara yang perlu diberi perhatian</u> Susu, antasid atau proton pump inhibitors (ubat yang mengurangkan asid perut) tidak boleh diambil dengan DULCOLAX Tablet. Ini adalah kerana ianya akan melarutkan salutan enterik DULCOLAX Tablet.	Kesan sampingan yang jarang (mempengaruhi kurang daripada 1 dalam 100 orang) • Darah dalam najis • Kemuntahan • Ketidakelesaian perut • Ketidakelesaian di dalam dan sekitar dubur • Pening
Ini kerana penggunaan berlebihan dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan: • Ketidakeimbangan cecair dan elektrolit dalam badan: Keadaan ini boleh menjejaskan fungsi otot, termasuk otot dalam usus, dan juga mempengaruhi keseimbangan garam dalam darah. • Tahap kalium rendah dalam darah (hipokalemia): Ini boleh menyebabkan keletihan, pening, kelemahan otot, dan degupan jantung yang tidak teratur. • Dehidrasi: Anda mungkin merasa dahaga, pening, sakit kepala, dan pengeluaran air kencing yang berkurangan.	Tablet ini mengandungi kandungan kecil laktosa dan sukrosa. Pesakit yang mempunyai penaki warisan yang jarang termasuk tidak bertoleransi dengan fruktosa, galaktosa, defisiensi laktase total, masalah penyerapan glukosa-galaktosa, atau kekurangan sucraseisomaltase tidak harus menggunakan ubat ini. Jika anda mempunyai intoleransi terhadap sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.	Kesan sampingan yang biasa (mempengaruhi kurang daripada 1 dalam 10 orang) • Kejang atau sakit perut • Cirit-birit • Loya
Jika anda mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan, hubungi doktor atau pergi ke hospital dengan segera. Bawa bungkusan ubat bersama dengan anda; Ini akan membantu doktor mengetahui apa yang telah anda ambil.	<u>Memandu dan menggunakan mesin</u> Sesetengah orang mungkin merasa pening atau pengsan semasa mengambil ubat ini. Jika ini berlaku kepada anda, tunggu sehingga perasaan ini hilang sebelum memandu atau menggunakan mesin.	Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat. Ini termasuklah sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penggunaan produk ini, sila rujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda.	Kesan-kesan sampingan Seperti ubat-ubatan lain, DULCOLAX Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan di bawah, sila berhenti mengambil ubat ini dan hubungi doktor anda.	Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].
Semasa menggunakan DULCOLAX Tablet	Kesan sampingan yang sangat jarang (mempengaruhi kurang daripada 1 dalam 1000 orang) • Reaksi alergi teruk yang menyebabkan muka atau keronkong bengkak dan kesukaran pernafasan atau pening kepala.	Cara penyimpanan dan pelupusan DULCOLAX Tablet
- <u>Perkara yang perlu dilakukan</u> Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan DULCOLAX Tablet.	- <u>Penyimpanan</u> Simpan di bawah suhu 30°C. - <u>Pelupusan</u> Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.	

DULCOLAX TABLET®

Bisacodyl (5mg)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

DULCOLAX Tablet berbentuk bulat, biconvex, berwarna kuning, bersalut gula/enterik dengan permukaan licin, berkilat dan teras putih. Terdapat dalam pek 30 atau 200 tablet dalam satu kotak. Tidak semua saiz pek adalah dipasarkan

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bisacodyl 5mg

- Bahan tidak aktif

Monohydrate laktosa, kanji jagung, sukrosa, gliserol, magnesium stearat, talkum, akasia (serbuk), lilin lebah putih, shellac, lilin Carnauba, titanium dioksida yellow iron oxide, methacrylic acid-methyl methacrylate, kanji boleh larut, minyak kastor dan macrogol 6000

- Nombor MAL

MAL09020985XCZ

Pengilang

Delpharm Reims

Reims, France

Pemegang Pendaftaran Produk

DKSH Malaysia Sdn Bhd

B-11-01, The Ascent, Paradigm, No. 1,

Jalan SS7/26A, Kelana Jaya 47301

Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

20/05/2025

Nombor Siri:

NPRA(R2/2)231023/1162