

ENO FRUIT SALT GINGER

Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid (9.89%, 45.32%, 42.64%)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ENO Fruit Salt Ginger
2. Bagaimana ENO Fruit Salt Ginger berfungsi
3. Sebelum menggunakan ENO Fruit Salt Ginger
4. Cara menggunakan ENO Fruit Salt Ginger
5. Semasa menggunakan ENO Fruit Salt Ginger
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ENO Fruit Salt Ginger
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan ENO Fruit Salt Ginger

Untuk melegakan angin perut and ketidakhadaman.

Bagaimana ENO Fruit Salt Ginger berfungsi

Ia membantu meneutralkan asid berlebihan dalam perut dan saluran perut. *Sodium bicarbonate* dan *citric acid* bertindak balas dalam segelas air untuk membentuk *sodium citrate*. Sejumlah kecil *sodium citrate*, *sodium bicarbonate* dan *sodium carbonate* kekal dalam minuman. Sebagai antasid, fungsi utama *sodium bicarbonate* dan/atau *sodium carbonate* adalah bertindak balas dengan *hydrochloric acid* berlebihan dalam esofagus dan perut untuk membentuk *sodium chloride*, *water* dan *carbon dioxide*. *Sodium citrate* akan, dalam satu tempoh masa, membentuk *sodium bicarbonate* yang akan terus bertindak balas dengan *hydrochloric acid*.

Sebelum mengambil ENO Fruit Salt Ginger

- Bila tidak boleh menggunakannya

Jangan gunakan jika:

- anda mempunyai masalah hati, jantung, atau buah pinggang
- anda mempunyai tekanan darah tinggi
- anda alah kepada *sodium bicarbonate*, *sodium carbonate*, *citric*

acid, atau mana-mana bahan kandungan lain dalam produk ini.

- anda mengambil diet natrium yang rendah contohnya mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi atau kegagalan jantung kongestif, tidak boleh menggunakan produk ini kecuali diarahkan oleh doktor.

- Sebelum mula menggunakan ENO Fruit Salt Ginger

Jangan gunakan untuk kanak-kanak berumur 12 tahun and ke bawah.

Sekiranya anda hamil atau menyusui, sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil produk ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Produk ini mengurangkan keasidan perut anda dan mungkin mengganggu bagaimana ubat-ubatan lain diserap. Oleh itu, sila ambil ubat-ubatan lain pada masa yang berbeza.

Cara menggunakan ENO Fruit Salt Ginger

Untuk kegunaan oral sahaja.

- Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas:

- 4.3 g (satu paket atau serbuk sebanyak satu sudu 5 ml rata) dilarutkan dalam sekurang-kurangnya 1 cawan air. Minum apabila simptom berlaku.
- Dos kedua boleh diambil selepas 2-3 jam.
- Jangan mengambil dos kedua kurang daripada 2 jam selepas dos pertama.
- Jangan mengambil lebih daripada dua kali sehari.
- Jangan melebihi dos yang dinyatakan.

- Bila perlu digunakan

Apabila mengalami simptom angin perut atau ketidakhadaman.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan selama jangka masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jangan mengambil ubat ini lebih daripada 14 hari.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos ENO Fruit Salt Ginger, ambil secepat mungkin dan kemudian teruskan seperti biasa. Sekiranya anda hanya ingat pada masa dos berikutnya, ambil jumlah dos biasa dan teruskan seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos terlepas.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya terambil dos berlebihan, dapatkan nasihat perubatan.

Jika anda ambil dos berlebihan, anda mungkin mengalami sendawa, kerengsaan gastrik, kegelisahan, kelemahan, dahaga, pening kepala dan sakit kepala.

Semasa menggunakan ENO Fruit Salt Ginger

- Perkara yang perlu lakukan

Ambil dos yang dinasihatkan oleh doktor dan ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Produk ini mengandungi *sodium* (0.73g per dos atau paket)

- Jangan melebihi dos yang disyorkan.
- Jangan mengambil ubat ini lebih daripada 14 hari.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan harus dihentikan jika simptom-simptom anda berterusan atau bertambah teruk. Sila berjumpa dengan doktor anda untuk menyiasat punca ketidakselesaan perut anda.

Kesan-kesan sampingan

Kerengsaan gastrousus yang ringan, termasuk sendawa, angin perut, dan kembung perut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
ENO Fruit Salt Ginger**

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada kelembapan. Jauhkan daripada capaian dan penglihatan kanak-kanak.

- Pelupusan

Tidak ada langkah khusus untuk penggunaan atau pengendalian produk ini.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk perang pucat yang mengalir dengan kilauan kristal.

- Bahan-bahan kandungan

- *Bahan-bahan aktif*

Sodium carbonate

Sodium bicarbonate

Citric acid

- *Bahan tidak aktif*

Saccharin Sodium

Caramel

Ginger Flavour

Ginger Flavour Spice 'n' Easy

Air tulen

- Nombor MAL:

MAL05041881XR

Pengilang

Sterling Drug (Malaya) Sdn. Bhd.

LOT 89, Jalan Enggang, Ampang/Hulu

Kelang Industrial Estate, 68000, Ampang,

Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Haleon Malaysia Sdn Bhd (3467-X)

Lot 89, Jalan Enggang,

Ampang/Hulu Kelang Industrial Estate,

68000 Selangor, Malaysia.

Tarikh semakan RiMUP

18/08/2025

Nombor siri

NPRA(R4/1)200919/00262