

DESTIQ ER TABLETS

Desvenlafaxine Extended Release Tablets (50 mg, 100 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DESTIQ ER
2. Bagaimana DESTIQ ER berfungsi
3. Sebelum menggunakan DESTIQ ER
4. Cara menggunakan DESTIQ ER
5. Semasa menggunakan DESTIQ ER
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DESTIQ ER
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan DESTIQ ER

DESTIQ ER digunakan dalam rawatan kemurungan (MDD).

Bagaimana DESTIQ ER berfungsi

DESTIQ ER tergolong dalam kelas ubat yang dipanggil serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs). Serotonin dan noradrenalin adalah kimia pengantar yang membolehkan saraf tertentu di otak berfungsi. Tablet DESTIQ ER meningkatkan prestasi kedua-dua kimia pengantar ini. Pakar berpendapat ini adalah cara ubat ini dapat membantu memulihkan kesejahteraan emosi anda.

Sebelum menggunakan DESTIQ ER

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil DESTIQ ER:

- Jika anda alah kepada desvenlafaxine, venlafaxine atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini
- Jika anda juga mengambil, atau mengambil dalam 14 hari sebelum, sebarang ubat yang dikenali sebagai *Monoamine oxidase inhibitor* (MAOIs), digunakan untuk merawat kemurungan atau penyakit *Parkinson*. Pengambilan MAOI (*Monoamine oxidase inhibitors*) jenis *reversible* atau suntikan intravena *methylene blue* bersama DESTIQ ER boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius atau mengancam nyawa. Di samping itu, anda mesti menunggu sekurang-kurangnya 7 hari selepas anda berhenti mengambil DESTIQ ER sebelum mengambil MAOI.

Mengandung dan menyusukan anak

Anda boleh menggunakan DESTIQ ER hanya setelah membincangkan kebaikan dan potensi risiko terhadap bayi dalam kandungan anda dengan doktor.

DESTIQ ER boleh diserap melalui uri manusia. Jika anda mengambil ubat ini semasa hamil, bayi anda mungkin tidak berupaya menyusu dengan betul, mengalami kesukaran pernafasan, atau perlu dimasukkan ke hospital untuk tempoh yang lama. Sekiranya bayi anda mempunyai simptom-simptom ini semasa dilahirkan, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

Pengambilan DESTIQ ER semasa kehamilan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, ada kalanya dikaitkan dengan pengumpulan cecair, pendarahan yang banyak selepas bersalin.

Pemberhentian ubat ini mungkin menyebabkan kemurungan yang berulang. Sila maklumkan kepada doktor anda sekiranya simptom anda berlarutan atau menjadi semakin teruk selepas anda berhenti mengambil ubat ini.

DESTIQ ER meresap ke dalam susu ibu dan kesannya pada bayi masih belum diketahui. Oleh itu, anda harus membincangkan perkara itu dengan doktor anda, dan beliau akan memberi ubat ini hanya jika kebaikan yang dijangka melebihi risiko yang mungkin dihadapi.

- Sebelum menggunakan DESTIQ ER

Sekiranya ada yang berikut berlaku untuk anda, beritahu doktor anda sebelum mengambil DESTIQ ER:

- jika anda mempunyai sejarah, atau jika seseorang dalam keluarga anda mengalami mania atau hipomania
- jika anda berasa murung dan terfikir untuk mencederakan atau membunuh diri sendiri. Anda mungkin lebih cenderung berfikir seperti ini jika sebelum ini anda pernah terfikir untuk membunuh diri atau mencederakan diri sendiri atau jika anda ialah seorang anak muda.
- jika anda menggunakan ubat lain yang diambil bersama dengan DESTIQ ER dapat meningkatkan risiko terkena sindrom serotonin.

Tanda dan gejala sindrom

serotonin mungkin termasuk kegelisahan, halusinasi, hilang koordinasi, degupan jantung yang pantas, peningkatan suhu badan, perubahan tekanan darah secara mendadak, refleks yang terlalu aktif, cirit-birit, koma, mual dan muntah. Dalam keadaan yang paling teruk, sindrom serotonin boleh menyerupai sindrom malignan neuroleptik (NMS). Tanda dan gejala NMS boleh merangkumi suhu badan yang tinggi dengan otot tegang, kekeliruan atau agitasi, dan berpeluh.

- Jika anda mempunyai masalah mata, seperti jenis glaukoma tertentu (peningkatan tekanan pada mata);
- Jika anda pernah mengalami tekanan darah tinggi;
- Jika anda pernah mengalami masalah jantung, seperti serangan jantung;
- Jika anda pernah mengalami strok;
- Jika anda pernah mengalami sawan;
- Jika anda pernah mengalami tahap natrium rendah dalam darah anda (hiponatraemia);
- Jika anda mengambil tablet diuretik;
- Jika anda lebih cenderung mengalami lebam atau mudah mengalami pendarahan (sejarah gangguan pendarahan), atau jika anda mengambil ubat lain yang boleh meningkatkan risiko pendarahan;
- Jika anda mengalami peningkatan tahap lipid atau kolesterol.
- Jika anda mengambil DESTIQ ER menjelang akhir kehamilan, anda berkemungkinan untuk mendapat peningkatan dalam risiko pendarahan faraj yang banyak sejurus selepas kelahiran, terutamanya jika anda mempunyai sejarah gangguan pendarahan. Doktor anda harus sedar bahawa anda sedang mengambil DESTIQ ER supaya mereka boleh menasihati anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan

DESTIQ ER TABLETS

Desvenlafaxine Extended Release Tablets (50 mg, 100 mg)

kesihatan. Doktor anda harus memutuskan sama ada anda boleh mengambil DESTIQ ER dengan ubat lain.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Ubat lain untuk merawat kemurungan, seperti MAOI, SNRI lain, perencat pengambilan serotonin selektif (SSRI), trisiklik (mis. *Desipramine*) atau ubat-ubatan yang mengandungi *litium*
- *Venlafaxine hidroklorida* atau produk lain yang mengandungi *desvenlafaxine succinate*
- *Fentanyl* dan analognya (digunakan untuk mengatasi kesakitan)
- *Dextromethorphan* (digunakan sebagai penekan batuk)
- *Tapentadol* (membantu melegakan kesakitan)
- *Meperidine* (merawat kesakitan sederhana hingga teruk)
- *Methadone* (digunakan untuk mengubati kesakitan dan juga untuk rawatan detoksifikasi atau penyalenggaraan ketagihan ubat opioid)
- *Pentazocine* (digunakan untuk melegakan kesakitan sederhana hingga teruk)
- Metilena biru (digunakan untuk merawat *metemoglobinemia*)
- *Triptans* (digunakan untuk *migrain*)
- *Amfetamin* (digunakan dalam rawatan gangguan hiperaktif kekurangan perhatian (ADHD), gangguan tidur dan obesiti)
- Ubat-ubatan yang mengandungi *sibutramine* (digunakan untuk menurunkan berat badan)
- Ubat-ubatan yang mengandungi *tramadol* (digunakan untuk merawat kesakitan teruk)
- Produk yang mengandungi *St. John's Wort* (juga dipanggil *Hypericum perforatum*, ubat semula jadi atau herba yang digunakan untuk merawat kemurungan yang ringan)
- Ubat-ubatan yang mengandungi *linezolid*, antibiotik (digunakan untuk merawat jangkitan)
- Produk yang mengandungi triptofan (digunakan untuk masalah seperti tidur dan kemurungan)

- Antipsikotik (digunakan untuk merawat penyakit yang disebut skizofrenia)
- Ubat yang mengandungi *ketoconazole* (ubat antikulat)
- Ubat yang mengandungi *midazolam* (untuk tidur dan merawat keresahan)

Cara menggunakan DESTIQ ER

- Berapa banyak harus digunakan

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label, rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Dos lazim ialah 50 mg diambil sekali sehari dengan atau tanpa makanan. Dos maksimum ialah 200 mg / hari.

Sekiranya anda mempunyai masalah buah pinggang, sila berbincang dengan doktor anda, kerana dos ubat ini mungkin berbeza.

Keselamatan dan keberkesanan DESTIQ ER pada individu di bawah 18 tahun belum dapat dipastikan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

DESTIQ ER harus diambil pada waktu yang sama setiap hari dengan atau tanpa makanan. Tablet mesti ditelan sepenuhnya dengan cecair dan tidak dipotong, dihancurkan, dikunyah atau dilarutkan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat anda seperti yang disarankan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga dos seterusnya dan langkau dos yang terlupa. Jangan mengambil dos berganda untuk menebus dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Rawatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan DESTIQ ER

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor anda.
 - Beritahu kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil DESTIQ ER.
 - Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini.
 - Sekiranya anda mempunyai idea untuk mencederakan atau membunuh diri anda pada bila-bila masa, hubungi doktor anda atau segera ke hospital.
 - Anda dinasihatkan untuk memberitahu saudara atau rakan terdekat bahawa anda berasa murung atau mengalami keresahan, dan minta mereka membaca risalah ini. Minta mereka memberitahu anda jika mereka menganggap kemurungan atau kegelisahan anda semakin teruk, atau jika mereka bimbang akan perubahan tingkah laku anda.
 - Anda tidak boleh minum alkohol semasa mengambil DESTIQ ER.
- ### - Perkara yang tidak boleh dilakukan
- Jangan berhenti mengambil ubat melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda.
 - Jangan mengambil ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.
 - Jangan berikan DESTIQ ER kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

DESTIQ ER TABLETS

Desvenlafaxine Extended Release Tablets (50 mg, 100 mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian

DESTIQ ER disediakan sebagai tablet matriks yang melepaskan ubat ke dalam badan anda secara perlahan. Anda mungkin ternampak sesuatu dalam najis anda yang kelihatan seperti tablet, tetapi ia adalah matriks kosong. Jangan bimbang jika anda terlihat matriks kosong ini. Anda tidak perlu mengambil tablet tambahan. Bahan ubat aktif telah pun diserap ketika anda terlihat matriks tersebut.

Ubat seperti DESTIQ ER (yang dikenali sebagai SSRI/SNRI) mungkin menyebabkan gejala disfungsi seksual. Dalam sesetengah kes, gejala ini berterusan walaupun selepas rawatan dihentikan.

- Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini boleh mempengaruhi kemampuan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Sekiranya tablet ini membuat anda merasa loya, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan segera hubungi doktor anda.

Jangan memandu atau menggunakan alat atau mesin sehingga anda mengetahui bagaimana ubat ini mempengaruhi anda.

- Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, DESTIQ ER boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Sekiranya ada perkara berikut berlaku, jangan mengambil DESTIQ ER lebih banyak. Beritahu doktor anda dengan segera, atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital terdekat anda.

- Kesan sampingan yang kerap

- loya, mulut berasa kering, sembelit, cirit-birit, muntah
- lesu, menggigil, kelemahan (astenia), berasa gemuruh atau resah
- sakit kepala, pening, mengantuk, menggeletar, sesemut, deria rasa berubah, gangguan tumpuan
- kesukaran untuk tidur, keresahan, mimpi yang luar biasa, kegemuruhan, cepat marah
- berpeluh (termasuk berpeluh pada waktu malam), ruam

- kekejangan otot, palpitasi (terasa degupan jantung anda), degupan jantung yang pantas
- bunyi berdesing dalam telinga (tinitus), vertigo
- penglihatan kabur, anak mata terbeliak
- penambahan atau penurunan berat badan, tekanan darah yang meningkat, kehilangan selera makan, keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal
- dorongan seks yang berkurang, ketidakupayaan mencapai orgasme, disfungsi erektile (mati pucuk), pancutan/ orgasme abnormal (lelaki);
- menguap, kulit berasa hangat secara tiba-tiba.

Kesan sampingan diketahui berlaku apabila orang berhenti menggunakan ubat ini, terutamanya apabila ia dihentikan secara tiba-tiba atau dos dikurangkan terlalu cepat. Sebilangan pesakit mungkin mengalami simptom seperti pening, mual, sakit kepala, mudah marah, cirit-birit, kegelisahan, mimpi yang tidak normal, letih dan berpeluh.

Kesan sampingan daripada menghentikan ubat antidepresan mungkin berlaku jika anda beralih dari antidepresan lain ke DESTIQ ER. Doktor anda mungkin akan mengurangkan dos ubat antidepresan awal anda perlahan-lahan untuk membantu mengurangkan kesan sampingan ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

- Cara penyimpanan dan pelupusan DESTIQ ER

- Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

Jangan simpan di atas suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

- Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

DESTIQ EXTENDED RELEASE 50 MG TABLETS: Berwarna merah jambu, bulat, dwicembung, tablet bersalut filem, dicetak dengan '50' di satu sisi dan kosong di sisi lain.

- DESTIQ EXTENDED RELEASE 100 MG TABLETS:

Berwarna coklat gelap merah, bulat, dwicembung, tablet bersalut filem, dengan cetakan '100' di satu sisi dan kosong di sisi lain.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- *Desvenlafaxine succinate*

Bahan-bahan tidak aktif:

- *Hypromellose (Benecel K100M PHARM CR)*
- *Hypromellose (Methocel K100LV CR)*
- *Microcrystalline cellulose*
- *Povidone K-90*
- *Talc*
- *Magnesium stearate (Vegetable source)*
- *Opadry Pink 03F84770 (for 50 mg):*
 - *HPMC 2910/ Hypromellose (6 cP)*
 - *Titanium dioxide,*
 - *Macrogol/ PEG 6000*
 - *Talc*
 - *Iron oxide red*
- *Opadry Brown 03F86990 (for 100mg):*
 - *HPMC 2910/Hypromellose (6 cP)*
 - *Titanium dioxide*
 - *Iron oxide red*
 - *Macrogol/ PEG 4000*
 - *Iron oxide black*

DESTIQ ER TABLETS

Desvenlafaxine Extended Release Tablets (50 mg, 100 mg)

- Nombor-nombor MAL:

DESTIQ ER 50 MG TABLETS:

MAL21076008AZ

DESTIQ ER 100 MG TABLETS:

MAL21076007AZ

Pengilang

Alembic Pharmaceuticals Limited
(Formulation Division),
Village Panelav, P.O. Tajpura,
Near Baska, Taluka Halol, Panchmahal,
Gujarat – 389350 India.

Pemegang Pendaftaran Produk

GENPHARMA SDN. BHD.
Lot 5016, Jalan Teratai,
5 ½ Mile Off Jalan Meru,
41050 Klang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

24/7/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)260623/00084