

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lasix
2. Bagaimana Lasix berfungsi
3. Sebelum mengambil Lasix
4. Cara menggunakan Lasix
5. Semasa menggunakan Lasix
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lasix
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lasix

Lasix 40 mg tablet digunakan untuk:

- pengəkalan lebihan cecair dalam badan (edema) disebabkan penyakit jantung atau hati,
- pengəkalan lebihan cecair dalam badan (edema) disebabkan masalah buah pinggang,
- pengəkalan lebihan cecair dalam badan (edema) disebabkan terbakar,
- tekanan darah tinggi (hipertensi).

Bagaimana Lasix berfungsi

Lasix mengandungi furosemide, yang tergolong dalam keluarga ubat-ubatan yang dipanggil diuretik. Diuretik membantu mengurangkan jumlah cecair berlebihan di dalam badan dengan meningkatkan perkumuhan air kencing. Lasix juga boleh digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi

Sebelum mengambil Lasix

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Lasix dalam hal yang berikut:

- kerosakan buah pinggang yang telah berhenti berfungsi dan menghasilkan air kencing
- Kegagalan hati dengan tidak sedar diri (koma dan precoma hepatic)
- Tiada pengeluaran atau tidak lulus air kencing
- Paras natrium yang rendah dalam darah anda
- Rendah tahap kalium dalam darah anda

- dehidrasi

- alah kepada: Ubat ini atau mana-mana bahan-bahan yang disenaraikan di akhir risalah ini. Ubat-ubatan yang dipanggil sulfonamides (eg. beberapa jenis antibiotik yang juga dirujuk sebagai 'sulfur antibiotik') atau sulfonyleureas (ubat-ubatan yang boleh digunakan untuk merawat kencing manis)

- Beberapa tanda-tanda tindak balas alahan termasuk ruam kulit, gatal-gatal, sesak nafas atau bengkak muka, bibir atau lidah, yang mungkin menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas.

Jangan mengambil Lasix jika anda menyusu atau merancang untuk menyusu.

Lasix akan masuk ke dalam susu ibu dan ada kemungkinan bayi anda mungkin akan terjejas.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada:

- Mana-mana bahan-bahan yang disenaraikan di akhir risalah ini
- Mana-mana ubat-ubatan lain yang dipanggil sulfonamides atau sulfonyleureas
- Mana-mana bahan-bahan lain, seperti makanan, pengawet atau kontras warna

Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil.

Seperti ubat-ubatan lain jenis ini, Lasix tidak disyorkan untuk digunakan semasa mengandung. Jika terdapat keperluan untuk mempertimbangkan Lasix semasa kehamilan anda, doktor anda akan membincangkan manfaat dan risiko mengambil Lasix jika anda hamil.

Beritahu doktor anda jika anda menyusu atau merancang untuk menyusu.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mempunyai apa-apa keadaan perubatan, terutamanya yang berikut:

- Tekanan darah rendah (hypotension)

- menghadapi masalah hati

- menghadapi masalah buah pinggang
- menghadapi masalah jantung
- kencing manis (nyata & terpendam)
- Gout, penyakit sakit sendi dengan bengkak
- Kencing kurang daripada biasa
- Kesukaran lulus air kencing
- Tiada pengeluaran atau tidak lulus air kencing
- Masalah prostat

Beritahu doktor anda jika anda mengambil diet garam yang terhad.

Jika anda tidak memberitahu doktor anda tentang mana-mana di atas, memberitahu mereka sebelum anda mengambil Lasix

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat tidak patut diambil dengan Lasix. Ini termasuk ubat julap dalam kuantiti berlebihan.

Sesetengah ubat boleh berinteraksi dengan Lasix. Ini termasuk:

- ubat perkumuhan cecair lain atau ubat-ubatan diuretik
- Ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan beberapa keadaan jantung yang lain, terutamanya ACE inhibitor atau penyekat reseptor angiotensin II
- Ubat jantung (glikosida) seperti *digoxin*
- Ubat-ubatan yang boleh menyebabkan perubahan ECG jantung seperti *terfenadine*, antiarrhythmics kelas I dan III
- non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) dan *aspirin*, ubat-ubatan yang digunakan untuk melegakan kesakitan, bengkak dan gejala keradangan lain-lain, termasuk artritis
- *Probenecid* (gout), *methotrexate* (rawatan reumatoid melalui penindasan sistem imun) dan ubat-ubatan lain seperti

furosemide, yang dirembeskan di dalam buah pinggang

- Dos Salicylates yang tinggi (analgesik)
- Ubat yang digunakan untuk 'relax' otot sebelum atau semasa pembedahan
- *Lithium*, ubat yang digunakan untuk merawat perubahan mood dan beberapa jenis kemurungan
- Ubat-ubatan yang digunakan dalam situasi kecemasan seperti *adrenalin* dan *noradrenalin*
- *Cisplatin*, ubat digunakan untuk merawat kanser
- *Theophylline*, ubat yang digunakan untuk merawat asma
- Antibiotik tertentu, terutamanya aminoglycosides, cephalosporins, polymyxins
- Insulin dan pil yang digunakan untuk merawat kencing manis
- *Sucralfate*, ubat yang digunakan untuk merawat ulser perut
- Ubat-ubatan anticonvulsant seperti *Chloral hydrate* atau *phenytoin*
- Kortikosteroid seperti *kortison*, *prednisolone* atau *dexamethasone*
- *Risperidone*, sila ikut nasihat doktor
- *Cyclosporine*, ubat yang digunakan terutamanya untuk mengelakkan penolakan organ yang dipindahkan
- Ubat-ubatan yang digunakan semasa imbasan untuk melihat imej badan anda
- Penggunaan hormon tiroid secara serentak (mis. L-thyroxin) dengan furosemide pada dos yang tinggi
- Beritahu doktor anda jika anda mengambil aliskiren untuk merawat tekanan darah tinggi

Ubat-ubatan ini boleh terjejas oleh Lasix, atau boleh menjejaskan bagaimana ia berfungsi. Anda mungkin perlu menggunakan dos yang berlainan daripada perubatan anda, atau mengambil ubat-ubatan yang berbeza. Doktor atau ahli farmasi akan menasihatkan anda.

Anda tidak patut makan *liquorice* dalam jumlah kuantiti yang besar apabila anda mengambil Lasix.

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan Lasix 40 mg tablet

Ubat ini mengandungi laktosa. Sila mengambil Lasix 40 mg tablet hanya selepas berunding dengan doktor anda jika anda sedar bahawa anda tidak bertoleransi kepada beberapa jenis gula.

Cara menggunakan Lasix

Sentiasa mengambil Lasix mengikut nasihat doktor anda. Anda perlu

menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Ambil pil Lasix dengan segelas air

Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti.

Arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

Jika anda mengambil dos yang salah, Lasix tidak boleh mencapai kesan rawatan yang memuaskan.

Bila perlu digunakan

Tablet Lasix biasanya diambil sekali sehari sebagai dos pengkalan.

Jika doktor anda menetapkan tablet Lasix perlu diambil sekali sehari, ia adalah terbaik dilakukan pada waktu pagi (sebelum sarapan).

Ambil tablet Lasix dengan perut kosong. Sebagai contoh, satu jam sebelum makan atau dua jam selepas makan.

Makanan boleh mengganggu penyerapan Lasix.

Ambil tablet Lasix pada masa yang sama setiap hari melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya.

Mengambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari akan mempunyai kesan yang terbaik. Ia juga akan membantu anda ingat bila untuk mengambil ubat.

Jika anda mengambil tablet Lasix lebih daripada sekali sehari, mengambil dos pertama anda dengan segera sebelum sarapan dan mengambil dos terakhir anda sekitar 2:00 pm (semasa perut kosong), melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya.

Lasix boleh meningkatkan jumlah air kencing anda lulus, ia juga akan meningkatkan bilangan kali anda perlu pergi ke tandas. Dengan mengambil dos terakhir anda sekitar 2:00 pm, gangguan tidur anda dapat dielakkan.

Jika anda tidak pasti bila ubat perlu diambil, minta nasihat doktor anda atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu digunakan

Edema:

Teruskan pengambilan ubat anda selagi doktor anda memberitahu anda supaya diteruskan.

Ubat ini membantu mengawal keadaan optima anda dan mengurangkan cecair membina di dalam badan anda.

Hipertensi:

Teruskan pengambilan ubat anda selagi doktor anda memberitahu supaya diteruskan.

Ubat ini membantu mengawal tekanan darah anda, tetapi ia tidak menyembuhkan tekanan darah tinggi.

Jika terlupa menggunakan

Jangan cuba untuk mengganti dos terlepas dengan mengambil lebih daripada satu dos pada satu-satu masa.

Ini boleh meningkatkan peluang mendapat kesan sampingan yang tidak diingini.

Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos anda terlepas dan mengambil dos seterusnya yang anda sepatut ambil. Jika masih terdapat masa yang lama sebelum dos seterusnya, mengambil sebaik sahaja anda ingat, kemudian kembali untuk mengambil ubat seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Telefon doktor anda segera, atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil dos yang berlebihan.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera. Jika anda mengambil Lasix berlebihan, anda mungkin berasa keliru, dehidrasi, pening atau anda mungkin kencing dengan berlebihan.

Sentiasa mengambil Lasix tepat sebagaimana doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Semasa menggunakan Lasix

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Lasix.

Jika anda dirancang untuk menjalani pembedahan yang memerlukan anestetik am, beritahu doktor atau doktor gigi bahawa anda mengambil ubat ini.

Tekanan darah anda mungkin turun secara tiba-tiba.

Jika anda hamil semasa anda mengambil ubat ini, beritahu doktor anda atau ahli farmasi dengan segera.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai muntah atau cirit-birit yang berlebihan ketika mengambil Lasix atau jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- mulut kering atau dahaga
- pengsan
- kelemahan, keletihan atau mengantuk
- sakit otot atau kekejangan
- denyutan jantung yang cepat
- kencing kurang daripada biasa

Jika anda mengalami gejala-gejala ini, anda mungkin dehidrasi kerana anda kehilangan terlalu banyak air.

Pastikan anda minum air yang mencukupi semasa latihan dan semasa cuaca panas apabila anda mengambil Lasix, terutamanya jika anda berpeluh banyak.

Jika anda tidak minum air yang cukup semasa mengambil Lasix, anda mungkin berasa akan pengsan atau sakit kepala atau tidak sihat. Ini adalah kerana tekanan darah anda menurun secara tiba-tiba dan anda dehidrasi. Jika anda terus berasa tidak sihat, beritahu doktor anda.

Jika anda bercadang untuk mengambil apa-apa ujian darah, beritahu doktor anda bahawa anda mengambil Lasix.

Mungkin terdapat beberapa gangguan dengan keputusan ujian ini.

Jika anda mengambil Lasix untuk merawat tekanan darah tinggi, pastikan tekanan darah anda diperiksa seperti yang diarahkan oleh doktor anda untuk

memastikan Lasix berfungsi dan memberi kesan rawatan yang optima.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memberikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan berhenti mengambil Lasix, atau menukar dos, tanpa memeriksa dengan doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda rasa ringan kepala, pening atau pengsan, bangun perlahan-lahan apabila bangun dari tidur atau berdiri.

Ubat-ubatan diuretik boleh menyebabkan pening atau ringan kepala pada sesetengah orang. Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas kepada ubat anda sebelum anda memandu kereta, mengendalikan jentera, atau melakukan aktiviti yang boleh membahayakan jika anda pening atau ringan kepala.

Jika ini berlaku, jangan memandu.

Jika anda minum alkohol atau mengambil ubat tahan sakit yang kuat, pening atau ringan kepala mungkin menjadi lebih teruk.

Kesan-kesan alkohol boleh dibuat lebih teruk ketika mengambil Lasix. Minum alkohol adalah tidak digalakkan semasa mengambil Lasix.

Jika anda mengambil Lasix untuk tempoh masa yang panjang, anda perlu menyamak dengan doktor anda untuk menentukan sama ada anda harus makan lebih makanan yang mengandungi kalium atau mengambil suplemen tambahan kalium. Walau bagaimanapun, meningkatkan jumlah kalium dalam diet anda mungkin tidak diperlukan dan boleh menjadi berbahaya.

Semak dengan doktor anda.

Lasix boleh menyebabkan kulit anda menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari. Jika ini berlaku, anda perlu memakai pakaian perlindungan termasuk topi dan blok matahari apabila anda berada di luar.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diingini tetapi tidak semua orang akan mengalaminya dan kebanyakan masa mereka tidak serius. Doktor anda telah menimbangkan kadar risiko terhadap faedah yang diingini sebelum preskrip ubat untuk anda.

Jangan terkejut dengan kesan-kesan sampingan yang mungkin dialami dalam senarai ini. Anda kemungkinan besar tidak akan mengalami apa-apa daripada mereka.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda berasa tidak sihat semasa anda mengambil Lasix.

Lasix membantu kebanyakan orang dengan tekanan darah tinggi atau pengkalan cecair, tetapi ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini dalam golongan minoriti.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana yang berikut dan membingungkan anda:

- dahaga dan kering mulut yang luar biasa
- keturunan berat badan
- kelemahan atau keletihan
- kebas atau kesemutan di tangan dan / atau kaki
- kekejangan otot betis
- sakit otot atau kejang
- kegelisahan
- mengantuk atau kekurangan tenaga
- pening atau ringan kepala
- sakit kepala
- Demam
- muntah atau mual
- cirit-birit
- penglihatan kabur atau terjejas
- pendarahan yang luar biasa atau lebam di bawah kulit
- dering atau dengung di telinga

- kekeliruan

Ini adalah kesan sampingan yang agak biasa Lasix. Kebanyakan mereka adalah kurang serius atau singkat.

Beritahu doktor anda secepat mungkin jika anda notis mana-mana yang berikut:

- denyutan jantung tidak teratur atau cepat
- kencing kurang daripada biasa
- sakit perut yang teruk, sering dengan loya atau muntah-muntah
- pening teruk atau sensasi berputar
- sensitiviti meningkat kepada cahaya matahari
- mengelupas atau pengelupasan kulit
- gejala anemia seperti keletihan, sesak nafas apabila bersenam, pening dan nampak pucat
- jangkitan kerap seperti demam, menggigil yang teruk, sakit tekak atau ulser di dalam mulut
- pendarahan atau lebam lebih mudah daripada biasa, hidung berdarah
- kehilangan kawalan pundi kencing atau usus anda (inkontinen)
- gout, penyakit sendi, sakit bengkak
- pekak atau nada dalam telinga

Ini mungkin kesan sampingan yang serius Lasix. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera. Kesan sampingan yang serius adalah jarang berlaku.

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda:

- tanda-tanda alahan secara tiba-tiba seperti ruam, gatal-gatal (merah jambu, kawasan gatal dibangkitkan) pada kulit, bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian lain badan, sesak nafas, semput atau masalah pernafasan
- sakit dada
- pengsan atau mempunyai nadi cepat yang lemah
- merah, sering gatal, bintik yang serupa kepada ruam dilihat dengan campak yang bermula pada anggota badan dan kadang-kadang pada muka dan badan. Tempat bintik boleh *blister* dan boleh berterusan untuk membentuk tanda merah yang menimbulkan dan pucat ditengah. Mereka yang terjejas mungkin mempunyai demam, sakit tekak, sakit

kepala dengan atau tanpa cirit-birit

- kuning kulit dan / atau mata (jaundis)
- masalah otot yang serius (rhabdomyolysis)

Ini adalah kesan sampingan yang serius. Anda mungkin memerlukan perhatian segera perubatan atau masuk wad hospital. Kesan-kesan sampingan yang sangat jarang berlaku.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda dapati apa-apa lagi yang membuat anda rasa kurang sihat.

Kesan sampingan yang lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my [Consumers] Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Lasix

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang sebarang aspek perubatan anda, atau sebarang pertanyaan mengenai maklumat di dalam risalah ini, membincangkannya dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Penyimpanan

Simpan tablet Lasix anda di *blister* sehingga masa untuk mengambil mereka.

Jika anda menyimpan tablet Lasix anda luar daripada *blister*, kesan penyimpanan adalah tidak memuaskan.

Simpan tablet Lasix anda di tempat yang sejuk dan kering di mana suhu berada di bawah 30 ° C.

Jangan simpan Lasix atau mana-mana ubat-ubatan lain di bilik mandi, berhampiran sinki, atau pada jendela tingkap.

Jangan biarkan ia di dalam kereta.

Haba dan lembap boleh memusnahkan ubat-ubatan.

Pastikan ia disimpan di mana kanak-kanak tidak boleh tercapai.

Pelupusan

Jika doktor anda memberitahu anda untuk berhenti mengambil Lasix atau perubatan yang telah melebihi tarikh luput, minta nasihat ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet hampir putih, bulat, dengan garisan tengah.

Tablet boleh dibahagikan kepada bahagian yang sama. Lasix 40 mg tablet disediakan dalam pek *blister* mengandungi 100 tablet bersalut.

Bahan-bahan kandungan:

Bahan aktif adalah furosemide. 1 tablet mengandungi 40 mg furosemide. Bahan-bahan lain adalah seperti berikut: *Lactose monohydrate, maize starch, pregelatinized corn starch, talc, colloidal silica, magnesium stearate (Ph.Eur.)*.

Nombor MAL :

Tablet Lasix 40mg :
MAL19870226AZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Pengilang

Opella Healthcare International SAS,
56 Route de Choisy, 60200
Compiègne, France

Pemegang Pendaftaran Produk

Sanofi-aventis (Malaysia) Sdn. Bhd.
Unit TB-18-1, Level 18, Tower B,
Plaza 33
No.1 Jalan Kemajuan,
Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/08/2023

Nombor siri

NPRA (R1/3) 29012024/026