

SOLIAN® Tablet

Amisulpride (100mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Solian
2. Bagaimana Solian berfungsi
3. Sebelum mengambil Solian
4. Cara menggunakan Solian
5. Semasa menggunakan Solian
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Solian
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Solian

Solian mengandungi ubat yang dipanggil *amisulpride*.

Ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil 'antipsikotik'. Ia digunakan untuk merawat penyakit yang dipanggil skizofrenia. Ubat ini digunakan untuk merawat penghidap skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit mental yang dicirikan oleh gangguan mental dan tingkah laku, seperti halusinasi atau agitasi.

Bagaimana Solian berfungsi

Solian berfungsi dengan menyenangkan pemikiran, perasaan dan tingkah laku terganggu. Ia digunakan untuk merawat skizofrenia apabila ia bermula dan juga dalam jangka masa panjang.

Sebelum mengambil Solian

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Solian sekiranya:

- jika anda alah kepada bahan aktif (*amisulpride*) atau mana-mana bahan lain ubat ini. Ini adalah kerana ubat ini mungkin memberi kesan terhadap sel darah anda, contohnya mengurangkan bilangan sel darah putih. Masalah ini boleh diperhatikan daripada ujian darah,
- jika anda mempunyai *pheochromocytoma* (pertumbuhan berlebihan kelenjar adrenal di sekitar buah pinggang, mengeluarkan bahan yang menyebabkan tekanan darah tinggi),
- pada kanak-kanak di bawah umur 15 tahun,

- jika anda mempunyai tumor yang bergantung kepada prolaktin (prolaktin adalah hormon yang merangsang pengeluaran susu), seperti kanser payudara atau gangguan pituitari,
- jika anda mengambil ubat lain. Sekiranya ini berlaku, pastikan penggunaan gabungan dengan Solian tidak dikontraindikasikan

Jangan mengambil ubat ini jika mana-mana yang di atas berkenaan dengan anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Solian.

-Sebelum mula mengambil

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Solian.

Doktor anda mungkin meminta anda mengambil ujian elektrokardiogram (ECG) sebelum memulakan rawatan. Ubat ini boleh menyebabkan gangguan irama jantung.

Ubat ini harus digunakan dengan berhati-hati dalam situasi berikut:

- dalam pesakit tua, terutamanya jika mereka mengalami demensia, kerana risiko penurunan tekanan darah dan mengantuk; jika pesakit mengalami kegagalan buah pinggang doktor anda boleh mengurangkan dos,
- jika anda mempunyai faktor risiko untuk strok, yang berlaku apabila aliran darah terganggu secara tiba-tiba di bahagian otak,
- Sekiranya anda atau ahli keluarga mempunyai sejarah darah beku, kerana mengambil ubat antipsikotik boleh menyebabkan pembentukan pembekuan darah,
- jika anda mempunyai penyakit buah pinggang (kegagalan buah pinggang), doktor anda boleh mengurangkan dos,
- jika anda mempunyai epilepsi atau penyakit Parkinson,
- jika anda mempunyai atau berisiko mengalami kencing manis (misalnya berat badan berlebihan atau sejarah kencing manis). Doktor anda harus memeriksa gula darah anda sebelum anda mula mengambil Solian dan kerap semasa rawatan.
- Sekiranya anda mempunyai sejarah hiperprolaktinemia (terlalu banyak

prolaktin dalam darah) atau tumor yang bergantung kepada prolaktin (prolaktin adalah hormon yang merangsang pengeluaran susu), misalnya penyakit kanser payudara atau pituitari. Jika ini berlaku, doktor anda perlu memantau anda dengan teliti semasa rawatan.

Masalah hati yang serius telah dilaporkan dengan pengambilan Solian. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami keletihan, kehilangan selera makan, loya, muntah, sakit perut, mata atau kulit menguning.

Semasa rawatan, jika anda mengalami ketegaran otot atau kehilangan otot yang berkaitan dengan sakit otot (*rhabdomyolysis*), dan jika anda mempunyai peningkatan dalam tahap enzim otot creatine phosphokinase (CPK) dalam darah dan gangguan dalam kesedaran disertai dengan demam yang tidak dapat dijelaskan: hentikan rawatan anda dengan segera dan berjumpa dengan doktor anda dengan segera kerana ini boleh membawa maut..

Jika, anda mengalami gangguan visual atau sakit kepala semasa rawatan, beritahudoktor anda dengan segera.

Sekiranya anda mengalami jangkitan atau demam yang tidak dapat dijelaskan, doktor anda mungkin menjalani ujian darah dengan segera. Ini kerana ubat ini mungkin mempunyai kesan ke atas sel darah anda, iaitu mengurangkan jumlah sel darah putih. Masalah ini boleh dilihat dalam ujian darah.

Rawatan dengan ubat ini tidak boleh tiba-tiba dihentikan kerana ini boleh menyebabkan sindrom "*withdrawal*". Ini dicirikan oleh tanda-tanda seperti insomnia, mual dan muntah. Pergerakan yang tidak normal juga boleh diperhatikan dan gangguan psikotik berulang.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah

SOLIAN[®] Tablet

Amisulpride (100mg, 400mg)

baru-baru ini mengambil apa-apa ubat-ubatan lain.

- Ejen-ejen sedatif yang boleh mempunyai kesan ketegangan tambahan pada sistem saraf pusat dan menyumbang kepada penurunan kewaspadaan: *Morphine derivatives* (analgesics, penahan batuk, dan rawatan pengganti), *neuroleptics*, *barbiturates*, *benzodiazepines*, *anxiolytics* bukan *benzodiazepine* (seperti *meprobamate*), *hypnotics*, ubat penenang antidepresan (*amitriptyline*, *doxepin*, *mianserine*, *mirtazapine*, *trimipramine*), sedatif *H1-antihistamine*, agen antihipertensi yang bertindak secara berpusat, *baclofen* dan *thalidomide*.
- Ubat-ubatan mungkin menyebabkan *torsades de pointes*
 - Diberi intravena *dolasteron*, *erythromycin*, *spiramycin*, dan *vincamine* boleh menyebabkan aritmia (*arrhythmia*). Menggunakan dua ubat *torsadogenic* (*torsadogenic*) bersama tidak dibenarkan.
 - *citalopram*, *escitalopram*, *domperidone*, *hydroxyzine* dan *piperaquine*
- Gabungan yang dikontraindikasi
 - Non-antiparkinsonian
- Agonis dopamin (*Dopamine agonists*) tidak termasuk antiparkinson (*cabergolin*, *quinagolide*)
 - *Citalopram*, *escitalopram*, *domperidone*, *hydroxyzine*, *piperaquine*, meningkatkan risiko aritmia ventrikel (*ventricular arrhythmias*), terutamanya *torsades de pointes*
- Kombinasi yang tidak dinasihatkan
 - *Antiparasitics* (*chloroquine*, *halofantrine*, *lumefantrine*, *pentamidine*)
- Ubat antiparkinson dopaminergic *Antiparkinsonian dopamine agonist* (*amantadine*, *apomorphine*, *bromocriptine*, *entacapone*, *lisuride*, *pergolide*, *piribedil*, *pramipexole*, *rasagiline*, *ropinirole*, *selegiline*)
- kelas IA *antiarrhythmics* (*quinidine*, *hydroquinidine*, *disopyramide*) dan kelas III *antiarrhythmics* (*amiodarone*, *dronedarone*, *sotalol*, *dofetilide*, *ibutilide*), dan ubat-ubatan lain seperti sebatian arsenik, , *diphenamil*,

dolasetron IV, *erythromycin IV*, *levofloxacin*, *mequitazine*, *mizolastine*, *prucalopride*, *vincamine IV*, *moxifloxacin*, *spiramycin IV*, *toremifene*, *vandetanib*.

- *Neuroleptics* lain (*chlorpromazine*, *cyamemazine*, *droperidol*, *flupenthixol*, *fluphenazine*, *haloperidol*, *levomepromazine*, *pimozide*, *pipamperone*, *pipotiazine*, *sertindole*, *sulpiride*, *sultopride*, *tiapride*, *zuclopenthixol*).

- Penggunaan alkohol, *levodopa*, *methadone*, *sodium oxybate*, *hydrochloroquine*

• Kombinasi yang memerlukan langkah berjaga-jaga untuk digunakan

- *Anagrelide*, *Azithromycin*, *Ciprofloxacin*, *clarithromycin*, *levofloxacin*, *norfloxacin*, *roxithromycin*

- *Beta-blocker* pada pesakit dengan kegagalan jantung (*bisoprolol*, *carvedilol*, *metoprolol*, *nebivolol*)

- Agen *Bradycardia* (terutamanya *antiarrhythmics* kelas IA, *beta-blocker*, *antiarrhythmics* kelas III tertentu, *calcium channel blockers* tertentu, *digitalis glycosides*, *pilocarpine*, agen *Anticholinesterase*)

- Agen mengurangkan kalium (diuretik yang mengurangkan kalium, bersendirian atau digabungkan, *laxative* perangsang, *glucocorticoids*, *tetracosactides* dan *IV amphotericin B*).

- *Lithium*, *ondansetron*

• Kombinasi yang perlu dipertimbangkan

- Ubat sedatif lain, *orlistat*

Mengandung, Menyusu bayi dan kesuburan

Sekiranya anda hamil atau menyusu, fikir anda mungkin mengandung atau merancang untuk mempunyai bayi, tanyakan nasihat doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kehamilan

Solian tidak disyorkan semasa kehamilan dan pada wanita yang berpotensi mengandung anak yang tidak menggunakan kontrasepsi yang berkesan.

Sekiranya anda menggunakan Solian dalam tempoh 3 bulan terakhir

kehamilan anda, bayi anda mungkin mengalami gangguan, peningkatan kekejangan otot, menggeletar secara sukarela, mengantuk, masalah bernafas atau kesukaran menyusu atau menyusu. Jika bayi anda mempunyai gejala-gejala ini, hubungi doktor anda dengan cepat.

Penyusuan susu ibu

Anda tidak boleh menyusu semasa rawatan dengan Solian. Tanya doktor anda tentang cara terbaik untuk menyusu bayi anda jika anda mengambil Solian.

Maklumat Penting tentang beberapa bahan dalam Solian:

Solian tablet mengandungi laktosa dan natrium

Ubat ini mengandungi sejenis gula (laktosa) yang dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Anda tidak harus menggunakan ubat ini jika anda mempunyai intoleransi galaktosa, kekurangan Lapp laktase atau glukosa / sindrom kekurangan penyerapan galaktosa (penyakit keturunan yang jarang berlaku).

Sekiranya doktor anda memberitahu anda bahawa anda tidak bertoleransi terhadap gula tertentu, hubunginya sebelum mengambil ubat ini.

Ubat ini mengandungi kurang daripada 1 mmol natrium (23 mg) setiap tablet, iaitu pada dasarnya 'bebas natrium'.

Cara menggunakan Solian

Sentiasa mengambil Solian tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti. Jangan berhenti rawatan sendiri. Ubat ini harus diambil melalui mulut. Menelan tablet dengan sedikit air.

-Berapa banyak harus digunakan

Jumlah Solian anda ambil akan bergantung kepada penyakit anda. Ikut arahan doktor anda dengan teliti.

Dewasa

- Dos yang biasa ialah antara 50mg dan 800mg setiap hari

SOLIAN[®] Tablet

Amisulpride (100mg, 400mg)

- Doktor anda mungkin akan memulakan anda dengan dos yang lebih rendah jika perlu
- Jika perlu, doktor anda boleh mempreskripsikan dos sehingga 1200mg setiap hari
- Dos sehingga 400mg setiap hari boleh diambil sebagai dos tunggal. Ambil dos pada masa yang sama setiap hari
- Dos melebihi 400mg perlu diambil sebagai separuh pada waktu pagi dan separuh pada waktu petang

Warga Tua

- Doktor anda perlu memberi lebih perhatian pada anda kerana anda lebih cenderung untuk mengalami tekanan darah rendah atau mengantuk dengan pengambilan ubat ini

Orang yang mempunyai masalah buah pinggang

- Doktor anda mungkin perlu memberi anda dos yang lebih rendah

Kanak-kanak dan remaja

- Ubat ini tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 15 tahun.
- Penggunaan ubat ini tidak disyorkan untuk kanak-kanak berumur antara 15 hingga 18 tahun.

-Bila perlu digunakan

- Ambil ubat ini dengan mulut
- Telan tablet anda secara keseluruhan dengan air minuman. Jangan mengunyah tablet anda
- Jika anda rasa kesan ubat anda terlalu lemah atau terlalu kuat, jangan mengubah dos diri sendiri, tetapi bincang dengan doktor anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Solian sehingga doktor anda memberitahu anda untuk berhenti. Jangan berhenti mengambil Solian hanya kerana anda berasa lebih baik. Jika anda berhenti, penyakit anda boleh menjadi lebih teruk atau kembali. Melainkan jika doktor anda memberitahu anda sebaliknya, Solian tidak harus dihentikan tiba-tiba. Menghentikan rawatan tiba-tiba boleh menyebabkan gejala seperti:

- Kesukaran tidur atau berasa amat resah

- Ketegangan otot atau pergerakan badan luar biasa
- Keadaan asal anda mungkin kembali

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil Solian: Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos terlupa. Ambil dos berikut pada masa yang biasa. Sekiranya anda terlupa beberapa dos, tanyakan nasihat doktor anda

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil ubat ini lebih daripada anda harus: Anda mungkin mengalami rasa mengantuk, tenang (kesan relaks), penurunan tekanan darah, gejala *extrapyramidal* (terutamanya gemetar dan kekejangan otot) atau anda mungkin koma. Sekiranya ini berlaku, adalah penting anda atau keluarga / kawan anda memanggil doktor atau perkhidmatan perubatan kecemasan.

Semasa menggunakan Solian

-Perkara yang perlu dilakukan

- Memberitahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Solian.
- Jika anda akan memulakan sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda mengambil Solian.
- Mengambil Solian boleh menjejaskan keputusan beberapa ujian darah. Ini termasuk ujian untuk mengukur hormon yang dipanggil 'prolaktin' dan ujian hati. Jika anda akan menjalani ujian darah, adalah penting untuk memberitahu doktor anda mengambil Solian.
- Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan melainkan jika doktor anda memberitahu anda. Ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.
- Jangan minum alkohol sebelum atau selepas mengambil ubat ini. Ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian **Memandu dan menggunakan mesin**

Ubat ini boleh menyebabkan mengantuk dan penglihatan kabur. Anda harus berhati-hati jika anda memandu kenderaan atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Solian boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatkannya.

Jika, semasa rawatan, anda mengalami kekejangan otot dan gangguan kesedaran, bersama-sama dengan demam yang tidak dapat dijelaskan, menghentikan rawatan serta-merta dan dapatkan rawatan perubatan segera. Kesan sampingan berikut adalah sangat biasa (memberi kesan kepada lebih daripada 1 pesakit dalam 10):

- menggeletar, kekejangan otot, kekejangan, pergerakan yang tidak normal, menghasilkan lebih banyak air liur daripada biasa.

Kesan sampingan berikut adalah biasa (memberi kesan kepada 1 hingga 10 pesakit dalam 100):

- leher kaku, krisis "oculogyric" (pergerakan yang tidak normal pada otot mata tertentu), penguncupan rahang,
- mengantuk,
- insomnia, keresahan, kebimbangan,
- sembelit, loya, muntah, mulut kering.
- kekurangan keseronokan seksual pada wanita
- hiperprolaktinemia (terlalu banyak prolaktin, hormon yang mendorong pengeluaran susu, dalam darah), yang boleh menyebabkan:
 - o pada wanita: tempoh tiada haid, pengeluaran susu tidak normal, sakit payudara,
 - o pada lelaki: bengkak payudara, mati pucuk.
- peningkatan berat badan,

SOLIAN[®] Tablet

Amisulpride (100mg, 400mg)

- tekanan darah rendah (hipotensi),
- penglihatan kabur,

Kesan sampingan berikut jarang berlaku (menjejaskan 1 hingga 10 pesakit dalam 1 000):

- pergerakan sukarela daripada lidah dan/atau muka
- sawan (secara tidak sengaja kontraksi satu atau lebih otot)
- hiperglisemia (terlalu banyak gula dalam darah)
- hipertrigliseridemia (banyak lemak (trigliserida) dalam darah)
- hiperkolesterolemia (terlalu banyak kolesterol dalam darah)
- degupan jantung perlahan
- peningkatan tahap enzim hati tertentu, terutamanya transaminase
- kecederaan tisu hati
- mengurangkan ketumpatan tulang atau perubahan dalam struktur tulang (osteopenia, osteoporosis), melemahkan tulang
- tindak balas alahan
- kekeliruan
- hidung tersumbat
- gangguan paru-paru (pneumonia aspirasi) yang mungkin muncul sebagai keradangan, kesukaran bernafas, jangkitan, batuk (terutamanya digabungkan dengan ubat lain dengan kesan penekan saraf pusat),
- peningkatan tekanan darah
- kesukaran membuang air kecil
- *leukopenia, neutropenia* .

Kesan sampingan berikut jarang berlaku (menjejaskan 1 hingga 10 pesakit dalam 10 000):

- agranulositosis (tahap rendah sel darah putih)
- tumor pituitari benigna, yang boleh menyebabkan tanda-tanda sedemikian sebagai gangguan penglihatan atau sakit kepala
- penurunan dalam jumlah natrium dalam darah (hyponatremia), sindrom tidak sesuai hormon antidiuretik rembesan
- demam yang tidak dapat dijelaskan dengan umum dan gangguan saraf
- pengsan yang serius (kehilangan kesedaran), irama jantung gangguan yang mungkin menyebabkan kematian
- bengkak, sakit dan kemerahan

daripada bahagian kaki. Ini adalah kerana darah beku dalam urat (terutama di bahagian kaki) boleh bergerak melalui saluran darah untuk mencapai paru-paru, menyebabkan sakit dada dan kesukaran pernafasan

- muka bengkak secara tiba-tiba dan/atau leher yang boleh membawa kepada kesukaran bernafas dan mungkin mengancam nyawa (angioedema), merah, gatal tompok pada kulit (gatal).

Kesan sampingan berikut mungkin berlaku, tetapi kekerapan tidak diketahui:

- sindrom “*withdrawal*” pada bayi baru lahir.
- sindrom kaki gelisah (perasaan tidak selesa di kaki yang sementara dilepaskan oleh pergerakan, dan lebih buruk pada penghujung hari).
- peningkatan kepekaan kulit apabila terdedah kepada sinar matahari dan cahaya ultraviolet.
- peningkatan sensitiviti kulit apabila terdedah kepada matahari dan sinar ultraviolet
- jatuh kerana kehilangan keseimbangan yang mungkin melibatkan patah tulang.
- pemusnahan serat otot dan sakit otot (*rhabdomyolysis*),
- peningkatan tahap creatine phosphokinase dalam darah (ujian darah menunjukkan kecederaan otot).

Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- Peningkatan paras gula darah dan / atau gejala gula darah tinggi (contohnya peningkatan rasa dahaga, peningkatan rasa lapar, dan kencing yang kerap)
- Sensasi kaki yang tidak menyenangkan dan keinginan untuk menggerakkan kaki (sindrom kaki gelisah)
- Masalah pernafasan semasa tidur (apnea tidur)
- Kesukaran atau ketidakupayaan untuk mengeluarkan air kencing (*urinary retention*)

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika ada kesan-kesan sampingan yang serius atau berterusan lebih lama daripada beberapa hari, atau jika anda

mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my ([\[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines \(ConSERF\) or Vaccines \(AEFI\)\]](#)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Solian

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang sebarang aspek perubahan anda, atau sebarang pertanyaan mengenai maklumat di dalam risalah ini, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Penyimpanan

- Simpan ubat ini di tempat yang selamat di mana kanak-kanak tidak dapat melihat atau mencapai.
- Jangan gunakan Solian selepas tempoh tarikh tamat yang dinyatakan pada kotak itu. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.
- Jangan gunakan Solian jika anda mendapati tablet sudah berubah warna.
- Simpan di bawah suhu 30°C, jauh dari haba dan kelembapan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

- 100mg Solian berwarna putih dengan garisan tengah, terukir "AMI 100". Ubat dibekalkan dalam pek blister 30.
- Solian tablet bersalut filem 400mg berwarna putih, dengan garisan tengah, terukir "AMI 400". Ubat dibekalkan dalam pek blister 30.

SOLIAN[®] Tablet

Amisulpride (100mg, 400mg)

Bahan-bahan kandungan:

• Bahan-bahan aktif:

Tablet mengandungi 100mg atau 400mg bahan aktif, *amisulpride*.

• Bahan-bahan tidak aktif dalam Tablet

Solian 100mg adalah *sodium starch glycolate, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose,*

hypromellose dan *magnesium stearate*.

• Bahan-bahan tidak aktif dalam Tablet

Solian 400mg adalah *sodium starch glycolate, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose,*

hypromellose, magnesium stearate, polyoxyl 40 stearate dan *titanium dioxide*.

Number MAL:

Tablet Solian 100mg:

MAL20032239ACZ

Tablet Solian 400mg:

MAL20032240ACZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Pengilang

Delpharm Dijon

6, Boulevard De L'Europe,

21800 Quetigny, France.

Pemegang Pendaftaran Produk

Sanofi-aventis (Malaysia) Sdn. Bhd.

Unit TB-18-1,

Level 18-1, Tower B, Plaza 33

No.1 Jalan Kemajuan,

Seksyen 13,

46200 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/06/2024

Nombor Siri: NPRA (R1/3)

14062024/118