

BIOTASE CHEWABLE TABLET

Biodiastase/Lipase/Newlase (30mg/5mg/10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Biotase Chewable Tablet
2. Bagaimana Biotase Chewable Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Biotase Chewable Tablet
4. Cara menggunakan Biotase Chewable Tablet
5. Semasa menggunakan Biotase Chewable Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Biotase Chewable Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Biotase Chewable Tablet

Biotase Chewable Tablet digunakan untuk membantu melegakan masalah penghadaman dan perut seperti kembung perut, sendawa, ketidakselesaan perut atau terlampau kenyang.

Bagaimana Biotase Chewable Tablet berfungsi

Biotase Chewable Tablet mengandungi tiga enzim pencernaan (biodiastase, lipase dan newlase) yang membantu tubuh anda memecahkan karbohidrat, lemak dan protein dengan lebih berkesan. Dengan meningkatkan proses pencernaan secara keseluruhan, ia membantu melegakan masalah penghadaman, kembung perut, angin, sendawa dan rasa kenyang selepas makan.

Sebelum menggunakan Biotase Chewable Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap biodiastase, lipase, newlase atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- Sebelum menggunakannya
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Biotase

Chewable Tablet jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan lain.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Biotase Chewable Tablet

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk dewasa dan kanak-kanak berumur lebih dari 12 tahun: 2 hingga 3 tablet dikunyah tiga kali sehari selepas makan.

- Bila perlu digunakan

Ambil tiga kali sehari, selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan

keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kesan najis cair atau cirit-birit, tetapi ia tidak akan memberi kesan serius kepada bahagian tubuh yang lain.

Semasa menggunakan Biotase Chewable Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor anda.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Biotase Chewable Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Biotase Chewable Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami sebarang tindak balas alahan, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan rawatan yang sesuai.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Biotase Chewable Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah loya, kekejangan perut, dan/atau cirit-birit di kalangan pesakit, terutamanya apabila diambil dalam dos yang tinggi.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Biotase Chewable Tablet

- *Penyimpanan*

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- *Pelupusan*

Biotase Chewable Tablet perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Tablet berbentuk bulat dengan berwarna kelabu coklat

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif
 - Biodiastase
 - Lipase
 - Newlase

- Bahan tidak aktif

- Potato Starch
- Lactose
- Carboxymethylcellulose Calcium
- Calcium carbonate
- Magnesium Trisilicate
- Mannitol
- Magnesium Aluminometasilicate
- Hydroxypropylcellulose
- Talc
- Sodium Saccharin
- Magnesium Stearate
- Milk Flavour Powder
- Coconut Flavour

- *Nombor MAL*

MAL19992594X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y. S. P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

20/11/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)171125/00075