

YSP ANTIFUNGAL CREAM

Miconazole Nitrate (20mg/1g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan YSP ANTIFUNGAL CREAM
2. Bagaimana YSP ANTIFUNGAL CREAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM
4. Cara menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM
5. Semasa menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan YSP ANTIFUNGAL CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan YSP ANTIFUNGAL CREAM

YSP ANTIFUNGAL CREAM digunakan secara topikal untuk merawat jangkitan kulit yang disebabkan oleh kulat dan yis tertentu.

Bagaimana YSP ANTIFUNGAL CREAM berfungsi

YSP ANTIFUNGAL CREAM mengandungi bahan aktif miconazole, iaitu antikulat. Ia berfungsi dengan menghalang pertumbuhan kulat dan seterusnya menghalang jangkitan.

Sebelum menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap miconazole nitrate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- Sebelum menggunakan
Jangan gunakan krim ini jika anak anda berumur di bawah 2 tahun, kecuali di bawah nasihat dan pengawasan doktor.

Kehamilan dan menyusukan anak

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan bayi sebelum menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda:

- sedang mengambil warfarin (ubat cair darah)
- mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari

farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan secukupnya ke atas yang tempat yang dijangkiti.

- Bila perlu digunakan

Sapu sekali atau dua kali sehari, bergantung kepada jenis jangkitan atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Tempoh rawatan adalah di antara 2 minggu hingga 1 bulan bergantung kepada jenis jangkitan anda.

Anda mungkin berasa lebih baik dalam masa 2 hingga 3 hari selepas memulakan rawatan.

Jika kerengsaan berlaku, atau tiada perubahan dilihat dalam tempoh 1 bulan rawatan, hentikan krim dan dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan YSP ANTIFUNGAL CREAM

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi YSP ANTIFUNGAL CREAM kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan krim jika berlaku sebarang kerengsaan atau kulit menjadi lebih sensitif.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, YSP ANTIFUNGAL CREAM boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan termasuk:

- Kerengsaan kulit
- Rasa terbakar
- Kegatalan
- Kulit menjadi lembut dan mudah pecah
- Reaksi alahan kulit
- Jarang berlaku: kekejangan perut, geligata, ruam, sakit kepala

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan YSP ANTIFUNGAL CREAM

- Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim yang berwarna putih

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap gram krim mengandungi:

Miconazole Nitrate 20mg

- Bahan tidak aktif

Sorbitan monostearate

Methyl Paraben

Propyl Paraben

Stearic Acid

Dimethylpolysiloxane

Propylene Glycol

Sodium Citrate

Fleurs Des Champs

Polysorbate 60

Purified water

Cetyl Alcohol

Lanolin anhydrous

Miglyol 812

Spermaceti synthetic

- Nombor MAL

MAL19930608AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran kilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

16/07/2025

Nombor siri:

NPRA(R4/1)100724/00088