

DOXYMYCIN CAPSULE

Doxycycline Hydrochloride (100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Doxymycin Capsule
2. Bagaimana Doxymycin Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Doxymycin Capsule
4. Cara menggunakan Doxymycin Capsule
5. Semasa menggunakan Doxymycin Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Doxymycin Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Doxymycin Capsule

- Jangkitan paru-paru dan saluran pernafasan yang lain (contohnya, pneumonia)
- Jangkitan saluran kencing
- Jangkitan mata
- Penyakit jangkitan seksual
- Jerawat

Bagaimana Doxymycin Capsule berfungsi

Doxymycin capsule mengandungi bahan aktif doxycycline yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai tetracyclines. Ia berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Doxymycin Capsule

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

anda mempunyai alahan terhadap doxymycin hydrochloride atau kumpulan tetracycline, atau mana-mana bahan kandungan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakannya

Beritahu doktor anda jika anda:

- mempunyai penyakit hati atau sedang mengambil ubat yang memberi kesan kepada organ hati.
- mempunyai penyakit buah pinggang
- pernah mengalami cirit-birit selepas mengambil ubat antibakteria

- mempunyai penyakit sistemik lupus erythematosus (SLE), iaitu satu keadaan autoimun.
- disyaki menghidapi penyakit *syphilis*
- Bagi kanak-kanak yang masih dalam tempoh perkembangan gigi (semasa bayi dan kanak-kanak sehingga umur 8 tahun), penggunaan hanya dibenarkan jika benar-benar perlu, kerana ia boleh menyebabkan perubahan warna gigi secara kekal.

Hamil dan menyusukan anak

Sila berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang hamil, merancang untuk hamil, atau menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Jangan ambil Doxymycin Capsule jika anda sedang hamil, merancang untuk hamil, atau berada pada separuh akhir tempoh kehamilan. Ini kerana ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius dan kekal kepada bayi yang sedang berkembang, terutamanya perubahan warna gigi kepada kuning-kelabu-coklat serta masalah pada perkembangan enamel dan tulang. Doktor anda hanya akan menetapkan Doxymycin sekiranya dianggap benar-benar perlu, kerana risiko kemudaran kepada bayi adalah tinggi.

Anda juga harus mengelakkan pengambilan ubat ini semasa menyusukan bayi. Ubat ini boleh disalurkan kepada bayi melalui susu ibu dan mungkin menjejaskan perkembangan gigi serta tulang mereka. Sila berbincang dengan doktor anda mengenai pilihan ubat lain yang lebih selamat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Ini termasuk:

- ubat warfarin atau ubat lain untuk mencegah pembekuan darah.
- penisilin atau kumpulan tetrasiklin lain (sejenis antibiotik).
- ubat hepatotoksik (ubat-ubatan yang menjejaskan hati anda).

- ubat-ubat antasid yang mengandungi aluminium, kalsium, magnesium atau ubat-ubatan lain yang mengandungi besi, bismuth atau garam zink.
- ubat untuk merawat sawan (contohnya barbiturates, carbamazepine, phenytoin).

Sila beritahu doktor perubatan, jururawat atau doktor pergigian bahawa anda sedang mengambil Doxymycin Capsule jika anda perlu menjalani pembedahan.

Cara menggunakan Doxymycin Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa (kebanyakan jangkitan):

- Hari pertama: 2 biji (sama ada sekali gus atau 1 biji setiap 12 jam).
- Kemudian: 1 biji setiap hari.
- Tempoh rawatan biasa: kira-kira 10 hari (lebih lama bagi jangkitan yang teruk).

Kanak-kanak (dengan berat badan 50 kg atau kurang):

- Dos bergantung kepada berat badan (doktor akan menentukan dos yang sesuai).
- Kanak-kanak melebihi 50 kg: gunakan dos dewasa.

Jangkitan lain:

- Jerawat: 1 biji setiap hari, sehingga 12 minggu.
- Gonorrhoea (jangkitan kelamin lelaki): 2 biji setiap hari dalam dos berasingan selama 2–4 hari.
- Gonorrhoea (jangkitan kelamin wanita): 1 biji dua kali sehari sehingga sembuh.
- *Non- gonococcal Urethritis*: 3 biji setiap hari dalam dos berasingan sekurang-kurangnya selama 10 hari.
- Jangkitan *chlamydia* (urogenital, rektum, tekak): 1 biji dua kali sehari selama 7 hari.

- Bila perlu digunakan

Ambil sekali atau dua kali sehari, atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil Doxymycin Capsule untuk tempoh yang disarankan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan
Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Doxymycin Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Doxymycin Capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan Doxymycin Capsule hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Doxymycin Capsule kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan pendedahan kepada cahaya matahari yang terik atau cahaya UV

(contohnya, prosedur menggelapkan kulit (tanning)), kerana Doxymycin boleh menjadikan kulit anda lebih sensitif terhadap cahaya matahari dan menyebabkan ruam kulit, kegatalan, kemerahan, atau selaran matahari yang teruk. Jika perkara ini berlaku, hentikan pengambilan ubat dan maklumkan kepada doktor anda.

Reaksi Jarisch-Herxheimer (demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot, ruam kulit) mungkin berlaku sejurus selepas memulakan rawatan bagi jangkitan yang disebabkan oleh spiroket (seperti penyakit Lyme).

Ubat ini juga boleh menyebabkan keputusan positif palsu dalam sesetengah ujian air kencing. Maklumkan kepada doktor atau jururawat bahawa anda sedang mengambil Doxymycin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Doxymycin Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan termasuk:

- gangguan gastrousus termasuk hilang selera makan, loya/muntah, cirit-birit, lidah, mulut atau bibir yang bengkak dan kesukaran menelan
- kerengsaan/kesakitan di kawasan anogenital
- ruam kulit dengan benjolan merah, gatal, bengkak di bawah permukaan kulit
- gejala teruk seperti anafilaksis (reaksi alahan yang mengancam nyawa)
- keadaan seperti lupus yang semakin teruk (lupus eritematosus sistemik)
- keradangan lapisan jantung (perikarditis)
- Kiraan darah atau gangguan darah yang tidak normal
- Urea darah tinggi (yang menunjukkan pengurangan fungsi buah pinggang), terutamanya dengan dos yang tinggi
- Sakit kepala yang teruk, penglihatan kabur, muntah akibat tekanan meningkat di sekitar otak (benign intracranial hypertension).
- Benjolan pada bahagian lembut kepala bayi (fontanelle).

- Tompok bulat atau bujur berwarna kemerahan dan bengkak pada kulit yang muncul semula di tempat yang sama setiap kali ubat diambil (*fixed eruption*)

Doxymycin Capsule boleh menyebabkan reaksi Jarisch-Herxheimer yang terdiri daripada demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot dan ruam kulit. Reaksi berlaku sejurus selepas memulakan Doxymycin Capsule dan selalunya akan sembuh tanpa memerlukan rawatan.

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Doxymycin Capsule

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C dan elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul # 2 gelatin keras berwarna hijau tua yang mengandungi serbuk kuning.

- Bahan-bahan kandungan

- **Bahan aktif**
Doxycycline Hydrochloride

- **Bahan tidak aktif**
Lactose
Silicon Dioxide
Talc
Magnesium Stearate

- Nombor MAL
MAL19930601AZ

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang Selangor, Malaysia.

Tarik kemaskini RiMUP
26/02/2026

Nombor Siri
NPRA(R4/1)300925/00071