

DERMOSOL CREAM

Clobetasol Propionate (0.5mg/1g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan DERMOSOL CREAM
2. Bagaimana DERMOSOL CREAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan DERMOSOL CREAM
4. Cara menggunakan DERMOSOL CREAM
5. Semasa menggunakan DERMOSOL CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan DERMOSOL CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan DERMOSOL CREAM

DERMOSOL CREAM digunakan untuk rawatan keradangan dan kegatalan yang sederhana hingga teruk dalam jangka masa pendek. Contohnya, psoriasis, ekzema dan lain-lain keadaan yang tidak bertambah baik selepas menggunakan steroid yang kurang poten.

Bagaimana DERMOSOL CREAM berfungsi

DERMOSOL CREAM berfungsi dengan cara menghentikan tindak balas imun yang melampau. Apabila sistem imun dalam keadaan stabil, keradangan dan kegatalan akan bertambah baik.

Sebelum Menggunakan DERMOSOL CREAM

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan sapu DERMOSOL CREAM:

- Jika anda hipersensitif terhadap Clobetasol Propionate, sebarang corticosteroids atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk ini.
- Jika anda mengalami kemerahan, jerawat dan kulit kering, kerengsaan, kegatalan kawasan dubur atau alat kelamin pada kanak-kanak di bawah umur satu tahun, termasuk keradangan kulit dan ruam lampin.
- Jika anda mengalami jangkitan virus (cth. herpes simplex, cacar air), kulat (cth. kurap) atau bakteria (cth. ruam bernanah).

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda alah kepada sebarang ubat atau anda mengandung atau sedang menyusui.

Ia tidak boleh digunakan jika anda hamil, merancang untuk hamil dan semasa menyusui.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda ingin menggunakan DERMOSOL CREAM bersama dengan ubat-ubatan lain.

Cara menggunakan DERMOSOL CREAM

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada kawasan kulit yang terjejas.

-Bila perlu digunakan

Sapukan dua kali sehari, sekali pada waktu pagi dan pada waktu malam.

Jangan menggunakan jumlah melebihi 50g dalam seminggu.

-Berapa lama perlu digunakan

Hentikan penggunaan DERMOSOL CREAM apabila keadaan sudah terkawal. Dalam keadaan yang lebih responsif, ia mungkin hanya memerlukan beberapa hari sahaja.

Rawatan mesti dihadkan sehingga 14 hari. Sekiranya tiada perubahan, sila berjumpa dengan doktor anda.

Bahagian kulit di muka lebih mudah mengalami kesan sampingan setelah rawatan berpanjangan dengan kortikosteroid. Jika boleh, hadkan penggunaannya hanya untuk 5 hari sahaja.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda terlupa menggunakannya.

Sapukan dos yang terlupa sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir waktunya untuk dos seterusnya, tunggu hingga dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal itu. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau orang lain mungkin telah terlebih menggunakan ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Dos berlebihan dalam jangka panjang boleh mengakibatkan Sindrom Cushing seperti tanda regangan, tumbesaran terbantut bagi kanak-kanak, obesiti, bulu berlebihan pada wanita, dan benjolan lemak di bahagian antara bahu.

Semasa menggunakan DERMOSOL CREAM

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda apabila anda sedang menggunakan DERMOSOL CREAM.

Hentikan penggunaan DERMOSOL CREAM jika mengalami iritasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan hentikan penggunaan ubat ini atau mengubah dos tanpa arahan doktor. Rawatan perlu dihentikan dengan beransur-ansur untuk mengelakkan gejala menjadi lebih teruk.
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan gunakan DERMOSOL CREAM dengan pembalut oklusif seperti lampin bayi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Penggunaan DERMOSOL CREAM berterusan untuk jangka masa panjang harus dielakkan pada bayi dan kanak-kanak di mana penekanan adrenal mudah berlaku. Penggunaan pada kanak-kanak harus dinilai setiap minggu. Jika digunakan pada kelopak mata, pastikan sapuan tidak memasuki mata kerana glaukoma mungkin terjadi.
- Antibiotik akan diberikan untuk merawat kulit yang telah dijangkiti.
- Kortikosteroid perlu dihentikan jika jangkitan meneruk.
- Bersihkan kulit anda sebelum menggunakan pembalut yang baharu.

Kesan-kesan sampingan

DERMOSOL CREAM mungkin menyebabkan rasa terbakar, kerengsaan dan kegatalan. Kesan sampingan yang tidak kerap berlaku adalah seperti pedih, rekahan, kemerahan, kebas jari, penipisan pada kulit, perubahan pigmentasi dan hipersensitiviti.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://nptra.gov.my> (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan dalam bekas kedap udara di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau sampah di rumah. Rujuk ahli farmasi anda bagaimana melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih kekuningan.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:-

Clobetasol Propionate

Bahan Tidak Aktif:-

Propylene Glycol

Dimethicone

Methyl Paraben

Propyl Paraben

Cremophor

Procys

Transcutol

Emulgade 1000NI

Isopropyl Myristate

-Nombor MAL

MAL19962581AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)250222/00014