

YSP NYSTATIN CAPSULE

Nystatin (500,000 units)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan YSP Nystatin Capsule
2. Bagaimana YSP Nystatin Capsule berfungsi.
3. Sebelum menggunakan YSP Nystatin Capsule
4. Cara menggunakan YSP Nystatin Capsule
5. Semasa menggunakan YSP Nystatin Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan YSP Nystatin Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan YSP Nystatin Capsule

YSP Nystatin Capsule digunakan untuk merawat dan mencegah jangkitan yis dan kulat di dalam usus.

Bagaimana YSP Nystatin Capsule berfungsi

YSP Nystatin Capsule ialah agen antikulat yang menghalang pertumbuhan dan membunuh pelbagai jenis yis dan kulat dengan melumpuhkan fungsi di sel organisma.

Sebelum Mengambil YSP Nystatin Capsule

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil YSP Nystatin Capsule jika anda mempunyai alahan terhadap nystatin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).

- Sebelum menggunakan YSP Nystatin Capsule

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan YSP Nystatin Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi. Ambil 1 hingga 2 kapsul.

- Bila perlu digunakan

Ambil tiga kali sehari atau seperti arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan kapsul ini selama sekurang-kurangnya 2 hari selepas sembuh untuk mengelakkan jangkitan daripada datang kembali.

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan YSP Nystatin Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan YSP Nystatin Capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan YSP Nystatin Capsule hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi YSP Nystatin Capsule kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan YSP Nystatin Capsule terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan biasa

Seperti semua ubat-ubatan, YSP Nystatin Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatkannya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah cirit-birit, gangguan gastrousus, mual, dan muntah. Kesan sampingan yang lain dilaporkan adalah kerengsaan mulut dan ruam termasuk gegata, dan kesan sampingan yang jarang seperti *Steven Johnson Syndrome* (gangguan hipersensitiviti yang mempengaruhi kulit, membran mukus, kemaluan dan mata).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada

YSP NYSTATIN CAPSULE

Nystatin (500,000 units)

Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Tarikh kemaskini RiMUP :
26/11/2025

Nombor Siri
NPRA(R4/1)270722/00047

Cara penyimpanan dan pelupusan

- Penyimpanan

Simpan di dalam bekas kedap udara.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul keras berwarna merah keperangan dan merah jambu. Kapsul ini mengandungi serbuk kuning.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:-

Nystatin

- Bahan-bahan tidak aktif:-

Silicon dioxide, lactose, magnesium stearate, talc, povidone, sarung kapsul dan isopropyl alcohol.

- Nombor MAL

MAL 19985960AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.