YUCOMY TABLET

Ketoconazole (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini
Risalah ini mengandungi informasi berikut:

1. Apakah kegunaan YUCOMY TABLET 200MG
2. Bagaimana YUCOMY TABLET 200MG berfungsi
3. Sebelum mengambil YUCOMY TABLET 200MG
4. Cara menggunakan YUCOMY TABLET 200MG
5. Semasa menggunakan YUCOMY TABLET 200MG
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan YUCOMY TABLET 200MG
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *YUCOMY TABLET 200MG*
YUCOMY TABLET 200MG digunakan terutamanya untuk merawat atau mencegah jangkitan kulat di dalam darah.

Bagaimana *YUCOMY TABLET* 200MG berfungsi
Ketoconazole merupakan ejen antikulat kimia spektrum luas yang merosakkan membran dinding sel kulat dan menghalang biosintesis protein dan enzim kulat yang penting untuk kehidupan kulat.

Sebelum Mengambil *YUCOMY TABLET 200MG*
Bila tidak boleh mengambil
Jika anda alah kepada *ketoconazole* atau mana-mana komponen dalam *YUCOMY TABLET 200MG.* Jangan mengambil *YUCOMY TABLET 200MG* jika anda hamil atau menyusu.

Sebelum mula mengambil
Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda alah pada sebarang ubat atau mempunyai masalah kesihatan yang lain (eg. kekurangan adrenal, ketiadaan asid gastrik (*achlorhydria)*, sejarah penyakit hati).

Jika mengambil ubat-ubat lain
Dapatkan perhatian doktor atau ahli farmasi nasihat anda jika anda ingin menggunakan *YUCOMY TABLET 200MG* bersama-sama dengan ubat-ubatan lain.
Pengambilan bersama dengan:

- Alkohol dan ubat *hepatoxicity* (untuk merawat kecederaan hati) akan menyebabkan ketoksikan hati (*hepatotoxicity*)
- Antacids atau *antihistamine H2-receptor antagonists* (untuk merawat pengeluaran jus gastrik yang berlebihan) akan menyebabkan penurunan drastik atas penyerapan *Ketoconazole*
- Ubat antikoagulant akan meningkat kesan penipisan darah
- *Isoniazid* atau *Rifamcipin* (untuk rawatan jangkitan bakteria) sama ada makan bersama atau berasingan, boleh menyebabkan penurunan drastik konsentrasi *Ketoconazole* dalam darah
- *Terfinadine* dan *Astemizole* (untuk merawat kes alahan) boleh menyebabkan ketoksikan jantung (*cardiotoxicity*)
- *Cyclosporine* dalam darah akan meningkat dan mungkin menyebabkan ketoksikan buah pinggang (*nephrotoxicity*)
- *Methyl Prednisolone* akan menurunkan kadar metabolisme dan penyingkirannya (*clearance*) maka dos *Methyl Prednisolone* harus dikurangkan
- *Benzodiazepines* (*Midazolam* dan *Triazolam*) mungkin menambah (*potentiate*) dan memanjangkan sifat pukau (*hypnotic*) dan kesan sedatif, terutamanya dengan dos berulangan atau pengambilan jangka masa panjang ubat tersebut

Cara menggunakan *YUCOMY TABLET 200MG*
Berapa banyak harus diguna
Dewasa: 1-2 tablet sehari.
Kanak-kanak (berumur 2 tahun ke atas)
Berat badan harian antara 3.3-6.6MG/kg
Jangka masa rawatan: Jangkitan kulat (*Paracoccidioidomycosis, Chromomycosis, histoplasmosis, coccidioidomycosis, dan blastomycosis*): 3 – 6 bulan.
Rawatan patut diteruskan sehingga semua simptom hilang. Diambil mengikut arahan doktor.

Bila perlu diambil
Perlu diambil bersama dengan makanan.

Berapa lama perlu diambil
Sila ambil *YUCOMY TABLET 200MG* mengikuti nasihat doktor.

Jika terlupa mengambil
Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, abaikan dos yang terlupa, berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

Jika mengambil terlebihan (terlebih dos)
Gejala dos berlebihan termasuklah hepatitis (air kencing berwarna gelap, hilang selera makan, najis berwarna pucat, sakit perut, lesu atau kelemahan, mata atau kulit kekuning-kuningan) dan alahan (ruam kulit atau gatal-gatal).

Semasa menggunakan *YUCOMY TABLET 200MG*
Perkara yang perlu dilakukan
Ikut arahan doktor anda apabila anda mengambil *YUCOMY TABLET 200MG*. Anda perlu melaporkan tanda-tanda kesan sampingan atau gejala hepatitis seperti tiada selera makan, loya, muntah, keletihan, demam kuning, sakit perut atau air kencing gelap kepada doktor secara segera. Jika kejadian tersebut berlaku, *YUCOMY TABLET 200MG* perlu dihentikan serta merta dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian
Risiko hepatitis meningkat apabila dirawat secara berpanjangan dengan tablet *ketoconazole*, wanita lebih 50 tahun, rawatan dengan ubat griseofulvin sebelum mengguna *YUCOMY TABLET 200MG*, sejarah penyakit hati, ketidaksesuaian terhadap ubat tertentu dan penggunaan serentak ubat yang kompromi fungsi hati.

Kesan-kesan sampingan
Biasanya produk ini dapat diterima oleh tubuh dengan baik. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuklah loya & muntah, sakit perut, cirit-birit, sakit kepala, pening, mengantuk, demam, menggigil, mata sensitif terhadap cahaya (fotofobia) dan kulit gatal.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

YUCOMY TABLET

Ketoconazole (200mg)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]*.

Cara penyimpanan dan pelupusan

Cara penyimpanan


Simpan dalam bekas yang kedap udara. Simpan di bawah suhu 30ºC, elakkan daripada terdedah kepada keadaan panas dan lembap.

Cara pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet berwarna kelabu-kekuningan, satu belah diembos dengan satu skor, manakala sebelah lagi diembos dengan tanda “ 

”.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:-
Ketoconazole

Bahan Tidak Aktif:-
Lactose
Starch
Quinoline Yellow
Sunset Yellow Lake
Sodium Starch Glycolate
Hydroxyproply Cellulose
Talc
Magnesium Stearate
Magnesium Aluminometasilicate

Nombor MAL

MAL 19986498AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/09/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)170719/00194