

VIRLESS CREAM

Acyclovir (50mg/g)

What is in this leaflet

1. What VIRLESS CREAM is used for
2. How VIRLESS CREAM works
3. Before you use VIRLESS CREAM
4. How to use VIRLESS CREAM
5. While you are using VIRLESS CREAM
6. Side effects
7. Storage and disposal of VIRLESS CREAM
8. Product description
9. Manufacturer and Product Registration Holder
10. Date of Revision

What VIRLESS CREAM is used for

It is used for skin infection caused by Herpes Simplex virus (cold sores) including initial and recurrent genital herpes (genital infection) and herpes labialis (infection of mouth area).

How VIRLESS CREAM works

Aciclovir is converted to a more active form inside cells of the body that is infected with herpes viruses. The activated acyclovir then works by reducing the severity and duration of cold sores symptoms.

Before you use VIRLESS CREAM

When you must not apply it

Do not use VIRLESS CREAM if you are allergic or hypersensitivity to acyclovir or any other ingredients in this product.

Before you start to use it

Tell your doctor or pharmacist if you are pregnant, breastfeeding or using other medicine. Your doctor will decide whether VIRLESS CREAM is suitable for you.

Taking other medicines

Seek for your doctor or pharmacist advice if you intended to use VIRLESS CREAM together with other medication. VIRLESS CREAM can cause unwanted effect with probenecid (gout medicine) and other medicines that affect kidney function. Besides, you must also inform them about all the medicines you are taking, including those without a prescription.

How to use VIRLESS CREAM

How much to use

Apply 5 times a day at approximately 4 hour interval.

When to use it

Use as directed by your doctor or pharmacist. Your doctor will start the treatment as early as possible after the infection is confirmed.

How long to use it

Follow your doctor's advice. Usually treatment is continued for 5 days. If after 5 days, healing is not complete then doctor may advise you to continue for a further 5 days.

If you forgot to use it

If you forget to use the, apply it as soon as possible and then continue the rest of the treatment as usual.

If you apply too much (overdose)

Toxicity is unlikely to occur as there is only limited absorption on the skin.

While you are using it

Things you must do

Always use this exactly as described on the label or as your doctor or pharmacist has told you. Promptly discontinue application of VIRLESS CREAM if found sensitivity or irritation after using it.

Things you must not do

Avoid contact to the eyes or keep it at the place that can be reached by children. Do not ingest this medication. In case of accidental ingestion, immediately rush to the nearest hospital as you may need medical attention.

Things to be careful of

VIRLESS CREAM is intended to be applied on the skin and is not recommended for application to mouth, or vaginal mucous membrane. It should not be used during pregnancy.

Side effects

Some of the reported side effects are burning and stinging, itchiness and rash.

If encounter any other side effects or if any of the above stated side effects prolonged or become serious, contact your doctor immediately.

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug Reaction Monitoring by calling Tel: 03-78835550, or visiting the website portal.bpfk.gov.my (Consumers→Reporting)

Storage and Disposal of VIRLESS CREAM

Storage

Keep in a tight container. Store at temperature below 30°C. Protect from light and moisture.

Disposal

Talk to your doctor or pharmacist about the proper disposal.

Product description

What it looks like

A white colored cream

Ingredients

- *Active ingredient:*

Acyclovir

- *Inactive ingredients:*

Stearic acid, cethyl alcohol, propylene glycol, sodium citrate, water methyl paraben, propyl paraben, dimethylpolysiloxane, Span 60, bouquet, spermaceti synthetic, coconut oil, sorbitan ester, polysorbate, fragrance.

MAL no.

MAL 19972150A

Manufacturer and Product Registration Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan
Malaysia.

Date of revision:

28 October 2015

Serial Number:

BPFK(R4/1)201015/00375

VIRLESS CREAM

Acyclovir (50mg/g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan VIRLESS CREAM
2. Bagaimana VIRLESS CREAM berfungsi
3. Sebelum mengambil VIRLESS CREAM
4. Cara menggunakan VIRLESS CREAM
5. Semasa menggunakan VIRLESS CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan VIRLESS CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan VIRLESS CREAM

VIRLESS CREAM digunakan untuk merawat jangkitan kulit oleh virus *Herpes Simplex* (kudis herpes) termasuk jangkitan buat pertama kali dan ulangan *genital herpes* (jangkitan di kemaluan) dan *herpes labialis* (jangkitan di sekitar kawasan mulut).

Bagaimana VIRLESS CREAM berfungsi

Acyclovir ditukarkan kepada bentuk yang lebih aktif di dalam sel-sel badan yang telah dijangkiti dengan virus herpes. Acyclovir aktif berfungsi dengan mengurangkan tahap dan tempoh simptom jangkitan kudis.

Sebelum mengambil VIRLESS CREAM

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil VIRLESS CREAM sekiranya anda alergi atau hipersensitif terhadap acyclovir atau mana-mana bahan yang terkandung di dalam produk ini.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda hamil, menyusu atau sedang menggunakan apa-apa ubat-ubatan yang lain. Doktor anda akan menentukan sama ada VIRLESS CREAM adalah sesuai kepada anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ingin menggunakan VIRLESS CREAM bersama dengan ubat yang lain. VIRLESS CREAM boleh menyebabkan kesan yang tidak diingini seperti *probenecid* (ubat rawatan gout) dan ubat lain yang mempengaruhi fungsi buah pinggang.

Selain itu, sila beritahu kepada doktor tentang semua ubat yang anda ambil termasuk ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan VIRLESS CREAM

Berapa banyak harus digunakan

Sapu 5 kali sehari selang setiap 4 jam. Doktor anda akan memulakan rawatan seawal yang mungkin sebaik sahaja jangkitan telah dipastikan.

Bila perlu digunakan

VIRLESS CREAM perlu disapukan mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Ikut seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Biasanya, rawatan diteruskan selama 5 hari. Jika selepas 5 hari dan keadaan masih belum sembuh, doktor mungkin akan menasihati anda untuk meneruskan rawatan selama 5 hari lagi.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim, gunakan secepat mungkin dan teruskan penggunaannya seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Kemungkinan kejadian toksik adalah rendah kerana penyerapan melalui kulit adalah terhad.

Semasa menggunakan VIRLESS CREAM

Perkara yang perlu dilakukan

Anda perlu menggunakan krim ini seperti yang dinyatakan pada label atau mengikut arahan doktor dan ahli farmasi. Sila berhenti menggunakan VIRLESS CREAM jika mengalami kerengsaan ataupun alahan selepas menggunakannya.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Elakkan penggunaan pada mata anda atau simpan di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak. Jangan menelan krim ini, jika kejadian tersebut berlaku, bergegas ke hospital yang terdekat kerana anda mungkin memerlukan rawatan perubatan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

VIRLESS CREAM hanya boleh digunakan pada permukaan kulit dan tidak dicadangkan untuk digunakan pada mulut atau membran mukus faraj. Ia tidak boleh digunakan semasa mengandung.

Kesan-kesan sampingan

Antara kesan sampingan yang dilaporkan adalah kerengsaan kulit dan rasa pedih, *pruritis* (gatal) dan ruam.

Sekiranya anda menghadapi kesan sampingan lain atau kesan sampingan yang anda alami berlarutan atau menjadi serius, sila rujuk kepada doktor dengan kadar yang segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel.: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumer→Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan dalam bekas yang kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada keadaan panas dan lembap.

Pelupusan

Mendapat nasihat daripada doktor atau ahli farmasi tentang cara pelupusan yang betul.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Acyclovir
- Bahan tidak aktif
Stearic acid, cethyl alcohol, propylene glycol, sodium citrate, water methyl paraben, propyl paraben, dimethylpolysiloxane, Span 60, bouquet, Spermaceti synthetic, coconut oil, sorbitan ester, polysorbate, fragrance.

MAL no.

MAL 19972150A

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :
28 Oktober 2015

Nombor Siri
BPFK(R4/1)201015/00375