

TREN CAPSULE 250MG

Traxenamic Acid (250 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TREN CAPSULE
2. Bagaimana TREN CAPSULE berfungsi.
3. Sebelum menggunakan TREN CAPSULE.
4. Cara menggunakan TREN CAPSULE
5. Semasa menggunakan TREN CAPSULE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan TREN CAPSULE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan TREN CAPSULE

TREN CAPSULE digunakan untuk merawat atau mencegah pendarahan yang serius.

Bagaimana TREN CAPSULE berfungsi

TREN CAPSULE mengandungi bahan aktif yang dipanggil Tranexamic acid. Traxenamic acid adalah ubat antifibrinolitik yang dapat mengawal keseimbangan antara pembekuan darah dan pendarahan.

Sebelum menggunakan TREN CAPSULE

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil TREN CAPSULE jika anda alergik terhadap bahan dalam TREN CAPSULE. Ia juga tidak sesuai digunakan untuk wanita hamil atau menyusui. Pesakit yang mempunyai risiko atau sejarah trombotik, seperti strok, serangan jantung dan trombotik urat kaki haruslah membincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan TREN CAPSULE.
- Sebelum menggunakannya
Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan (contohnya masalah buah pinggang atau penyakit trombotik)
- Jika mengambil ubat-ubat lain
Mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika anda ingin menggunakan TREN CAPSULE bersama-sama dengan ubat-ubatan lain, seperti pil

perancang, dan ubat yang mempunyai kompleks Faktor IX. Selain itu, anda juga perlu memberitahu mereka tentang semua ubat yang anda ambil, termasuklah ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan TREN CAPSULE

- Berapa banyak harus digunakan
Dos biasa adalah 4 hingga 6 kapsul, dua hingga tiga kali sehari.
 - Bila perlu digunakan
TREN CAPSULE perlu diambil mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.
 - Berapa lama perlu digunakan
TREN CAPSULE perlu diambil mengikut arahan doktor anda.
 - Jika anda terlupa menggunakan
Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihatkan oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.
 - Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)
Dapatkan rawatan perubatan daripada doktor dengan segera. Tanda-tanda kelebihan dos adalah loya, muntah-muntah dan hipotensi ortostatik (tekanan darah rendah postural yang terjadi apabila terdapat perubahan pergerakan secara tiba-tiba).
- ## Semasa menggunakan TREN CAPSULE
- Perkara yang perlu dilakukan
Ambil ubat ini mengikut arahan doktor anda.
 - Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan mula mengambil ubat ini atau mengubah dos yang sedang diambil tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.
 - Perkara yang perlu diberi perhatian
Jika ada mengambil ubat-ubatan selain daripada TREN CAPSULE

sila beritahu doktor atau ahli farmasi. Sekiranya anda mengalami gangguan penglihatan warna semasa mengambil ubat ini, hentikan pengambilannya dan rujuk kepada doktor anda serta-merta.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan kerap TREN CAPSULE adalah tiada selera makan, hipnosis (keadaan separa sedar), *pruritis* (gatal-gatal), *erythema* (kulit kemerahan), ruam kulit, dan pedih ulu hati. Gangguan gastrousus (seperti loya, muntah, cirit-birit) juga boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan TREN CAPSULE

- Penyimpanan
Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.
- Pelupusan
Lupuskan ubat ini jika anda tidak lagi mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Kapsul bersaiz #2 dengan penutup berwarna oren dan kapsul gelatin keras berwarna kuning.
- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif
Traxenamic acid
 - Bahan-bahan tidak aktif
Aerosil
Magnesium Stearate.
Lactose
Talc
- Nombor MAL
MAL 19991436AZ

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
Produk**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section
13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP :

17/12/2025

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)070715/00178