

RASITOL[®] TABLET

Furosemide (40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rasitol
2. Bagaimana Rasitol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Rasitol
4. Cara menggunakan Rasitol
5. Semasa menggunakan Rasitol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rasitol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Rasitol

RASITOL digunakan untuk rawatan edema dengan mengurangkan kebengkakkan dan penahanan bendalir yang disebabkan oleh penyakit kardial, hati dan ginjal serta rawatan tekanan darah tinggi.

Bagaimana Rasitol berfungsi

RASITOL ialah ubat yang meningkatkan kekerapan pembuangan air kencing. Garam (natrium dan kloride) yang berlebihan akan dibuangkan melalui air kencing dan ini akan membantu mengurangkan tekanan darah tinggi.

Sebelum menggunakan Rasitol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda alah dengan furosemide atau mempunyai penyakit kegagalan ginjal, kekurangan elektrolit yang serius (seperti hipokalemia) serta wanita yang berpotensi untuk mengandung.

- Sebelum menggunakan Rasitol

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi akan berlaku jika RASITOL digunakan bersama-sama dengan ubat yang lain.

Cara menggunakan Rasitol

- Berapa banyak harus digunakan

Edema: Dos permulaan umum adalah 40mg sekali sehari dan keperluan diselaraskan berdasarkan respons individu. Hipertensi: dos harian 40-80mg. Boleh diambil Bersama dengan ubat

antihipertensi. Bagi orang tua dos perlu diselaraskan.

- Bila perlu digunakan

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Ia perlu diberikan berdasarkan kepada preskripsi doktor.

- Jika anda terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan Rasitol

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit dengan kemerosotan fungsi ginjal, kemerosotan fungsi hati, diabetes melitus, gout dan wanita mengandung.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan umum: Sakit kepala, tekanan darah rendah, kekejangan otot, mulut kering, dahaga, lemah, lesu, mengantuk, keresahan, kekurangan air kencing, denyutan jantung yang tidak teratur, dan gangguan gastrousus. Kesan sampingan yang kurang umum: Penglihatan kabur dan kuning, pening dan

penurunan tekanan darah disebabkan oleh perubahan kedudukan badan.

Kesan sampingan yang jarang dilihat: Ruam, sensitif terhadap cahaya, alahan dan penekanan sum-sum tulang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Rasitol

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda untuk berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh, sila bertanya kepada doctor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet putih berbentuk elips dengan skor pada satu permukaan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Furosemide
- Bahan tidak aktif
Cellulose Calcium
Magnesium Stearate
Povidone
Sodium Lauryl Sulfate
Magnesium Aluminium Silicate
Lactose

- Nombor MAL

MAL20020884AZ

Manufacturer & Product Registration Holder

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Date of revision

07/10/2025

Serial Nombor

NPRA(R2/1)221111/975