

UROSIN FILM COATED TABLET

Atenolol 50mg & 100mg (potency)

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini mengandungi informasi berikut:

1. Apakah kegunaan UROSIN FILM COATED TABLET
2. Bagaimana UROSIN FILM COATED TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET
4. Cara menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET
5. Semasa menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan UROSIN FILM COATED TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Alamat pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan UROSIN FILM COATED TABLET

Untuk rawatan tekanan darah tinggi dan pectoris angina.

Bagaimana UROSIN FILM COATED TABLET berfungsi

UROSIN dikenali sebagai beta-blocker. Ia adalah sejenis ubat yang boleh mengurangkan tekanan darah. UROSIN berfungsi dengan menghalang kesan hormon epinephrine, juga dikenali sebagai adrenalin. Apabila anda mengambil UROSIN, jantung berdegup lebih perlahan dan dengan daya yang lebih lemah, seterusnya mengurangkan tekanan darah. UROSIN juga membantu dalam pembukaan saluran darah dan memperbaiki aliran darah.

Sebelum menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET

Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda alah dengan atenolol atau anda mempunyai asma serta sejarah penyakit saluran pernafasan obstruktif. Sila rujuk kepada doktor anda jika anda mempunyai sebarang masalah jantung.

Sebelum mula menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Salbutamol dan isoprenaline boleh diguna bersama dengan atenolol tetapi ubatan ini harus digunakan dengan berhati-hati. Perhatian perlu diberi semasa β -blockers digabung dengan agen antiaritmia kelas I (seperti. disopyramide) atau antagonis kalsium jenis verapamil.

Cara menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET

Berapa banyak harus digunakan

Tekanan darah tinggi: 50-100mg sehari atau bergabung dengan agen antihipertensif yang lain. Pectoris angina: 50-100mg sekali sehari atau dibahagi kepada beberapa dos bagi kebanyakan pesakit. Penambahan dos melebihi 100mg tidak semestinya menghasilkan kesan yang lebih baik.

Bila perlu digunakan

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

Berapa lama perlu digunakan

Ia perlu diambil mengikut nasihat doktor.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihatkan oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika menguna berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan UROSIN FILM COATED TABLET

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan beri ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit mempunyai penyakit bronkospastik, hiperthyroidism dan hipoglycemia. Elakkan pengambilan ubat ini pada wanita mengandung dan menyusui.

Kesan-kesan sampingan

Bradikardia, tangan dan kaki sejuk, hipotensi postur, pening, vertigo, loya, cirit-birit, keletihan, ruam, dan mata kering.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat.

Kebangsaan melalui laman web npdra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan UROSIN FILM COATED TABLET

Penyimpanan

Simpan dalam bekas dan di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan supaya berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

UROSIN Film Coated Tablet 50mg: Tablet bersalut berwarna putih dengan bentuk “” pada satu permukaan.

UROSIN Film Coated Tablet 100mg: Tablet bersalut berwarna putih dengan

bentuk “” pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:-

Atenolol

Bahan tidak aktif:-

Hydroxypropyl Methylcellulose

Silicon Dioxide

Dimethicone

Talc

Magnesium Stearate

Cellulose

Cellulose Calcium

MAL nombor

MAL 20013576A (50mg)

MAL 19962580A (100mg)

Pengilang dan pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

06/10/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210408/653