

DOMIDIN LOZENGES

Domiphen Bromide (0.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Domidin Lozenges
2. Bagaimana Domidin Lozenges berfungsi
3. Sebelum menggunakan Domidin Lozenges
4. Cara menggunakan Domidin Lozenges
5. Semasa menggunakan Domidin Lozenges
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan pelupusan Domidin Lozenges
8. Maklumat lanjut produk
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Domidin Lozenges

Domidin Lozenges digunakan untuk melegakan sakit tekak yang disebabkan oleh terlalu banyak lendir/kahak, serta keradangan atau iritasi di mulut dan tekak.

Bagaimana Domidin Lozenges berfungsi

Domiphen bromide adalah sejenis antiseptik yang membunuh atau mengurangkan kuman seperti bakteria di mulut dan tekak.

Sebelum menggunakan Domidin Lozenges

- Bila tidak boleh menggunakan
Anda tidak boleh mengambil Domidin Lozenges jika anda alah kepada Domiphen bromide atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (seperti yang disenaraikan dalam Maklumat lanjut produk).
- Sebelum menggunakannya
Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.

Mengandung dan menyusukan anak
Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Domidin Lozenges

- Berapa banyak harus digunakan
1 lozenge setiap 1-2 jam.
8 lozenge maksimum setiap hari.
- Bila perlu digunakan
Domidin Lozenges perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Ubat ini boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Domidin Lozenges perlu diambil dengan tetap dan selama mana mengikut arahan doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil Domidin Lozenges mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Domidin Lozenges

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna Domidin Lozenges mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Domidin Lozenges.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan Domidin Lozenges.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan Domidin Lozenges kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Domidin Lozenges kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika simptom penyakit berterusan selepas rawatan selama 5 hari, hentikan ubat ini segera dan beritahu doktor atau ahli farmasi.

Elakkan penggunaan ubat ini secara serentak dengan sabun atau ubat gigi.

Jangan gunakan ubat ini jika terdapat darah atau nanah di dalam mulut atau tekak anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Domidin Lozenges boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Kesan sampingan jarang berlaku dan mungkin termasuk iritasi atau kemerahan pada mulut atau tekak, loya, dan muntah.
- Dalam kes yang sangat jarang berlaku, masalah pernafasan yang serius boleh berlaku akibat kelemahan otot pernafasan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Tarikh kemaskini RiMUP

16/06/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)110526/00025

Cara penyimpanan dan pelupusan

Domidin Lozenges

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

- Pelupusan

Domidin Lozenges tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut produk

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat yang berwarna putih ke putih kekuningan, setiap permukaan

diembos dengan “”.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Domiphen Bromide

- Bahan tidak aktif

Peppermint Oil, Menthol, Talc, Sugar, Magnesium Stearate, Carboxymethylcellulose Sodium, Lactose Monohydrate, Povidone, Mannitol, Aspartame

- Nombor MAL:

MAL20020819AZ

Pengilang

Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.