

URIPAX FILM COATED TABLET

Flavoxate Hydrochloride (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan URIPAX FILM COATED TABLET
2. Bagaimana URIPAX FILM COATED TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET
4. Cara menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET
5. Semasa menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan URIPAX FILM COATED TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan URIPAX FILM COATED

Ia digunakan untuk melegakan kekejangan pundi kencing dan merawat gejala pundi kencing seperti kerap membuang air kecil, kekerapan membuang air kecil pada waktu malam, sakit ketika membuang air kencing dan kesusahan menahan air kencing yang dikaitkan dengan keradangan pundi kencing, prostat dan uretra.

Bagaimana URIPAX FILM COATED berfungsi

Flavoxate Hydrochloride adalah *smooth muscle relaxant*. Ia berfungsi dengan melegakan otot-otot di saluran pundi kencing dan saluran kencing.

Sebelum menggunakan URIPAX FILM COATED

- Bila tidak boleh menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET
tidak boleh digunakan pada pesakit yang mempunyai obstruktif duodenum, pengaliran air kencing terhalang pada bahagian bawah saluran kencing dan pendarahan gastrousus.
- Sebelum menggunakan URIPAX FILM COATED

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada apa-apa ubat, makanan, pengawet atau pewarna lain. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika ada mempunyai masalah kesihatan lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda ingin menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET bersama dengan ubat yang lain. Sesetengah ubatan mempunyai tindak balas sesama sendiri terutamanya *anticholinergic* atau ubat yang mempunyai kesan *anticholinergic* dan ubat yang membawa kepada kesan kemurungan.

Selain itu, anda juga harus memaklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang semua ubat yang anda ambil, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi.

Cara menggunakan URIPAX FILM COATED

- Berapa banyak harus digunakan
Dos biasa URIPAX FILM COATED TABLET bagi dewasa adalah satu biji tiga kali sehari.

Ikut arahan doktor anda dengan tepat dan jangan menukar dos sendiri.

Jangan ubah dos kecuali jika doktor memberitahu anda untuk berbuat demikian.

- Bila perlu digunakan

Ambil URIPAX FILM COATED TABLET seperti yang diarahkan oleh doktor/ahli farmasi anda. Ia boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil URIPAX FILM COATED TABLET bila perlu atau selagi doktor anda memberitahu anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos, ambil dos tersebut secepat mungkin. Tetapi, sekiranya sudah mendekati masa pengambilan dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas. Jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera. Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan gejala-gejala mual, muntah, pengembangan anak mata, mulut dan lidah kering, kulit kering dan panas, demam, peningkatan denyutan jantung, tekanan darah tinggi, kehilangan kawalan penuh pada pergerakan badan, mengantuk, kecelaruan, pergolakan dan halusinasi.

Semasa menggunakan URIPAX FILM COATED

- Perkara yang perlu dilakukan
Anda perlulah memberitahu doktor anda sekiranya anda mengandung atau merancang untuk mengandung.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan mula mengambil atau menukar dos tanpa menyemak dengan doktor anda terlebih dahulu. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun tanda-tanda mereka serupa dengan anda.
- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan pengendalian jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

URIPAX FILM COATED TABLET perlu diambil dengan berhati-hati

URIPAX FILM COATED TABLET

Flavoxate Hydrochloride (200mg)

pada pesakit yang mempunyai glaukoma.

Keselamatan penggunaan URIPAX FILM COATED TABLET semasa kehamilan dan penyusuan tidak diketahui. Elakkan penggunaan semasa mengandung kecuali tiada alternatif yang lebih selamat.

Berhati-hati apabila menggunakan URIPAX FILM COATED TABLET semasa menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

Tiada kesan-kesan sampingan semasa dilaporkan untuk penggunaan URIPAX FILM COATED TABLET, tetapi kesan-kesan yang mungkin dialami termasuk mengantuk, pening, sakit kepala, kekeliruan pemikiran (terutama pada orang tua), kegelisahan, kehilangan keseimbangan, keletihan, demam, penglihatan kabur, peningkatan denyutan jantung, mual, muntah, mulut kering, kesukaran untuk menelan, senak, hipersensitiviti, sakit pundi kencing, ruam.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau melayari laman web <http://npra.moh.gov.my/> (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan URIPAX FILM COATED

- **Penyimpanan**
Simpan di bawah suhu 30°C dan elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.
Jauhkan daripada jangkauan kanak-kanak.
- **Pelupusan**
URIPAX FILM COATED TABLET hendaklah dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan untuk berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah melepasi tarikh

luput. Kembalikan mana-mana ubat yang tidak digunakan atau telah tamat tempoh kepada doktor, ahli farmasi atau pengamal perubatan profesional untuk pelupusan yang selamat.

Maklumat lanjut

- **Rupa dan warna produk**
Tablet bulat yang bersalut filem yang berwarna kuning
- **Bahan-bahan kandungan**
 - Bahan aktif
Flavoxate Hydrochloride
 - Bahan tidak aktif
Lactose
Cellulose
Magnesium Stearate
Magnesium Aluminium Silicate
Sodium Starch Glycolate
Polyethylene Glycol
Dimethicone
Titanium Dioxide
- **Nombor MAL**
MAL20021159AZ

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

19/7/2017

Nombor Siri

NPRA (Rx/x)xxxxxx/xxxxx