

OFCIN FILM COATED TABLET

Ofloxacin (200mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan OFCIN F.C TABLET
2. Bagaimana OFCIN F.C TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan OFCIN F.C TABLET
4. Cara menggunakan OFCIN F.C TABLET
5. Semasa menggunakan OFCIN F.C TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan OFCIN F.C TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan OFCIN F.C TABLET

OFCIN F.C TABLET digunakan untuk merawat jangkitan saluran kencing, paru-paru, kulit, tisu lembut, gonorrhea dan non-gonococcal urethritis dan cervicitis.

Bagaimana OFCIN F.C TABLET berfungsi

OFCIN F.C TABLET menghalang fungsi DNA gyrase, satu enzim yang penting untuk pembiakan bakteria. OFCIN F.C TABLET adalah aktif *in vitro* terhadap bakteria Gram positif aerobik dan juga bakteria Gram negatif aerobik bakteria.

Sebelum menggunakan OFCIN F.C TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil OFCIN F.C TABLET jika anda alah terhadap bahan dalam OFCIN F.C TABLET atau antibiotik kelas quinolone. OFCIN F.C TABLET tidak sesuai untuk digunakan oleh pesakit epilepsi dan sawan. OFCIN F.C TABLET tidak sesuai digunakan untuk kanak-kanak atau remaja dan juga wanita hamil atau menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan OFCIN F.C TABLET

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda telah didiagnosis dengan pembesaran atau "benjolan" pada saluran darah besar (aneurisme aorta atau aneurisme saluran darah besar periferi).

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda pernah mengalami episod diseksi aorta sebelumnya (robekan pada dinding aorta).

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah keluarga aneurisme aorta atau diseksi aorta, atau faktor risiko atau keadaan predisposisi lain (contohnya, gangguan tisu penghubung seperti sindrom Marfan, atau sindrom Ehlers-Danlos vaskular, atau gangguan vaskular seperti arteritis Takayasu, arteritis sel gergasi, penyakit Behçet, tekanan darah tinggi, atau aterosklerosis yang dikenali).

Anda tidak seharusnya mengambil ubat antibakteria *fluoroquinolone*, termasuk OFCIN F.C. TABLET, jika anda pernah mengalami sebarang reaksi buruk serius pada masa lalu ketika mengambil *fluoroquinolone* (lihat bahagian Perkara yang perlu diberi perhatian dan Kesan sampingan). Dalam keadaan ini, anda perlu memaklumkan kepada penyedia penjagaan kesihatan anda secepat mungkin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Jangan mengambil OFCIN F.C TABLET bersama dengan ubat anti-asid, sucralfate, ubat diabetik, warfarin, theophylline, aminoglycosides, beta-lactam antibiotik dan ubat anti mycobacteria. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat yang tersebut atau ubat-ubat tanpa preskripsi doktor.

Cara menggunakan OFCIN F.C TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Pil harus diambil mengikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

OFCIN F.C TABLET perlu diambil mengikut arahan doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan OFCIN F.C TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doctor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan OFCIN F.C TABLET.

Gunakan OFCIN F.C TABLET hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

OFCIN FILM COATED TABLET

Ofloxacin (200mg, 400mg)

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi OFCIN F.C TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera. Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Anda mungkin mengalami masalah kesihatan mental walaupun ketika mengambil/menggunakan antibiotik *fluoroquinolone*, termasuk OFCIN F.C TABLET, untuk pertama kalinya. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, kemurungan atau masalah kesihatan mental boleh menyebabkan pemikiran bunuh diri dan tingkah laku mencederakan diri sendiri seperti cubaan bunuh diri. Jika anda mengalami reaksi seperti itu, berhenti mengambil/menggunakan OFCIN F.C TABLET dan maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Jika anda mengalami sakit tiba-tiba dan teruk di abdomen, dada, atau belakang, pergi segera ke jabatan kecemasan.

Kesan sampingan serius yang berpanjangan, menyebabkan ketidakupayaan, dan mungkin tidak boleh dipulihkan

Ubat antibakteria *fluoroquinolone*, termasuk OFCIN F.C. TABLET, telah dikaitkan dengan kesan sampingan serius yang sangat jarang berlaku, ada di antaranya boleh bertahan lama (berterusan selama bulan atau tahun), menyebabkan ketidakupayaan, atau mungkin tidak boleh dipulihkan.

Berhenti mengambil antibiotik *fluoroquinolone* anda dan hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda

dengan segera jika anda mengalami tanda-tanda kesan sampingan berikut:

- Sakit atau bengkak pada tendon, sering bermula di buku lali atau betis. Jika ini berlaku, rehatkan kawasan yang sakit sehingga anda dapat berjumpa dengan penyedia penjagaan kesihatan anda.
- Sakit pada sendi anda atau bengkak di bahu, lengan, atau kaki.
- Kesakitan atau sensasi yang tidak normal (seperti rasa seperti jarum dan lidi, kesemutan, kegatalan, kebas, atau rasa terbakar), kelemahan badan, terutama pada kaki atau lengan, atau kesukaran berjalan.
- Kelesuan yang teruk, mood kemurungan, kecemasan, masalah dengan ingatan anda, atau masalah tidur yang teruk.
- Perubahan dalam penglihatan, rasa, bau, atau pendengaran anda.

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda mengalami salah satu kesan di atas semasa atau sejurus selepas mengambil *fluoroquinolone* – ini bermaksud anda harus mengelakkan ubat tersebut pada masa akan datang. Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda akan memutuskan tentang meneruskan rawatan dengan mengambil kira juga antibiotik dari kelas lain.

Tendinitis dan pecah tendon

Sakit dan bengkak pada sendi serta keradangan atau pecah tendon mungkin berlaku jarang sekali. Risiko anda meningkat jika anda berusia lanjut (lebih dari 60 tahun), telah menjalani pemindahan organ, mempunyai masalah buah pinggang, atau sedang dirawat dengan kortikosteroid. Keradangan dan pecah tendon mungkin berlaku dalam tempoh 48 jam pertama rawatan dan bahkan sehingga beberapa bulan selepas menghentikan terapi OFCIN F.C. TABLET. Pada tanda pertama kesakitan atau keradangan pada tendon (contohnya di buku lali, pergelangan tangan, siku, bahu, atau lutut), berhenti mengambil OFCIN F.C. TABLET, hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda, dan rehatkan kawasan yang sakit. Elakkan sebarang senaman

yang tidak perlu kerana ini boleh meningkatkan risiko pecah tendon.

Neuropati peripheral

Anda mungkin jarang mengalami gejala kerosakan saraf (neuropati) seperti sakit, rasa terbakar, kesemutan, kebas, dan/atau kelemahan terutama di kaki dan tangan. Jika ini berlaku, berhenti mengambil OFCIN F.C. TABLET dan maklumkan kepada penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera untuk mencegah perkembangan keadaan yang mungkin tidak boleh dipulihkan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, OFCIN F.C. TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jarang: Kemurungan

(berpotensi membawa kepada pemikiran bunuh diri, cubaan bunuh diri, atau bunuh diri yang berjaya), atau halusinasi.

Sangat jarang: Reaksi psikotik yang berpotensi membawa kepada pemikiran bunuh diri, cubaan bunuh diri, atau bunuh diri yang berjaya.

Fluoroquinolone telah dilaporkan menyebabkan kesan sampingan serius yang melibatkan tendon, otot, sendi, dan saraf – dalam sebilangan kecil pesakit, kesan sampingan ini menyebabkan kecacatan yang berpanjangan atau kekal (lihat bahagian Sebelum menggunakan OFCIN F.C. TABLET dan Perkara yang perlu diberi perhatian).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

OFCIN FILM COATED TABLET

Ofloxacin (200mg, 400mg)

Cara penyimpanan dan pelupusan

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Nombor Siri

NPRA(R2/1)250319/1439

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

OFCIN FILM COATED TABLET adalah tablet bulat yang berwarna jingga.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ofloxacin

- Bahan tidak aktif

Lactose

Cellulose

Sodium Starch Glycolate

Magnesium Stearate

Polyethylene Glycol

Talc

Dimethylpolysiloxane

Titanium Dioxide

Iron Oxide Red

Iron Oxide Yellow

- Nombor MAL

Ofcin F.C Tablet 200mg

MAL20020256AZ

Ofcin F.C Tablet 400mg

MAL20020257AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section
13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP :

25/03/2025