

ERYCIN FILM COATED TABLET

Erythromycin (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ERYCIN TABLET
2. Bagaimana ERYCIN TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan ERYCIN TABLET
4. Cara menggunakan ERYCIN TABLET
5. Semasa menggunakan ERYCIN TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ERYCIN TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan ERYCIN TABLET
ERYCIN TABLET digunakan untuk merawat jangkitan bakteria seperti jangkitan saluran pernafasan, jangkitan kulit dan tisu lembut, jangkitan telinga dan mulut.

Bagaimana ERYCIN TABLET berfungsi

ERYCIN TABLET mengandungi erythromycin sebagai bahan aktif, iaitu antibiotik yang menghentikan pertumbuhan bakteria dan akhirnya membunuh kuman penyebab jangkitan.

Sebelum menggunakan ERYCIN TABLET

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap erythromycin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

-Sebelum menggunakan ERYCIN TABLET

Kehamilan dan penyusuan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Sila beritahu doktor anda jika anda mempunyai:

- Masalah hati.
- Masalah jantung.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk yang

anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan berikut:

- Ubat yang boleh memberi kesan kepada fungsi hati atau telinga.
- Cimetidine dan cisapride (ubat yang digunakan untuk pedih ulu hati).
- Carbamazepine dan phenytoin (ubat yang digunakan untuk merawat sawan).
- Cyclosporine (ubat yang digunakan untuk mencegah penolakan selepas pemindahan organ).
- Lovastatin (ubat yang digunakan untuk menurunkan paras kolesterol dalam darah).
- Terfenadine dan astimazole (ubat yang digunakan untuk merawat alahan).
- Theophylline (ubat yang digunakan untuk merawat asma dan masalah lain berkaitan pernafasan).
- Digoxin (ubat yang digunakan untuk merawat masalah jantung)
- Ergotamine, dihydroergotamine (ubat yang digunakan untuk merawat migrain).
- Hexobarbital, triazolam (ubat sedatif).
- Ubat antikoagulan (ubat cair darah).

Doktor atau ahli farmasi anda mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan ERYCIN TABLET

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa: Ambil 2 tablet setiap 12 jam atau 1 tablet setiap 6 jam, atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Untuk jangkitan yang teruk, dos mungkin diberikan sehingga 16 tablet sehari, dibahagikan dalam beberapa dos.

Pencegahan jangkitan Streptococcal:

Jika anda mempunyai sejarah penyakit reumatik, ambil 1 tablet, dua kali sehari untuk pencegahan berterusan.

-Bila perlu digunakan

Ambil 2 atau 4 kali sehari, atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

ERYCIN TABLET harus diambil semasa perut kosong atau sejurus sebelum makan.

-Berapa lama perlu digunakan

Ambil ERYCIN TABLET untuk tempoh yang disarankan oleh doktor.

Untuk jangkitan Streptococcal: Ambil ubat ini sekurang-kurangnya 10 hari.

-Jika anda terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos ERYCIN TABLET, ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Namun, jika sudah hampir waktu untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan teruskan jadual dos yang biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan ERYCIN TABLET

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ERYCIN TABLET hanya dengan preskripsi doktor.
- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan ERYCIN TABLET.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan ERYCIN TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka

ERYCIN FILM COATED TABLET

Erythromycin (250mg)

mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan mesin

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan ERYCIN TABLET terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ERYCIN TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan biasa:

Ketidakselesaan perut, loya, muntah atau cirit-birit. Ini biasanya berkaitan dengan dos. Walaupun jarang, keradangan teruk pada lapisan dalam usus besar mungkin berlaku.

Tindak balas alahan: Tindak balas kulit seperti ruam atau geligata mungkin berlaku. Dalam kes yang jarang, tindak balas alahan yang serius seperti anafilaksis mungkin berlaku.

ERYCIN TABLET boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan ERYCIN TABLET dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak, atau kerengsaan mata.

Kesan sampingan lain:

Isu pendengaran: Terdapat laporan mengenai kehilangan pendengaran sementara (jarang), kebanyakannya pada individu yang mengalami masalah buah pinggang atau mereka yang mengambil ubat pada dos yang tinggi.

Selain itu, terdapat laporan kekeliruan, halusinasi, sawan atau pening, walaupun tidak jelas sama ada ia disebabkan secara langsung oleh ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting*]

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ERYCIN TABLET

-Penyimpanan

Simpan ubat di dalam bekas yang kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

ERYCIN TABLET perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

ERYCIN TABLET merupakan tablet bulat berwarna merah dengan garisan skor di satu sisi, dan sisi yang lain ditandakan dengan huruf "YSP".

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif
Erythromycin

-Bahan tidak aktif
Sodium Citrate
Povidone
Sodium Starch Glycolate
Magnesium Aluminium Silicate
Cellulose
Polyethylene Glycol
Hydroxypropyl Methylcellulose
Corn Starch
Dimethicone
Sunset Yellow Lake
Sunset Yellow
Ponceau 4R
Titanium Dioxide

-Nombor MAL

MAL20040832AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

26/01/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)130125/00002