

IBUPROFEN SUSPENSION 20MG/ML

Ibuprofen (20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan IBUPROFEN SUSPENSION
2. Bagaimana IBUPROFEN SUSPENSION berfungsi
3. Sebelum menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION
4. Cara menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION
5. Semasa menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan IBUPROFEN SUSPENSION
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan IBUPROFEN SUSPENSION

Melegakan demam, sakit, otot dan keradangan sendi.

Bagaimana IBUPROFEN SUSPENSION berfungsi

Ibuprofen ialah analgesik jenis bukan steroid, antipiretik dan anti inflamasi agen. Anti inflamasi jenis bukan steroid menghalang aktiviti enzim cyclo oxygenase lalu menyebabkan penghasilan prostaglandins dan thromboxanes daripada asid arachidonic berkurangan.

Sebelum menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika: anda mempunyai alahan terhadap Ibuprofen atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Beritahu doktor jika anda alahan terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Perhatian perlu diambil pada pesakit yang mengambil ubat anti koagulan secara mulut, thiazide, diuretik, penghambat ACE, Penghalang β , methotrexate, litium, penahan sakit lain yang mengandungi aspirin, ibuprofen, atau ubatan lain jenis bukan steroid.

Cara menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan

keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan pembersihan bahagian perut.

Semasa menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan IBUPROFEN SUSPENSION.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan IBUPROFEN SUSPENSION hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi IBUPROFEN SUSPENSION kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

IBUPROFEN SUSPENSION perlu berhati-hati ketika memberi kepada pesakit tua, kepada pesakit dengan penyakit kardiovaskular, penyakit hati buah pinggang, dan jantung, kegagalan jantung kongestif, sirosis, asma, penahanan bendalir dan masalah gastrousus.

Pengambilan IBUPROFEN SUSPENSION perlu diberhentikan jika pesakit mengalami penglihatan kabur atau berkurangan dan perubahan dalam penglihatan warna. Keselamatan

digunakan dalam kehamilan dan penyusuan belum dipastikan lagi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, IBUPROFEN SUSPENSION boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan biasanya ringan dan sementara: ketidakselesaan perut, loya, ulser perut, ruam atau asma yang semakin teruk, masalah hati dan buah pinggang, pening, sakit kepala dan gangguan pendengaran.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan IBUPROFEN SUSPENSION

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna oren

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ibuprofen

- Bahan tidak aktif

Glycerin

Propylene Glycol

Cellulose Sodium

Silicon Dioxide
Sunset Yellow
Tween
Aspartame
Citric Acid
Sodium Benzoate
Orange Powder

- Nombor MAL

MAL04125482AZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7,
Section 13, Kawasan Perindustrian
Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

25/08/2025

Nombor serial:

NPRA(R2/2)230505/1059