

TIDACT GEL 1%

Clindamycin phosphate (1%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *TIDACT GEL 1%*
2. Bagaimana *TIDACT GEL 1%* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *TIDACT GEL 1%*
4. Cara menggunakan *TIDACT GEL 1%*
5. Semasa menggunakan *TIDACT GEL 1%*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *TIDACT GEL 1%*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *TIDACT GEL 1%*

Merawat jerawat.

Doktor anda mungkin memberikan *TIDACT GEL 1%* kepada anda untuk sebab yang lain. Tanya doktor anda jika anda mempunyai soalan mengapa anda diberikan *TIDACT GEL 1%*.

Bagaimana *TIDACT GEL 1%*

berfungsi

TIDACT GEL 1% ialah antibiotik topikal. Ia berfungsi dengan menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jerawat.

Sebelum menggunakan *TIDACT GEL 1%*

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan *TIDACT GEL 1%* jika:

- anda mempunyai alahan kepada clindamycin atau lincomycin atau mana-mana bahan dalam *TIDACT GEL 1%* yang disenaraikan di hujung risalah ini.
- anda mempunyai keradangan usus (*regional enteritis* atau *ulcerative colitis*).
- anda mempunyai sejarah cirit-birit berkaitan dengan antibiotik (*colitis*)
- tidak boleh digunakan pada bayi yang baru lahir.

-Sebelum menggunakan *TIDACT GEL 1%*

Anda mesti memberitahu doktor anda jika:

- anda alah kepada mana-mana ubat atau mana-mana bahan, seperti makanan, pengawet atau perwarna.
- anda mengandung atau merancang untuk mengandung.
- anda menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan anak.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan krim, salap atau losyen lain atau mengambil sebarang ubat-ubatan yang lain yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh bertindak balas dengan *TIDACT GEL 1%*. Ini termasuk:

-antibiotik, erythromycin.

Doktor anda atau ahli farmasi mungkin mempunyai maklumat lanjut ubat ini mengenai perkara yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa menggunakan ubat ini.

Cara menggunakan *TIDACT GEL 1%*

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan yang nipis pada bahagian berkenaan dua kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor anda atau ahli farmasi. Arahan mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak faham dengan arahan yang terdapat di dalam risalah ini, dapatkan bantuan daripada doktor anda atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan

Guna krim mengikuti arahan seperti dicatatkan dalam label, atau preskripsi doktor atau ahli farmasi. Jangan menggunakannya lebih lama daripada yang dicadangkan.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim, gunakan secepat mungkin dan teruskan penggunaannya seperti biasa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Ia adalah penting untuk anda tidak menggunakan *TIDACT GEL 1%* melebihi daripada yang dipreskripsikan oleh doktor anda. Jika anda menggunakan *TIDACT GEL 1%* melebihi daripada yang dipreskripsikan, dapatkan nasihat doktor anda.

TIDACT GEL 1% mengandungi alkohol yang akan menyebabkan lecuran dan kerengsaan mata. Basahkan dengan air paip yang sejuk sekiranya tersentuh permukaan yang sensitif (mata, kulit terkelupas, mukus membran)

Semasa menggunakan *TIDACT GEL 1%*

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan krim dengan berpanduan kepada label atau seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda yang anda menggunakan *TIDACT GEL 1%*.

Jika anda mahu mula mengambil sebarang ubat-ubatan yang baru, beritahu doktor anda dan ahli farmasi yang anda menggunakan *TIDACT GEL 1%*.

Jika anda merasakan *TIDACT GEL 1%* tidak membantu keadaan anda, beritahu doktor anda.

Jika anda mengalami cirit-birit yang teruk, beritahu doktor anda. Lakukan ini walaupun ianya berlaku selepas beberapa minggu anda menghentikan penggunaan *TIDACT GEL 1%*. Cirit-birit mungkin memberi maksud yang anda menghadapi keadaan yang melibatkan usus yang serius. Mereka mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Jangan berikan sebarang ubat cirit-birit tanpa melakukan pemeriksaan dengan doktor terlebih dahulu.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menyentuh krim ini dengan mata anda. Jangan berikan *TIDACT GEL 1%* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama dengan anda.

Jangan menggunakan *TIDACT GEL 1%* untuk merawat masalah lain melainkan doktor anda memberitahu anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi jika anda hamil atau menyusui.

Kesan-kesan sampingan

Semak dengan doktor anda atau ahli farmasi anda secepat yang mungkin jika anda mempunyai sebarang masalah semasa menggunakan *TIDACT GEL 1%*, walaupun anda merasakan masalah berkenaan berkaitan dengan penggunaan ubat atau tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Seperti ubat-ubatan yang lain, *TIDACT GEL 1%* boleh menyebabkan kesan sampingan. Jika ia berlaku, ianya besar kemungkinan adalah kecil dan sementara. Walau bagaimanapun, ada yang mungkin serius dan memerlukan perhatian perubatan.

Pastikan doktor anda atau ahli farmasi untuk memberikan jawapan tentang soalan yang anda ada.

Beritahu doktor anda jika anda perasan mana-mana yang berikut dan mereka risaukan anda:

- sakit perut
- cirit-birit yang teruk yang mungkin berdarah
- kerengsaan kulit (*contact dermatitis*)
- gangguan pada perut atau usus
- kulit berminyak
- kulit sensitif
- mata yang pedih

Ini bukan senarai kesan sampingan yang lengkap. Kesan sampingan lain mungkin berlaku kepada sesetengah orang dan sesetengah kesan sampingan mungkin tidak diketahui lagi.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *TIDACT GEL 1%*

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan. Jauhkan daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

TIDACT GEL 1% perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih atau putih sejuk.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif-

Clindamycin Phosphate

Bahan tidak aktif-
Polyethylene Glycol
Allantoin
Methyl Paraben
Propylene Glycol
Triethanolamine
Carbopol
Propyl Paraben
Isopropyl Alcohol

-Nombor MAL

MAL 05092228AZ

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/08/2025

Serial Number

NPRA(R4/1)120919/00252