

MELOCAM® TABLET

Meloxicam (7.5mg, 15mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MELOCAM® TABLET
2. Bagaimana MELOCAM® TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan MELOCAM® TABLET
4. Cara menggunakan MELOCAM® TABLET
5. Semasa menggunakan MELOCAM® TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MELOCAM® TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan MELOCAM® TABLET

MELOCAM® TABLET digunakan untuk melegakan kesakitan dan keradangan dalam penyakit reumatik; eksaserbasi osteoarthritis (arthrosis, penyakit sendi degeneratif) dan ankylosing spondylitis (penyakit keradangan tulang yang kronik).

Bagaimana MELOCAM® TABLET berfungsi

Meloxicam terdiri daripada kumpulan ubat yang dikenali sebagai NSAIDs. Ia berfungsi dengan menghentikan penghasilan bahan oleh badan yang menyebabkan kesakitan, demam, and keradangan.

Sebelum menggunakan MELOCAM® TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan MELOCAM TABLET:

- jika anda pernah mempunyai asma, angioedema (pembengkakan kulit), kegatalan, polip hidung dan simptom lain yang teruk disebabkan oleh Aspirin atau NSAIDs.
- jika anda mempunyai ulser perut yang aktif
- jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang yang teruk
- jika anda hipersensitif kepada NSAIDs
- jika anda berumur dibawah 15 tahun

- jika anda mengandung atau menyusukan anak

- Sebelum menggunakan MELOCAM® TABLET

Sila rujuk kepada doktor anda:

- jika anda mempunyai ulser, pendarahan atau lubang pada perut atau usus
- jika anda warga emas
- jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang
- jika anda dehidrasi
- jika anda mempunyai kegagalan jantung atau masalah jantung
- jika anda pernah menjalani pembedahan yang besar yang mengakibatkan hypovolaemia (kekurangan jumlah darah didalam badan)
- jika anda menderita disebabkan dispepsia (ketidakselesaan pada kawasan epigastrik disebabkan masalah penghadaman)

Meloxicam boleh mengakibatkan reaksi kulit yang teruk, seperti exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis, Steven-Johnson Syndrome. Simptom mungkin termasuk ruam kulit, lepuh, dan mengelupas. Ini boleh menjadi tanda-tanda untuk keadaan yang serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat yang diambil bersama MELOCAM TABLET mungkin mengakibatkan interaksi sesama sendiri. Ini termasuk:

- NSAIDs lain, ubat yang digunakan untuk melegakan kesakitan.
- oral anticoagulant, ticlopidine, systematically administered heparin, thrombolytic, ubat yang digunakan untuk penipisan darah.
- lithium, ubat digunakan untuk depresi.

- methotrexate, ubat yang digunakan untuk merawat rheumatoid arthritis, termasuk sesetengah jenis kanser

- alat pencegahan kehamilan
- diuretic, juga dikenali sebagai 'pil air'
- antihypertensive, ubat ynaq digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi
- cholestyramine, ubat yang membantu merendahkan kadar kolesterol dalam darah
- cyclosporine, ubat yang menghalang penolakan pemindahan organ.

Cara menggunakan MELOCAM® TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan MELOCAM® TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan MELOCAM® TABLET.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Gunakan MELOCAM® TABLET hanya dengan preskripsi doktor. (*For prescription only medicines*)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi MELOCAM® TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan MELOCAM® TABLET terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, MELOCAM® TABLET boleh menyebabkan kesan

sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MELOCAM® TABLET

- Penyimpanan

Simpan di dalam bekas kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C dan elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Melocam Tablet 7.5mg

Tablet bulat yang berwarna kuning pudar, dengan skor dibahagian Tengah,

satu belah ditunjukkan dengan “”

dan satu belah lagi ditunjukkan “”.

Melocam Tablet 15mg

Tablet bulat yang berwarna kuning pudar, dengan skor dibahagian tengah, perkataan ‘YSP’ dibahagian atas dan

‘15’ dibahagian bawah  

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Meloxicam
- Bahan tidak aktif
Cellulose
Silicon Dioxide
Sodium Starch Glycolate
Lactose
Magnesium Stearate
Povidone
Sodium Citrate

- Nombor MAL

Melocam Tablet 7.5mg
MAL06051310AZ

Melocam Tablet 15mg
MAL13035051AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

26/03/2026

No. Siri

NPRA(R2/1)240818/1332