

MELASHINE CREAM

Hydroquinone (4% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MELASHINE CREAM
2. Bagaimana MELASHINE CREAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan MELASHINE CREAM
4. Cara menggunakan MELASHINE CREAM
5. Semasa menggunakan MELASHINE CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MELASHINE CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MELASHINE CREAM

Merawat pigmentasi kulit yang teruk seperti melasma, tetua dan *lentigine*.

Bagaimana MELASHINE CREAM berfungsi

Penyapuan hydroquinone pada kulit boleh mengurangkan pigmen kulit berbalik dengan perencatan proses pigmentasi enzimatik dan menghalang penghasilan melanin.

Sebelum menggunakan MELASHINE CREAM

-Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda alah kepada komponen dalam MELASHINE CREAM. Ia tidak boleh digunakan untuk kulit yang terlelas atau terselar matahari. Ia tidak boleh digunakan untuk meluntur warna bulu mata atau kening, jangan mengenakan krim pada mata semasa mengguna.

-Sebelum menggunakan MELASHINE CREAM

Ujian sensitiviti patut dijalankan dengan menggunakan MELASHINE CREAM, sapu sedikit krim tersebut pada kulit dan menyemak selepas 24 jam untuk memastikan supaya tiada hipersensitiviti.

MELASHINE CREAM boleh menyebabkan kemerahan dan kepedihan yang ringan. Kepekatan tinggi atau penggunaan yang berpanjangan boleh membawa kepada pigmentasi yang teruk terutama di kawasan kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Walaupun kemerahan ringan bukannya kontraindikasi, rawatan lanjut tidak digalakkan jika terdapat gata-gatal atau perbentukan kantung air atau tindak balas keradangan yang teruk.

Tidak boleh digunakan untuk mencegah selaran matahari.

Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengandung, menyusukan anak atau menggunakan ubat lain. Penggunaan hydroquinone secara topikal oleh wanita yang mengandung dibenarkan sekiranya ianya jelas dinyatakan. Langkah berhati-hati perlu diambil sekiranya wanita yang menyusukan anak menggunakan hydroquinone secara topikal.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Tiada interaksi ubat-ubat dilaporkan.

Cara menggunakan MELASHINE CREAM

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada kulit dua kali sehari. Sapukan pada kawasan kecil badan pada satu masa.

-Bila perlu digunakan

Gunakan apabila memerlukan.

-Berapa lama perlu digunakan

Berhenti menggunakan jika kulit tidak bertambah baik selepas penggunaan selama 2 bulan.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim, gunakan secepat mungkin dan teruskan penggunaannya seperti biasa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Tiada sebarang reaksi sistemik dari penggunaan hydroquinone topikal.

Semasa menggunakan MELASHINE CREAM

-Perkara yang perlu dilakukan

Menggunakan krim dengan berpanduan kepada label atau seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi. Berhenti penggunaan krim ini sekiranya sensitiviti atau kerengsaan selepas menggunakannya. Pengguna dinasihatkan menyapu krim pelindung matahari untuk melindungi diri mereka daripada cahaya matahari atau menggunakan MELASHINE CREAM hanya pada waktu malam.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tidak boleh menyentuh krim pada mata anda atau simpan di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hydroquinone adalah agen peluntur kulit yang boleh menghasilkan kesan kosmetik yang tidak diinginkan jika tidak digunakan seperti yang diarahkan.

Kesan-kesan sampingan

Tiada sebarang reaksi sistemik dari penggunaan hydroquinone topikal. Kes hipersensitiviti pernah dilaporkan, jadi pengguna dinasihati menjalankan percubaan produk pada kulit sebelum mengguna. *Ochronosis* (penguningan kulit) biasanya menjadi jelas selepas penggunaan krim selama 6 bulan, ia mungkin tidak dapat dipulihkan. Kes perubahan warna kuku menjadi perang yang dapat dipulihkan juga pernah dilaporkan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan MELASHINE CREAM

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

MELASHINE CREAM tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Hydroquinone

-Bahan tidak aktif

Diethylene Glycol Monoethyl Ester

Emulsifying Wax

Stearyl Alcohol

Coconut Oil

POE Monostearate

Butylated Hydroxytoluene

Propylene Glycol

Stearic Acid

Dimethicone

Methyl Paraben

Propyl Paraben

Sodium Metabisulfite

Titanium Dioxide

-Nombor MAL

MAL07122844AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,

Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,

43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/06/2025

Nombor Siri

BPFK(R4/1)150216/00032