

CEFLOUR F.C. TABLET

Cefuroxime (as Cefuroxime Axetil) (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CEFLOUR F.C TABLET
2. Bagaimana CEFLOUR F.C TABLET berfungsi.
3. Sebelum menggunakan CEFLOUR F.C TABLET
4. Cara menggunakan CEFLOUR F.C TABLET
5. Semasa menggunakan CEFLOUR F.C TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CEFLOUR F.C TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan CEFLOUR F.C TABLET

Ia digunakan untuk rawatan jangkitan bakteria pada saluran pernafasan, jangkitan saluran kencing, gonorea (jangkitan kelamin), serta jangkitan kulit dan tisu lembut.

Bagaimana CEFLOUR F.C TABLET berfungsi

Ceflour mengandungi bahan aktif cefuroxime, yang bertindak dengan menghalang pembentukan dinding sel bakteria, seterusnya membunuh bakteria.

Sebelum menggunakan CEFLOUR F.C TABLET

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil CEFLOUR F.C TABLET jika anda alah kepada cefuroxime, cephalosporin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)

-Sebelum menggunakan CEFLOUR F.C. TABLET

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai sejarah masalah perut atau usus, terutamanya *colitis* (radang usus yang teruk).
- Anda pernah mengalami cirit-birit selepas mengambil antibiotik.
- Anda mempunyai masalah buah pinggang, kerana dos anda mungkin perlu disesuaikan.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Ceflour hanya boleh digunakan semasa hamil jika doktor anda memutuskan ia benar-benar diperlukan.

Ceflour boleh masuk ke dalam susu ibu dalam jumlah yang kecil. Ini kadangkala boleh menyebabkan cirit-birit ringan atau jangkitan kulat (thrush) pada bayi. Berbincanglah dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini semasa menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan lain:

- Probenecid (ubat untuk gout)
- Ubat-ubatan yang mengurangkan asid perut (seperti antasid atau ubat untuk gastritis/pedih ulu hati)

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan CEFLOUR F.C TABLET

-Berapa banyak harus digunakan

- Dos biasa untuk dewasa dan remaja (berumur lebih 13 tahun):
- Kebanyakan jangkitan: 1 tablet dua kali sehari.
- Jangkitan pernafasan yang lebih serius atau disyaki pneumonia: 2 tablet dua kali sehari.
- Jangkitan saluran kencing: 1 tablet dua kali sehari.
- Gonorea: 4 tablet diambil sebagai dos tunggal.

Untuk kanak-kanak:

Tablet Ceflour tidak boleh dihancurkan, jadi ia tidak sesuai untuk pesakit yang tidak boleh menelan tablet, seperti kanak-kanak kecil. Ceflour tidak digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 3 tahun.

-Bila perlu digunakan

Ambil dua kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda rasa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Pengambilan cefuroxime yang berlebihan boleh menyebabkan sawan.

Semasa menggunakan CEFLOUR F.C TABLET

-Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doctor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CEFLOUR F.C TABLET.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini

Gunakan CEFLOUR F.C TABLET hanya dengan preskripsi doktor.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan CEFLOUR F.C TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami cirit-birit semasa mengambil ubat ini, berjumpalah dengan doktor anda dengan segera.

Jika anda mengambil ubat ini untuk kegunaan jangka panjang, ia boleh menyebabkan kuman lain membiak dan menyebabkan jangkitan baharu. Jika ini berlaku, berjumpalah dengan doktor anda secepat mungkin.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika ubat ini membuatkan anda rasa pening, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Tablet Ceflour boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku ialah:

- Cirit-birit, loya, muntah; cirit-birit yang jarang berlaku teruk yang dipanggil *pseudomembranous colitis*.
- Ruam kulit, kegatalan, ruam, demam, atau dalam kes yang jarang berlaku, reaksi serius seperti anafilaksis atau reaksi kulit yang teruk.
- Perubahan yang jarang berlaku dalam sel darah, termasuk platelet atau sel darah putih yang rendah, atau sangat jarang anemia.
- Perubahan sementara dalam ujian hati; jarang sekali, keradangan hati atau jaundis.
- Sakit kepala atau pening.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Adverse Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet elips putih bersalut, satu belah dicetak dengan "YSP39".

-Bahan kandungan

-Bahan aktif

Cefuroxime

-Bahan tidak aktif

Croscarmellose sodium
Colloidal Silicon Dioxide
Titanium Dioxide
Crospovidone
Calcium citrate
Microcrystalline Cellulose
Lubrix wax
Hydroxypropylmethyl cellulose
Sodium Lauryl Sulfate

-Nombor MAL

MAL09032026AZ

Pengilang

Yung Shin Pharmaceutical Ind.Co. LTD.
No 1191, Sec .1, Chung Shan Road,
Tachia, Taichung
Taiwan, R.O.C.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

11/03/2026

Nombor siri

NPRA(R4/1)050226/00007