

LIPROCT[®] SUPPOSITORI

Lidocaine, Hydrocortisone acetate, Zinc oxide (60mg, 5mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LIPROCT SUPPOSITORI
2. Bagaimana LIPROCT SUPPOSITORI berfungsi
3. Sebelum menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI
4. Cara menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI
5. Semasa menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LIPROCT SUPPOSITORI
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan LIPROCT SUPPOSITORI

LIPROCT SUPPOSITORI digunakan untuk melegakan kesakitan, kegatalan dan ketidakselesaan di sekitar dubur (saluran belakang) yang disebabkan oleh keadaan tertentu.

Bagaimana LIPROCT SUPPOSITORI berfungsi

LIPROCT SUPPOSITORI mengandungi tiga bahan aktif, iaitu lidocaine (anestetik setempat) yang memberikan kelegaan cepat dengan menyebabkan kawasan tersebut menjadi kebas, hydrocortisone acetate (kortikosteroid) yang mengurangkan bengkak, kemerahan dan kegatalan, serta zinc oxide (pelindung kulit) yang melindungi dan melegakan kulit yang mengalami iritasi serta membantu proses penyembuhan.

Sebelum menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika anda:

- alah kepada lidocaine, hydrocortisone acetate, zinc oxide, anestetik setempat jenis amida yang lain, atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- mengalami jangkitan yang belum dirawat di kawasan sekitar dubur

yang disebabkan oleh bakteria, virus, kulat atau parasit.

- Sebelum menggunakannya

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.

Berbincang dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini jika punca gejala pada rektum anda belum dikenal pasti. Sesetengah gejala mungkin disebabkan oleh keadaan yang lebih serius, contohnya kanser.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

Sejumlah kecil ubat ini boleh masuk ke dalam susu ibu, tetapi tidak mungkin memudaratkan bayi anda apabila digunakan pada dos yang disyorkan. Gunakan ubat ini hanya seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Jika mengguna ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengguna sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengguna:

- ubat untuk degupan jantung yang tidak teratur.
- ubat lain yang mengandungi anestetik setempat (ubat yang menyebabkan kebas).

Cara menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI

- Berapa banyak harus digunakan

- Masukkan 1 suppositori ke dalam dubur pada waktu pagi, malam dan selepas setiap kali membuang air besar.
- Masukkan suppositori hanya sedikit ke dalam dubur.
- Jangan gunakan lebih daripada 5 suppositori dalam sehari.

- Bila perlu digunakan

Masukkan satu suppositori pagi dan malam dan selepas membuang air besar. Jika membuang air besar menyebabkan kesakitan, masukkan suppositori beberapa minit sebelum membuang air besar.

- Berapa lama perlu digunakan

- Rawatan biasanya berlangsung selama 10 hari hingga 3 minggu, atau mengikut arahan doktor anda.
- Jika anda perlu menggunakan ubat ini untuk tempoh yang lebih lama, doktor anda mungkin menasihatkan anda untuk berhenti menggunakannya buat sementara waktu sebelum memulakan semula rawatan.
- Jika berlaku kerengsaan atau kerengsaan tidak hilang, hentikan penggunaan ubat ini dan rujuk kepada doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Guna dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengguna ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan guna dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Menggunakan ubat ini secara berlebihan boleh menyebabkan pening, mengantuk, kekeliruan, menggigil, sawan, kesukaran bernafas atau degupan jantung yang tidak teratur.

Semasa menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna LIPROCT SUPPOSITORI mengikut arahan doktor.

LIPROCT® SUPPOSITORI

Lidocaine, Hydrocortisone acetate, Zinc oxide (60mg, 5mg, 400mg)

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan LIPROCT SUPPOSITORI kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan LIPROCT SUPPOSITORI kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Hentikan penggunaan ubat ini dan jumpa doktor anda jika anda mengalami kerengsaan, kesakitan yang semakin teruk atau pendarahan dari rektum.

Dalam kes yang jarang berlaku, ubat ini boleh diserap ke dalam badan dan menjejaskan otak atau sistem saraf, terutamanya jika digunakan dalam jumlah yang banyak. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika berlaku sawan.

Jangan gunakan ubat ini lebih lama daripada yang disyorkan. Penggunaan jangka panjang atau berlebihan boleh menyebabkan penipisan kulit atau kesan sampingan berkaitan steroid yang lain, walaupun kesan ini tidak mungkin berlaku jika digunakan mengikut arahan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, LIPROCT SUPPOSITORI boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- Sesetengah orang mungkin mengalami tindak balas alahan pada kulit, seperti kemerahan, kegatalan, ruam atau kerengsaan di kawasan ubat digunakan.
- Dalam kes yang sangat jarang berlaku, tindak balas alahan yang serius boleh berlaku. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami kesukaran bernafas, bengkak pada muka, bibir, lidah atau tekak, atau ruam yang teruk.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan LIPROCT SUPPOSITORI

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 25°C dan elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Suppositori spindel berwarna putih ke putih pudar.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:
Lidocaine
Hydrocortisone acetate
Zinc oxide

- Bahan tidak aktif:
Witepsol
Aluminium Subacetate

- Nombor MAL
MAL09011474AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

24/08/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)080726/00034