

HEMOCARE® GASCOAL® TABLET 50MG

Dimethylpolysiloxane (50mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Gascoal® Tablet 50mg
2. Bagaimana Gascoal® Tablet 50mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Gascoal® Tablet 50mg
4. Cara menggunakan Gascoal® Tablet 50mg
5. Semasa menggunakan Gascoal® Tablet 50mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Gascoal® Tablet 50mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Gascoal® Tablet 50mg

Gascoal® Tablet 50mg digunakan untuk melegakan kesakitan yang disebabkan oleh lebihan gas di saluran penghadaman. Ia juga digunakan untuk endoskopi (*upper gastrointestinal tract endoscopy*) bagi mengeluarkan buih yang mengaburkan pandangan semasa endoskopi dan juga mengurangkan bayang gas dalam radiografi.

Bagaimana Gascoal® Tablet 50mg berfungsi

Tindakan anti-buih dimethylpolysiloxane melegakan perut kembung dengan menyebarkan dan mencegah pembentukan lendir di sekeliling poket gas dalam saluran gastrousus. Ia bertindak di dalam perut dan usus untuk mengurangkan tegangan pada permukaan buih gas dan membolehkan gas dilepaskan dengan lebih senang melalui sendawa atau kentut.

Sebelum Menggunakan Gascoal® Tablet 50mg

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Gascoal® Tablet 50mg jika anda alah kepada dimethylpolysiloxane atau mana-mana komponen dalam produk ini. Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput pada pek atau pembungkusan telah terkoyak.

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda alah kepada dimethylpolysiloxane atau mana-mana komponen dalam produk ini.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda ingin menggunakan Gascoal® Tablet 50mg bersama dengan ubat-ubatan lain.

Selain itu, anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang anda sedang ambil, termasuklah ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Gascoal® Tablet 50mg

-Berapa banyak harus digunakan

1 tablet 4 kali sehari selepas makan dan waktu tidur. Boleh juga diambil bila diperlukan.

-Bila perlu digunakan

Gascoal® Tablet 50mg perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gascoal® Tablet 50mg perlu diambil mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos Gascoal Tablet 50mg, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, abaikan dos yang terlepas dan teruskan dengan jadual pengambilan ubat seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda pada masa yang sama untuk menggantikan dos yang terlupa diambil melainkan atas nasihat ahli perubatan anda.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jumpa dengan doktor anda atau dapatkan rawatan perubatan, jika anda atau orang lain disangka menggunakan ubat ini secara berlebihan.

Semasa menggunakan Gascoal® Tablet 50mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda apabila anda sedang mengambil Gascoal® Tablet 50mg.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun keadaan mereka serupa dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

Najis lembut, loya atau muntah-muntah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my (*Consumer→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan di dalam bekas kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C, lindungi daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

-Pelupusan

Lupuskan Gascoal Tablet 50mg apabila anda diarahkan untuk berhenti mengambil Gascoal® Tablet 50mg atau ubat ini telah luput tarikh.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, berbentuk bulat



-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Dimethylpolysiloxane

Bahan Tidak Aktif:

Lactose, Cellulose, Silicon Dioxide, Talc, Magnesium Stearate

-Nombor MAL

MAL19940049XZ

Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/05/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)120820/00121