

MACGEL TABLET

Magnesium Hydroxide / Aluminium Hydroxide / Dimethylpolysiloxane (200mg/200mg/25mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Macgel Tablet
2. Bagaimana Macgel Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Macgel Tablet
4. Cara menggunakan Macgel Tablet
5. Semasa menggunakan Macgel Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Macgel Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Macgel Tablet

MACGEL TABLET bertindak sebagai antasid untuk melegakan ketidakselesaan atau kembung perut yang disebabkan rembesan asid perut berlebihan, ulser perut, ulser duodenum dan keradangan gastrik.

Bagaimana Macgel Tablet berfungsi

Magnesium Hydroxide dan Aluminium Hydroxide adalah antasid yang bertindak untuk meneutralkan acid dalam perut.

Dimethylpolysiloxane memecahkan buih gas yang dihasilkan akibat ketidakhadaman makanan dan melegakan ketidakselesaan dan kembung perut.

Sebelum Menggunakan Macgel Tablet

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Macgel Tablet jika anda alah kepada mana-mana bahan yang terkandung dalam produk ini. Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput pada pek atau pembungkusan yang telah terkoyak.

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Macgel Tablet tidak boleh diberikan bersama dengan antibiotik tetracycline.

Cara menggunakan Macgel Tablet

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Kunyah 2-4 tablet sebelum telan atau telan seluruh tablet.

-Bila perlu digunakan

Ambil 4 kali sehari, selepas makan dan sebelum tidur.

-Berapa lama perlu digunakan

Macgel Tablet perlu diambil mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos Macgel tablet, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah mendekati masa pengambilan dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan teruskan pengambilan ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda pada masa yang sama untuk menggantikan dos yang terlupa.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan secara berlebihan boleh menyebabkan muntah dan cirit birit.

Semasa menggunakan Macgel Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda apabila anda sedang mengambil Macgel tablet.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah cara pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun keadaan mereka serupa dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor jika anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

MACGEL TABLET biasanya di terima baik. Kesan-kesan sampingan adalah najis lembut, cirit-birit, loya, muntah, sakit gastrik dan tiada selera makan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web <http://nptra.gov.my> (Consumer→Reporting

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Macgel Tablet

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, lindungi daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Jauhkan daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

MACGEL TABLET merupakan tablet berbentuk bulat, berwarna putih dengan tanda "YS" pada satu permukaan dan berwarna merah jambu dengan garis pemisahan pada permukaan yang lain.



-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:
Magnesium Hydroxide
Aluminium Hydroxide
Dimethylpolysiloxane

Bahan tidak aktif
Ponceau 4R
sunset yellow lake
Spearment Oil
Saccharin Sodium
Milk Flavor Powder
Polyethylene Glycol
Strawberry Oil
Sugar
Potato Starch
Corn Starch
Silicon Dioxide
Magnesium Stearate
Sodium Starch Glycolate
Mannitol
Lactose
Microcrystalline Cellulose
Isopropyl Alcohol

-Nombor MAL

MAL19940318X

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
Produk**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

05/02/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)100822/00054