

CASPRIN ENTERIC MICROENCAPSULATED CAPSULE

Aspirin (100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CASPRIN
2. Bagaimana CASPRIN berfungsi
3. Sebelum menggunakan CASPRIN
4. Cara menggunakan CASPRIN
5. Semasa menggunakan CASPRIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CASPRIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan CASPRIN

CASPRIN digunakan untuk rawatan serangan jantung akut, untuk mengelakkan serangan jantung dalam kumpulan berisiko tinggi tertentu dan bagi mengelakkan strok dalam individu yang pernah mengalami keadaan ini.

Bagaimana CASPRIN berfungsi

CASPRIN mempunyai kesan anti-keradangan dan anti-platelet. Ia mengurangkan keradangan dan mengurangkan kemampuan platelet untuk menjadi gumpalan yang menyebabkan kesan penipisan darah

Sebelum Mengambil CASPRIN

- Bila tidak boleh mengambil CASPRIN
- alahan terhadap aspirin atau bahan-bahan kandungan lain.
- penyakit hati atau buah pinggang yang teruk
- *haemophilia* atau gangguan pendarahan yang lain
- Hakisan atau radang perut atau ulser perut.
- * Tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun.

- Sebelum mula mengambil CASPRIN

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap sebarang ubat-ubatan lain atau anda mempunyai masalah kesihatan lain yang berkaitan terutamanya sejarah masalah pencernaan serius, asma dan fungsi hati atau buah pinggang yang terjejas.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ingin menggunakan CASPRIN bersama dengan ubat yang lain. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi seperti:

- kortikosteroid (untuk merawat keradangan)
- coumarin, anticoagulant, dipyridamole (agen penipisan darah)
- sulphonylurea, ubat yang mengurangkan gula darah (untuk merawat kencing manis)
- *methotrexate* (untuk merawat keradangan sendi)
- *phenytoin*, valproic acid (untuk merawat epilepsi)

Cara menggunakan CASPRIN

- Berapa banyak harus diambil

Satu biji sehari, diambil dengan segelas air.

- Bila perlu diambil

CASPRIN perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

CASPRIN perlu diambil mengikut nasihat doktor anda.

- Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos seterusnya, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan perhatian perubatan. Kes-kes yang ringan boleh menyebabkan loya, muntah, berpeluh, dahaga dan peningkatan kadar jantung. Dos berlebihan serius boleh menunjukkan demam, konvulsi, khayalan, koma dan kegagalan pernafasan.

Semasa menggunakan CASPRIN

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa anda mengambil CASPRIN

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun mereka mengalami keadaan yang serupa dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan serentak CASPRIN dengan minuman beralkohol harus dielakkan

- Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan termasuk gangguan gastrousus, loya, muntah, penghakisan lapisan perut dan ulser perut. Jika simptom berterusan, sila rujuk kepada doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel.: 03-78835490, atau laman web [http://npra.gov.my/\[Consumers→Reporting Side Effects to Medicines \(ConSERF\) or Vaccines \(AEFI\)\]](http://npra.gov.my/[Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)])

Cara penyimpanan dan pelupusan CASPRIN

- Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan. Simpan dalam bekas yang ketat.

- Cara pelupusan

CASPRIN perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kapsul lutsinar sayuran berwarna oren dan tidak berwarna, mengandungi pelet berwarna putih hingga putih kekuningan. Kedua-dua penutup dan badan kapsul ditanda dengan "AECp".

- **Bahan-bahan kandungan**

Bahan aktif-
Aspirin

Bahan tidak aktif-
Kapsul Sayuran

- **Nombor MAL**

MAL19986502XZ

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran
Produk**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5,7,12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

25/07/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)090419/00085