

SWECON[®] TABLET

Magnesium Aluminium Hydroxide Carbonate (Hydrotalcite) (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Swecon[®] Tablet
2. Bagaimana Swecon[®] Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Swecon[®] Tablet
4. Cara menggunakan Swecon[®] Tablet
5. Semasa menggunakan Swecon[®] Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Swecon[®] Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Swecon[®] Tablet

Swecon[®] Tablet digunakan untuk ulser gastrik, keradangan lapisan dalam perut serta asid gastrik berlebihan.

Bagaimana Swecon[®] Tablet berfungsi

Swecon[®] Tablet berfungsi dengan mengurangkan kandungan asid di dalam perut.

Sebelum menggunakan Swecon[®] Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil Swecon[®] Tablet jika anda menghadapi penyakit buah pinggang, jantung, cirit-birit dan mempunyai kadar magnesium yang tinggi.
- Sebelum menggunakan Swecon[®] Tablet
Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.
- Jika mengambil ubat-ubatan lain
Jangan mengambil Swecon[®] Tablet dalam 1 hingga 2 jam selepas mengambil antibiotik *tetracycline*. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Swecon[®] Tablet

- Berapa banyak harus digunakan
Kunyah sebelum telan.
Dewasa: 2 tablet 3 – 4 kali sehari.
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.
- Bila perlu digunakan
Ambil semasa perut kosong di antara waktu makan atau sebelum tidur, bergantung kepada umur dan tahap ketenatan.
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Berapa lama perlu digunakan
Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Jika terlupa menggunakan
Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal
- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)
Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Swecon[®] Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan
Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Swecon[®] Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah cara pengambilan ubat tanpa arahan doktor.

Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada mereka yang mempunyai masalah buah pinggang. Penggunaan oleh wanita hamil perlu diberikan perhatian.

Kesan-kesan sampingan

Kadang-kala: Cirit-birit, najis lembut, mulut kering dan gangguan tabiat makan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].


Cara penyimpanan dan pelupusan Swecon[®] Tablet

- Penyimpanan
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.
- Pelupusan
Swecon[®] Tablet perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah tamat tarikh luput. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Swecon® Tablet merupakan tablet bulat berwarna putih. Satu permukaan ditandakan dengan "SWECON" dan permukaan lain ditandakan dengan satu bulatan serta satu titik di tengah-tengah.



- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif

Magnesium Aluminium Hydroxide
Carbonate (Hydrotalcite)

- Bahan-bahan tidak aktif

Sodium Saccharin
Sodium Starch Glycolate
Starch
Cellulose
Magnesium Stearate
Polyethylene Glycol
Menthol
Pineapple Flavour
Milk Flavour
Povidone
Magnesium Aluminium Silicate

- Nombor MAL

MAL19972152X

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/02/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)010221/00005