

YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

Bisacodyl (10mg, 5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES
2. Bagaimana YSP BISACODYL SUPPOSITORIES berfungsi
3. Sebelum menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES
4. Cara menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES
5. Semasa menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

YSP BISACODYL SUPPOSITORIES digunakan untuk merawat sembelit dan penyediaan usus untuk prosedur sinar-x dan pembedahan.

Bagaimana YSP BISACODYL SUPPOSITORIES berfungsi

YSP BISACODYL SUPPOSITORIES tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai laksatif perangsang. Laksatif perangsang meningkatkan pergerakan usus.

Sebelum Menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES jika anda atau anak anda mempunyai:

- alahan terhadap bisacodyl atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)
- terdapat keadaan halangan usus
- keadaan pembedahan abdomen akut seperti apendisitis akut (keradangan apendiks)
- penyakit radang usus akut (keradangan saluran penghadaman secara tiba-tiba)
- gejala perut yang tidak didiagnosis.

- Sebelum menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai:

- Penyakit radang usus.

- Fisur dubur atau buasir yang berulser.
- Mengandung, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan yang boleh mengganggu YSP Bisacodyl Suppositories adalah:

- Ubat diuretik (dikenali sebagai pil air, yang berfungsi mengeluarkan air dan garam berlebihan daripada badan)
- Ubat adrenokortikoid (steroid)

Cara menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

- Berapa banyak harus digunakan

i) Sembelit:

Dewasa dan kanak-kanak lebih daripada 10 tahun: Satu supositori 10mg untuk kesan segera setiap hari.

Kanak-kanak 4 – 10 tahun: Satu supositori 5mg untuk kesan segera setiap hari.

ii) Penyediaan usus:

Dewasa dan kanak-kanak lebih daripada 10 tahun: Satu supositori 10mg pada waktu pagi sebelum prosedur.

Kanak-kanak 4 – 10 tahun: Satu supositori 5mg pada waktu pagi sebelum prosedur.

Bisacodyl suppository biasanya berkesan dalam masa 30 minit selepas dimasukkan ke dalam dubur. Dalam pengurusan sembelit, selepas kekerapan pergerakan usus pulih seperti biasa, dos harus dikurangkan dan biasanya boleh dihentikan.

- Bila perlu digunakan

YSP BISACODYL SUPPOSITORIES biasanya digunakan sekali sehari atau apabila diperlukan atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi, atau sehingga semua gejala telah hilang.

- Jika anda terlupa menggunakan

Guna dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan guna dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kekeliruan, degupan jantung tidak teratur, kekejangan otot abdomen, keletihan yang luar biasa, atau kelemahan.

Semasa menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mulakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan YSP BISACODYL SUPPOSITORY kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan produk laksatif jika anda mengalami sakit perut, loya, dan muntah kecuali diarahkan oleh doktor. Penggunaan ubat ini secara berpanjangan harus dielakkan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti laksatif yang lain, kekejangan perut kadang-kadang boleh diperhatikan, terutamanya pada individu yang mengalami sembelit yang teruk. Apabila dimasukkan melalui dubur, ia kadang-kadang boleh menyebabkan kerengsaan tempatan.

YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

Bisacodyl (10mg, 5mg)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [*Consumer→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan YSP BISACODYL SUPPOSITORIES

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 25°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan. Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Supositori berbentuk gelendong yang berwarna putih hingga putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif:

Bisacodyl

- Bahan Tidak Aktif:

Witepsol

- Nombor MAL:

5mg: MAL05023177XZ

10mg: MAL19989041XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/06/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)231024/00119