

PORO SUPPOSITORY

Paracetamol (125mg/250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PORO SUPPOSITORY
2. Bagaimana PORO SUPPOSITORY berfungsi
3. Sebelum menggunakan PORO SUPPOSITORY
4. Cara menggunakan PORO SUPPOSITORY
5. Semasa menggunakan PORO SUPPOSITORY
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PORO SUPPOSITORY
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan PORO SUPPOSITORY

PORO SUPPOSITORY digunakan untuk melegakan simptom demam, dan kesakitan yang berkaitan dengan selesema biasa.

Bagaimana PORO SUPPOSITORY berfungsi

PORO SUPPOSITORY mengandungi paracetamol, yang merupakan antipiretik dengan sifat ubat penahan sakit. Paracetamol melegakan kesakitan dengan menyekat isyarat sakit dalam sistem saraf pusat dan mengurangkan demam dengan bertindak ke atas pusat kawalan suhu otak untuk menggalakkan kehilangan haba.

Sebelum menggunakan PORO SUPPOSITORY

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap paracetamol atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

-Sebelum menggunakan PORO SUPPOSITORY

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika: anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang;
- anda sedang mengambil produk lain yang mengandungi Paracetamol

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk apa-apa ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil/menggunakan:

- ubat yang mengandungi chloramphenicol (antibiotik)
- metoclopramide (ubat yang digunakan untuk melegakan gejala seperti loya dan muntah)

Cara menggunakan PORO SUPPOSITORY

-Berapa banyak harus digunakan

Masukkan ke dalam rektum setiap 4 jam mengikut keperluan, sehingga empat kali sehari.

Kanak-kanak 1-2 tahun: Satu 125mg supositori.

Kanak-kanak 2-6 tahun: Satu ke dua 125mg supositori.

Kanak-kanak 6-12 tahun: Satu ke dua 250mg supositori.

-Bila perlu digunakan

Masukkan ke dalam rektum, mengikut keperluan, sekurang-kurangnya setiap 4 jam, tidak melebihi 4 kali sehari.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anak anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil/menggunakan terlalu banyak ubat ini (terlebih dos) boleh menyebabkan muntah, sakit perut, tekanan darah rendah dan berpeluh. Masalah serius dengan hati, seperti kekuningan kulit atau mata (jaundis), gula darah yang sangat rendah, atau

pembentukan asid dalam badan, mungkin hanya muncul selepas 3 hari. Walaupun anda berasa sihat, adalah penting untuk mendapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera jika dos berlebihan disyaki, kerana gejala yang teruk mungkin tertangguh. Rawatan berkesan jika dimulakan awal dan masih boleh membantu walaupun selepas 24 jam. Doktor boleh memberi ubat khas (acetylcysteine) melalui titisan untuk mengurangkan risiko kerosakan hati atau kematian.

Semasa menggunakan PORO SUPPOSITORY

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Basuh tangan anda sebelum dan selepas memasukkan suppositori.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Poro Suppositori.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Poro Suppository kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Ambil langkah berjaga-jaga tambahan jika anda/anak anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

Jumpa doktor dengan segera jika demam berlarutan lebih daripada 3 hari atau kembali semula, atau sakit berlarutan lebih daripada 5 hari.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, PORO SUPPOSITORY boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

PORO SUPPOSITORY

Paracetamol (125mg/250mg)

Kemungkinan antara kesan sampingan paracetamol yang dilaporkan:

- Biasanya ringan.
- Kadangkala boleh menyebabkan ruam kulit atau tindak balas alahan lain.
- Dalam kes yang jarang berlaku, tindak balas kulit yang serius mungkin berlaku (seperti ruam yang teruk, bengkak muka/bibir, atau keadaan berbahaya seperti Sindrom Stevens-Johnson atau Toxic Epidermal Necrolysis).

Nombor siri

NPRA(R4/1)260825/00066

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan PORO SUPPOSITORY

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 25°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Supositori berwarna putih atau putih pudar berbentuk gelendong

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif-

Paracetamol (*Acetaminophen*)

Bahan tidak aktif-

Witepsol

-Nombor MAL

PORO SUPPOSITORY

MAL19991441XZ

PORO SUPPOSITORY 250MG

MAL20014363XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/10/2025