

PORO[®] SUSPENSION 250MG/5ML (STRAWBERRY FLAVOUR)

Paracetamol (250mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Poro[®] Suspension
2. Bagaimana Poro[®] Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Poro[®] Suspension
4. Cara menggunakan Poro[®] Suspension
5. Semasa menggunakan Poro[®] Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Poro[®] Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Poro[®] Suspension
Poro[®] Suspension digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan yang ringan atau sederhana.

Bagaimana Poro[®] Suspension berfungsi

Poro[®] Suspension mengandungi paracetamol yang mempunyai kesan analgesik untuk mengurangkan kesakitan, dan kesan antipiretik yang dapat menurunkan demam.

Sebelum menggunakan Poro[®] Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Poro[®] Suspension jika anda alah kepada paracetamol atau mana-mana komponen dalam produk ini.

- Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda alah kepada paracetamol atau anda mempunyai masalah kesihatan yang lain. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami penyakit anemia (kekurangan sel darah merah yang sihat), penyakit jantung, paru-paru, buah pinggang atau hati.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan ubat aspirin atau ubat antikoagulan (ubat untuk mencairkan darah atau menghalang pembekuan darah). Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi.

Cara menggunakan Poro[®] Suspension

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak 1 – 5 tahun:

2.5mL – 5mL (1/2 – 1 sudu teh)

Kanak-kanak 6 – 12 tahun:

5mL – 10mL (1 – 2 sudu teh)

Ubat ini boleh digunakan setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan (Maksimum 4 dos dalam 24 jam). Jangan melebihi dos yang ditetapkan.

- Bila perlu digunakan

Poro[®] Suspension perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Ubat ini boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Poro[®] Suspension seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jikalau demam berterusan melebihi 3 hari atau keadaan berulang, atau kalau kesakitan berterusan untuk lebih daripada 5 hari, sila jumpa doktor dengan segera.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos Poro[®] Suspension, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa,

kecuali dinasihati oleh ahli profesional kesihatan.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital yang terdekat jika anda atau orang lain telah melebihi dos ubat ini. Hubungi hospital atau doktor walaupun anda atau orang lain tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakselesaan atau kesan keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Mengambil ubat ini melebihi dos boleh menyebabkan: loya, muntah, tekanan darah rendah dan berpeluh.

Semasa menggunakan Poro[®] Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda apabila anda sedang mengambil Poro[®] Suspension.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi Poro[®] Suspension kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

AMARAN

Ubat ini mengandungi
PARACETAMOL.

Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Jika tindak balas terhadap ubat ini berlaku, berhenti menggunakannya dan

PORO[®] SUSPENSION 250MG/5ML

(STRAWBERRY FLAVOUR)

Paracetamol (250mg/5mL)

dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Jikalau demam berterusan melebihi 3 hari atau keadaan berulang, atau kalau kesakitan berterusan untuk lebih daripada 5 hari, sila jumpa doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan paracetamol adalah ringan, walau bagaimanapun paras darah yang tidak normal pernah dilaporkan.

Reaksi alahan kulit termasuk kemerahan pada kulit, angioedema (pembengkakan lapisan kulit dalam yang disebabkan oleh pengumpulan cecair), Steven-Johnson Syndrome (penyakit kulit dimanifestasi dengan ruam sakit yang merebak dan melepuh) atau Toxic Epidermal Necrolysis (penyakit kulit dimanifestasi dengan kemerahan dan kulit melecet yang mungkin merebak ke mata, mulut dan kemaluan).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Poro[®] Suspension

- Penyimpanan

Simpan dalam bekas yang kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk

melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Ampaian berwarna merah jambu, perisa strawberi.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Paracetamol

Bahan tidak aktif:

Ponceau 4R

Propyl Paraben

Tween 80

Strawberry Oil

Methyl Paraben

Aerosil

Glycerin

Citric Acid

Purified Water

Sodium Sacharine

Carboxymethylcellulose Sodium

Sugar

Sodium Citrate

- Nombor MAL:

MAL19993051XZ

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

02/05/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)120820/00118