

ANUCARE SUPPOSITORY

Zinc Oxide, Balsam Peru, Benzyl Benzoate (300mg, 50mg, 33mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini mengandungi informasi berikut:

1. Apakah kegunaan ANUCARE SUPPOSITORY
2. Bagaimana ANUCARE SUPPOSITORY berfungsi
3. Sebelum menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY
4. Cara menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY
5. Semasa menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ANUCARE SUPPOSITORY
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ANUCARE SUPPOSITORY

ANUCARE SUPPOSITORY digunakan untuk rawatan buasir tidak teruk, keradangan yang ringan pada bahagian usus rektum dan kegatalan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan radang pada lapisan rektum (*proctitis*) atau *cryptitis* (radang pada usus (*cript*)).

Ia boleh digunakan sebelum and selepas pembedahan pembedahan buasir (*haemorrhoidectomy*) dan pemulihan bahagian fistula dubur (*anal fistula*) dan juga selepas pembedahan gumpalan darah beku pada saluran darah yang merupakan pusat trombotik (*thrombosed*) atau pengerasan pada urat anorektal (*sclerosed anorectal vein*).

Bagaimana ANUCARE SUPPOSITORY berfungsi

Balsam Peru mempunyai fungsi antiseptik disebabkan oleh kandungannya iaitu *cinnamic* dan asid benzoik. Ia boleh digunakan untuk rawatan kegatalan (*pruritus*) dan untuk melegakan simptom yang disebabkan oleh buasir.

Zink oksida berfungsi sebagai sejenis astringen sederhana yang memberikan kesan penenangan dan perlindungan kepada buasir.

Benzyl benzoate digunakan bersama-sama dengan zink oksida dan Balsam Peru untuk merawat buasir yang tidak teruk, radang anorektal dan kegatalan yang disebabkan

oleh *proctitis* atau *cryptitis*.

Sebelum menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY

Bila tidak boleh menggunakan

Apabila anda alah terhadap Zinc Oksida, Balsam Peru, *Benzyl Benzoate*.

Sebelum mula menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY

Berapa banyak harus digunakan

Satu suppositori dimasukkan melalui rektum dan digunakan pada waktu pagi dan malam .

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi berkenaan dengan tempoh dan masa penggunaan ubat ini.

Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas anda tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan ANUCARE SUPPOSITORY

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda semasa menggunakan ubat ini. Basuh tangan sebelum dan selepas menggunakannya.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Dilarang memasukkan ANUCARE SUPPOSITORY ke dalam mulut.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Benzyl benzoate boleh menyebabkan iritasi pada mata dan membran mukus, dan juga pada kulit. Tidak selamat diambil dengan mulut kerana ia boleh merosakkan buah pinggang.

Elakkan dari menggunakannya semasa hamil atau waktu menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan jarang berlaku. Berhenti menggunakan ubat ini sekiranya kesan sampingan kelihatan. Sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi dengan segera sekiranya anda mengalami tanda-tanda kesan sampingan ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumersà Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan ANUCARE SUPPOSITORY

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan

ANUCARE SUPPOSITORY perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Suppositori bewarna putih sehingga kuning air.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif-

Zinc Oxide

Balsam Peru

Benzyl Benzoate

Bahan tidak aktif-

Hard fat

Calcium Phosphate Dibasic

Nombor MAL

MAL20020702X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran

Produk:

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

11/09/2025