

HOME CARE GUAFENSIN SYRUP

Guaifenesin (20mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan GUAFENSIN SYRUP
2. Bagaimana GUAFENSIN SYRUP berfungsi
3. Sebelum menggunakan GUAFENSIN SYRUP
4. Cara menggunakan GUAFENSIN SYRUP
5. Semasa menggunakan GUAFENSIN SYRUP
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan GUAFENSIN SYRUP
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan GUAFENSIN SYRUP

GUAFENSIN SYRUP digunakan untuk rawatan batuk dengan kahak.

Bagaimana GUAFENSIN SYRUP berfungsi

GUAFENSIN SYRUP mengandungi Guaifenesin. Ia membantu melonggarkan kahak dan memudahkan penyingkiran.

Sebelum menggunakan GUAFENSIN SYRUP

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika anda dan anak anda mempunyai alahan terhadap Guaifenesin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan GUAFENSIN SYRUP

Dapatkan nasihat doktor anda jika anda:

- Mengandung, merancang mengandung atau sedang menyusukan anak.
- adalah *phenylketonuric* (gangguan genetik metabolik yang jarang)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan GUAFENSIN SYRUP

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa, dan kanak-kanak berumur lebih daripada 12 tahun: 10ml.

Kanak-kanak

6-12 tahun: 5ml.

1-6 tahun: 2.5ml.

Di bawah umur 1 tahun: Tidak disarankan.

- Bila perlu digunakan

Ambil empat kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut, loya dan muntah.

Semasa menggunakan GUAFENSIN SYRUP

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan GUAFENSIN SYRUP

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi GUAFENSIN SYRUP kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Dapatkan nasihat doktor jika batuk masih berterusan selepas menggunakan ubat selama 7 hari atau jika demam, ruam kulit, sakit kepala berterusan, atau sakit tekak disertai batuk.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, GUAFENSIN SYRUP boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

GUAFENSIN SYRUP mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut, loya dan muntah.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
GUAFENSIN SYRUP**

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C, lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan jernih yang berwarna kemerahan dengan perisa buah pic.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Guaifenesin
- Bahan tidak aktif
Ponceur 4R
Menthol
Spearmint oil
Sodium benzoate
Sodium Citrate
Citric acid
Sorbitol
Aspartame
Propylene glycol
Sucrose
Peach Essence
Povidone
Purified water

- Nombor MAL

MAL07122841X

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Y.S.P Industries (M) Sdn Bhd
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section
13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP
30/05/2025

Nombor siri:
NPRA(R4/1)120724/00090