

VALFIX FILM COATED TABLET 150MG

Lamivudine (150mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan VALFIX F.C. TABLET 150MG.
2. Bagaimana VALFIX F.C. TABLET 150MG berfungsi.
3. Sebelum mengambil VALFIX F.C. TABLET 150MG.
4. Cara mengambil VALFIX F.C. TABLET 150MG.
5. Semasa mengambil VALFIX F.C. TABLET 150MG.
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan VALFIX F.C. TABLET 150MG.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan VALFIX F.C. TABLET 150MG

Sebagai rawatan kombinasi dengan rawatan antiretrovirus yang lain untuk merawat dewasa dan kanak-kanak yang dijangkiti HIV.

Bagaimana VALFIX F.C. TABLET 150MG berfungsi

VALFIX F.C. TABLET 150MG ialah ubat antiretrovirus yang menahan virus immunodefisiensi manusia (HIV). Ubat ini merupakan kelas antiretrovirus penghalang transkriptase berbalik analog nukleosida (NRTIs).

Sebelum mengambil VALFIX F.C. TABLET 150MG

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah kepada VALFIX F.C. TABLET 150MG atau mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini, sila minta nasihat daripada doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda alah kepada mana-mana ubat-ubatan lain atau mempunyai apa-apa keadaan perubatan lain.

Penyakit Buah Pinggang:

Bincangkan penggunaan VALFIX F.C. TABLET 150MG dengan doktor atau pembekal penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai penyakit buah pinggang.

Penyakit Hati / Pindahan Hati:

Sila beritahu doktor atau penjaga kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah penyakit hati.

Dalam kes di mana rawatan dengan VALFIX F.C. TABLET 150MG dihentikan atas sebarang sebab, pesakit perlu menjalankan pemeriksaan fungsi hati secara berkala.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat-ubatan lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubatan yang jika diambil bersama VALFIX F.C. TABLET 150MG akan menyebabkan tindak balas ubat. Ini termasuk:

- Co-trimoxazole
- Emtricitabine
- Cladribine
- Ubat lain yang mengandungi lamivudine.

Cara mengambil VALFIX F.C. TABLET 150MG

Berapa banyak harus diambil

150mg dua kali sehari atau 300mg sekali sehari, boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Sila mengambil ubat ini dengan mengikuti arahan doktor. Dos biasa disyorkan mungkin perlu dikurangkan dalam golongan kanak-kanak, orang tua dan pesakit yang menghidap penyakit buah pinggang. Tiada pengurangan dos diperlukan dalam pesakit yang menghidap penyakit hati sederhana atau serius melainkan pesakit terbabat juga menghidap penyakit buah pinggang.

Bila perlu diambil

VALFIX F.C. TABLET 150MG perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu diambil

VALFIX F.C. TABLET 150MG perlu diambil mengikut arahan doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos VALFIX F.C. TABLET 150MG dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihatkan oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama untuk menggantikan dos yang terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan VALFIX F.C. TABLET 150MG tidak menyebabkan masalah serius. Walau bagaimanapun, anda perlu mendapatkan perhatian doktor jika terambil berlebihan.

Semasa menggunakan VALFIX F.C. TABLET 150MG

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Sila memaklumkan doktor anda sekiranya anda mengandungi semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

VALFIX FILM COATED TABLET 150MG

Lamivudine (150mg)

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berwaspada menggunakan VALFIX F.C. TABLET 150MG bagi pesakit dengan masalah buah pinggang. Sila mematuhi arahan doktor. Jika anda berasa tidak selesa, sila hubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan yang biasa adalah seperti berikut:

- Kelelahan dalam darah
- Ruam
- Keguguran rambut
- Demam
- Keletihan
- Sakit kepala
- Ketidakelesaan perut
- Sakit perut
- Rasa sakit (loya)
- Muntah
- Cirit-birit
- Sakit otot dan rasa tidak selesa
- Sakit sendi

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

Pelupusan

VALFIX F. C. TABLET 150MG perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk

melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet yang berbentuk berlian yang berwarna putih dengan perkataan "YSP".



Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:-

Lamivudine

Bahan tidak aktif:-

Microcrystalline Cellulose
Sodium Starch Glycolate
Magnesium Stearate
Colloidal Silicon Dioxide
Hydroxypropyl Methylcellulose
Polyethylene Glycol
Titanium Dioxide

Nombor MAL

MAL18086129AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7 & 12, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05/06/2024

Nombor Siri

NPRA (Rx/x)xxxxxx/xxxxx