

EZYCOR TABLET 10MG

Ezetimibe Tablet 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ezycor
2. Bagaimana Ezycor berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ezycor
4. Cara menggunakan Ezycor
5. Semasa menggunakan Ezycor
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ezycor
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ezycor

Ezycor adalah tablet yang mengandungi 10mg *ezetimibe* sebagai bahan aktif.

- Ezycor adalah ubat rendah kolesterol.
- Ezycor adalah untuk pesakit yang tahap kolesterolnya terlalu tinggi dan apabila diet sahaja tidak dapat menurunkan tahap kolesterol secukupnya.
- Ezycor mengurangkan jumlah kolesterol, kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan trigliserida yang terlalu tinggi, dan juga meningkatkan kolesterol HDL (kolesterol baik).
- Ezycor boleh diambil tanpa ubat lain ataupun dengan ubat rendah kolesterol yang lain yang digelar *statin*, di samping mengawal pemakanan.
- Ezycor boleh diambil bersama dengan *fenofibrate*, iaitu sejenis ubat rendah kolesterol yang lain, di samping mengawal pemakanan.
- Bagi pesakit jantung, Ezycor yang digabungkan dengan ubat rendah kolesterol yang dikenali sebagai *statin* dapat mengurangkan risiko berlakunya serangan jantung, strok, pembedahan untuk melancarkan aliran darah di jantung, atau kemasukan ke hospital kerana sakit dada.

Jika anda mempunyai *sitosterolemia*, doktor anda mempreskripsikan Ezycor untuk menurunkan tahap sterol tumbuhan di dalam darah anda.

Sitosterolemia adalah penyakit keturunan yang meningkatkan aras sterol tumbuhan di dalam darah anda.

Bagaimana Ezycor berfungsi

- Ezycor bertindak dengan mengurangkan penyerapan kolesterol dalam usus kecil. *Statin* dan *fenofibrate* menurunkan kolesterol dengan cara yang berbeza; mereka bertindak di dalam hati.
- Ezycor menambahkan kesan penurunan kolesterol yang ada pada *statin* dan *fenofibrate*.

Mengapa doktor mempreskripsikan Ezycor?

Doktor anda mempreskripsikan Ezycor untuk mengurangkan jumlah kolesterol dan trigliserida dalam darah anda. Kolesterol adalah salah satu bahan berlemak yang terdapat di dalam darah. Jumlah kolesterol anda terdiri terutamanya daripada kolesterol LDL dan kolesterol HDL.

Kolesterol LDL sering dikenali sebagai kolesterol jahat kerana ia boleh berkumpul pada dinding arteri anda dan menjadi plak. Lama kelamaan, plak tersebut boleh menyebabkan penyempitan arteri. Penyempitan arteri boleh melambatkan atau menyekat aliran darah ke organ-organ penting seperti jantung dan otak. Aliran darah yang tersekat kemudian boleh mengakibatkan serangan jantung atau strok.

Kolesterol HDL sering dikenali sebagai kolesterol baik kerana ia menghalang kolesterol jahat daripada berkumpul dalam arteri

dan melindunginya daripada penyakit jantung.

Trigliserida adalah bentuk lain kolesterol di dalam darah anda yang boleh meningkatkan risiko anda untuk menghidap penyakit jantung.

Bagaimana kolesterol tinggi boleh dirawat?

Kolesterol tinggi boleh dirawat dengan dua cara utama:

Perubahan Gaya Hidup - termasuk pemakanan yang rendah kolesterol, peningkatan aktiviti fizikal, dan pengurusan berat badan.

Ubat-ubatan – Penggunaan ubat rendah kolesterol bersama dengan perubahan gaya hidup dapat membantu menurunkan kolesterol. Doktor anda telah mempreskripsikan Ezycor untuk membantu menurunkan kolesterol anda.

Sebelum menggunakan Ezycor

Ia adalah penting untuk mengambil Ezycor setiap hari seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

Walaupun anda sedang mengambil ubat untuk merawat kolesterol tinggi, anda tetap perlu memantau tahap kolesterol anda secara berkala. Anda juga perlu tahu tahap kolesterol dan sasaran anda.

Penggunaan untuk warga tua

Tiada langkah berjaga-jaga yang khas.

Penggunaan untuk kanak-kanak

Ezycor tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 10 tahun.

- Bila tidak boleh menggunakan

Pesakit yang hipersensitif (alah) kepada Ezycor atau mana-mana bahannya tidak boleh mengambil Ezycor.

EZYCOR TABLET 10MG

Ezetimibe Tablet 10mg

- Sebelum mula menggunakan Ezycor

Beritahu doktor anda tentang:

Kehamilan: Jika anda hamil atau merancang untuk hamil, Ezycor mungkin tidak sesuai untuk anda.

Menyusu badan: Jika anda menyusu dengan susu badan, Ezycor boleh dirembes ke dalam susu anda dan diminum oleh bayi.

Masalah Perubatan atau Alahan: Berbincang sebarang masalah perubatan (termasuk penyakit hati atau masalah hati) atau alahan yang sedang anda alami atau pernah alami.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor tentang semua ubat yang anda ambil atau merancang untuk ambil, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Khususnya, beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan dengan mana-mana bahan aktif berikut:

- *Ciclosporin* (sering digunakan dalam pesakit pemindahan organ)
- Ubat-ubatan dengan bahan aktif untuk mengelakkan bekuan darah, seperti *warfarin* atau *fluindione* (antikoagulan)
- *Cholestyramine* (juga digunakan untuk menurunkan kolesterol), kerana ia mempengaruhi cara Ezycor berfungsi
- *Fibrates* (juga digunakan untuk menurunkan kolesterol)

Cara menggunakan Ezycor

- Berapa banyak harus digunakan

Ambil satu biji tablet 10mg setiap hari, pada bila-bila masa.

- Bila perlu digunakan

- Ambil Ezycor dengan atau tanpa makanan.
- Doktor anda mungkin akan menyuruh anda mengambil Ezycor bersama dengan ubat lain yang dikenali sebagai *statin*, atau dengan ubat lain yang dikenali sebagai *fenofibrate*, untuk membantu anda mengawal kolesterol dengan lebih baik.
- Jika anda mengambil *statin* atau *fenofibrate*, Ezycor boleh diambil pada masa yang sama dengan ubat tersebut.
- Sekiranya doktor anda mempreskripsikan Ezycor bersama dengan *cholestyramine* (sejenis sekuestran asid hempedu) atau mana-mana sekuestran asid hempedu yang lain, Ezycor perlu diambil sekurang-kurangnya 2 jam sebelum atau 4 jam selepas mengambil sekuestran asid hempedu tersebut.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat rendah kolesterol kecuali disuruh berhenti oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Cuba ambil Ezycor seperti yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, jika anda terlepas dos, teruskan mengikut jadual seperti biasa, iaitu satu biji sekali sehari.

- Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)

Ambil Ezycor hanya seperti yang diarahkan untuk anda. Jika anda terlebi dos, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Ezycor

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ezycor perlu diambil seperti yang diarahkan oleh pegawai kesihatan anda.

- Bincangkan tentang ubat lain yang anda ambil atau merancang untuk ambil. Ini termasuk ubat-ubatan yang diperoleh tanpa preskripsi.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil Ezycor jika anda hipersensitif (alahan) kepada Ezycor atau mana-mana bahan yang lain.
- Jangan berikan Ezycor kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Bolehkah saya memandu atau mengendalikan jentera semasa mengambil Ezycor?

Terdapat kesan sampingan yang dilaporkan dengan Ezycor yang boleh menjejaskan kemampuan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Tindak balas setiap individu terhadap Ezycor mungkin berbeza (Lihat Kesan-kesan sampingan).

Kesan-kesan sampingan

Ezycor pada amnya dapat diterima dengan baik. Kesan sampingan biasanya ringan dan tidak menyebabkan pesakit berhenti menggunakan Ezycor.

Apabila dimakan ia sahaja, kesan sampingan berikut dilaporkan:

Lazim berlaku: sakit perut, cirit-birit, kembung perut, rasa letih.

Tidak lazim berlaku: peningkatan pada hasil beberapa ujian darah fungsi hati (*transaminase*) atau fungsi otot (CK), batuk, ketidakhadaman, pedih ulu hati, loya, kesakitan sendi, kekejangan

EZYCOR TABLET 10MG

Ezetimibe Tablet 10mg

otot, sakit leher, kurang selera makan, sakit, sakit dada, hangat memerah, tekanan darah tinggi.

Tambahan pula, apabila digunakan dengan *statin*, kesan sampingan berikut dilaporkan:

Lazim berlaku: peningkatan pada hasil beberapa ujian fungsi hati (*transaminase*), sakit kepala, sakit otot, nyeri atau kelemahan.

Tidak lazim berlaku: sensasi kesemutan, mulut kering, gatal-gatal, ruam, urtikaria, sakit belakang, kelemahan otot, sakit pada lengan dan kaki, keletihan atau kelemahan yang luar biasa, bengkak, terutamanya di tangan dan kaki.

Apabila digunakan dengan *fenofibrate*, kesan sampingan berikut dilaporkan:

Lazim berlaku: sakit perut.

Selain itu, kesan sampingan berikut telah dilaporkan secara umum: reaksi alahan (yang mungkin memerlukan rawatan segera) termasuk bengkak pada bahagian muka, bibir, lidah, dan / atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan, ruam, dan urtikaria, ruam merah yang timbul, kadang-kadang dengan luka berbentuk sasaran, sakit otot, keletihan atau kelemahan yang luar biasa, perubahan dalam beberapa ujian darah makmal, masalah hati, radang pankreas, sembelit, pening, sensasi kesemutan, kemurungan, batu hempedu dan radang pundi hempedu.

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami sakit otot yang tidak dapat dijelaskan, nyeri, atau kelemahan semasa mengambil Ezycor.

Ini kerana walaupun jarang berlaku, masalah otot boleh menjadi serius,

termasuk kerosakan otot yang mengakibatkan kerosakan buah pinggang.

Bincang dengan doktor anda pada bila-bila masa jika anda mempunyai masalah perubahan yang mungkin berkaitan dengan Ezycor.

Jika anda diberi Ezycor dengan *statin*, ahli kesihatan profesional anda mungkin hendak menjalankan ujian darah rutin untuk memeriksa fungsi hati anda sebelum dan selepas memulakan rawatan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Bagaimana saya boleh tahu lebih lanjut tentang Ezycor dan penyakit saya?

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada doktor atau ahli farmasi anda.

Cara penyimpanan dan pelupusan Ezycor

- Penyimpanan

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada kelembapan.

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada bungkusan.

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk kapsul yang berwarna putih hingga putih kekuningan, permukaan rata dengan tepi serong, tablet tidak bersalut, dengan "10" dicetak pada satu sisi dan tidak dicetak pada sisi lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ezetimibe

- Bahan tidak aktif

Lactose monohydrate
Croscarmellose sodium
Povidone k-30
Sodium lauryl sulfate
Polysorbate 80
Magnesium stearate

- Nombor MAL:

MAL XXXXXXXXAZ

Pengilang

INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED.

Plot No. 457 & 458, Village Matoda, Bavla Road and Plot No. 191/218P, Village: Chacharwadi, Tal- Sanand, Ahmedabad, Gujarat, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
10/10/2022

Nombor Siri
NPRA (R2) 22/129