

PORO[®] SUSPENSION 250MG/5ML (PINEAPPLE FLAVOUR)

Paracetamol (250mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Poro[®] Suspension
2. Bagaimana Poro[®] Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Poro[®] Suspension
4. Cara menggunakan Poro[®] Suspension
5. Semasa menggunakan Poro[®] Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Poro[®] Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Poro[®] Suspension

Poro[®] Suspension digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan yang ringan atau sederhana.

Bagaimana Poro[®] Suspension berfungsi

Poro[®] Suspension mengandungi paracetamol yang mempunyai kesan analgesik untuk mengurangkan kesakitan, dan kesan antipiretik yang dapat menurunkan demam.

Sebelum menggunakan Poro[®] Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Poro[®] Suspension jika anda alah kepada paracetamol atau mana-mana komponen dalam produk ini.

- Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda alah kepada paracetamol atau anda mempunyai masalah kesihatan yang lain. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami penyakit anemia (kekurangan sel darah merah yang sihat), penyakit jantung, paru-paru, buah pinggang atau hati.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan ubat aspirin atau ubat antikoagulan (ubat untuk mencairkan darah atau menghalang pembekuan darah). Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi.

Cara menggunakan Poro[®] Suspension

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak 1 – 5 tahun:

2.5mL – 5mL (1/2 – 1 sudu teh)

Kanak-kanak 6 – 12 tahun:

5mL – 10mL (1 – 2 sudu teh)

Ubat ini boleh digunakan setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan (Maksimum 4 dos dalam 24 jam). Jangan melebihi dos yang ditetapkan.

- Bila perlu digunakan

Poro[®] Suspension perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Ubat ini boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Poro[®] Suspension seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jikalau demam berterusan melebihi 3 hari atau keadaan berulang, atau kalau kesakitan berterusan untuk lebih daripada 5 hari, sila jumpa doktor dengan segera.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos Poro[®] Suspension, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa,

kecuali dinasihati oleh ahli profesional kesihatan.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan lebih banyak paracetamol daripada yang sepatutnya (terlebih dos):

Nasihat perubatan segera perlu dicari sekiranya berlaku terlebih dos, walaupun anda atau anak anda kelihatan sihat. Ini kerana terlalu banyak paracetamol boleh menyebabkan kerosakan hati yang tertangguh dan serius. Telefon doktor anda atau pergi ke bahagian kemalangan dan kecemasan terdekat anda dengan segera. Mungkin tiada simptom dalam 24 jam pertama walaupun pucat, loya (rasa sakit), berpeluh, muntah (sakit), hilang selera makan dan sakit perut mungkin berlaku.

Semasa menggunakan Poro[®] Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda apabila anda sedang mengambil Poro[®] Suspension.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi Poro[®] Suspension kepada orang lain walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

AMARAN

Ubat ini mengandungi
PARACETAMOL.

Jangan mengambil ubat lain yang
mengandungi paracetamol pada
masa yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk.

PORO[®] SUSPENSION 250MG/5ML (PINEAPPLE FLAVOUR)

Paracetamol (250mg/5mL)

Gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Jika tindak balas terhadap ubat ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Jikalau demam berterusan melebihi 3 hari atau keadaan berulang, atau kalau kesakitan berterusan untuk lebih daripada 5 hari, sila jumpa doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan paracetamol adalah ringan, walau bagaimanapun paras darah yang tidak normal pernah dilaporkan.

Reaksi alahan kulit termasuk kemerahan pada kulit, angioedema (pembengkakan lapisan kulit dalam yang disebabkan oleh pengumpulan cecair), Steven-Johnson Syndrome (penyakit kulit dimanifestasi dengan ruam sakit yang merebak dan melepuh) atau Toxic Epidermal Necrolysis (penyakit kulit dimanifestasi dengan kemerahan dan kulit melecet yang mungkin merebak ke mata, mulut dan kemaluan).

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Poro[®] Suspension

- Penyimpanan

Simpan dalam bekas yang kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C. Elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Poro[®] Suspension perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau apabila ubat ini telah melepasi tarikh luput.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Ampaian berwarna kuning, perisa nanas.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:
Paracetamol

Bahan tidak aktif:
Glycerin, Citric Acid, Quinoline Yellow, Pineapple Flavour, Sodium Saccharin, Carboxymethylcellulose Sodium, Colloidal Silicon Dioxide, Sugar, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Tween, Sodium Citrate & Purified Water.

- Nombor MAL:

MAL22106025XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

22/05/2025

Nombor Siri

NPRA(R2)22/079