

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

Ciprofloxacin 250mg, 500mg, 750mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET
2. Bagaimana CIFLOX[®] FILM COATED TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET
4. Cara menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET
5. Semasa menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Nombor MAL
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET digunakan untuk rawatan infeksi yang diakibatkan oleh strain mikroorganisma yang disenaraikan dalam insert produk. Sila rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Bagaimana CIFLOX[®] FILM COATED TABLET berfungsi

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET ialah antibiotik kumpulan fluoroquinolone yang membunuh bakteria dengan menghalangi aktiviti dua jenis enzim bakteria. Enzim ini merupakan bahan yang utama untuk pertumbuhan dan replikasi bakteria.

Sebelum menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh mengambil ubat ini jika anda alergik terhadap bahan kandungan atau ubat kombinasi lain yang mengandungi kandungan ubat ini. Jangan ambil CIFLOX[®] FILM COATED TABLET bersama-sama dengan ubat yang mengandungi tizanidine, antacids, probenecid,

methotrexate, theophylline, warfarin, ropinirole dan clozapine.

- Sebelum mula menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

Beritahu doktor jika anda alergik terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Beritahu pakar perkhidmatan kesihatan anda jika anda mempunyai pembesaran atau tonjolan saluran darah besar (aneurisma aorta atau aneurisma periferifal saluran besar).

Beritahu pakar perkhidmatan kesihatan anda jika anda pernah mengalami episod pembedahan aorta (koyak di dinding aorta).

Beritahu pakar perkhidmatan kesihatan anda jika anda mempunyai sejarah keluarga mengenai aneurisma aorta atau pembedahan aorta atau faktor risiko lain atau keadaan predisposisi (contohnya, Gangguan tisu penghubungan seperti sindrom Marfan, atau sindrom vaskular Ehlers-Danlons, atau gangguan vaskular seperti arteritis Takayasu, arteritis sel gergasi, penyakit Behcet, tekanan darah tinggi, atau aterosklerosis yang diketahui).

Anda tidak boleh mengambil ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk CIFLOX[®] FILM COATED TABLET, jika anda pernah mengalami reaksi buruk yang serius ketika mengambil fluoroquinolone (sila rujuk Perkara yang perlu diberi perhatian dan Kesan-kesan sampingan). Dalam keadaan ini, anda harus memberitahu pakar perkhidmatan kesihatan anda secepat mungkin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET bersama dengan ubat yang lain seperti tizanidine, antacids, suplemen mineral, warfarin

dan lain-lain, akan mengakibatkan kesan-kesan yang tidak dikehendaki. Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat.

Cara menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET boleh diambil dari 250mg sehingga 750mg dua kali sehari ataupun sekali sehari bergantung kepada keadaan. Sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi untuk maklumat lanjut.

- Bila perlu digunakan

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET seharusnya diambil tanpa dikunyah dengan minuman, tidak bergantung dengan waktu makan. CIFLOX[®] FILM COATED TABLET disyorkan diambil dengan perut kosong untuk meningkatkan penyerapan. CIFLOX[®] FILM COATED TABLET tidak boleh diambil bersama produk tenusu atau jus buah-buahan yang diperkaya dengan mineral. Walaubagaimanapun, pengambilan pemakanan kalsium sebagai sebahagian daripada hidangan utama makanan tidak menjejaskan penyerapan ciprofloxacin.

- Berapa lama perlu digunakan

Biasanya, CIFLOX[®] FILM COATED TABLET diambil selama 7-14 hari (kecuali untuk kes akut gonorrhoea yang tidak mempunyai ciri-ciri komplikasi dan cystitis bergantung kepada tahap komplikasi penyakit tersebut dan ciri-ciri klinikal serta tahap bakteriologiikal jangkitan tersebut). Rawatan antibiotik biasanya akan diteruskan untuk sekurang-kurangnya 3 hari selepas demam sudah surut atau kehilangan tanda-tanda jangkitan bakteria.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua,

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

Ciprofloxacin 250mg, 500mg, 750mg

jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos sekali gus.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang yang lain mengambil terlebih dos CIFLOX[®] FILM COATED TABLET.

Semasa menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi CIFLOX[®] FILM COATED TABLET kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian harus diberikan semasa pengambilan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET di kalangan pesakit golongan kanak-kanak, pesakit sawan, pesakit yang mengalami sejarah penyakit saraf dan pesakit yang mengalami kesan sejarah alergic terhadap ciprofloxacin dan pesakit yang mempunyai masalah dengan ubatan yang memerlukan metabolisme oleh organ hati.

Sekiranya anda tiba-tiba mengalami sakit teruk di perut, dada atau belakang anda, segera pergi ke jabatan kecemasan.

Kesan sampingan serius yang berpanjangan, melumpuhkan dan berpotensi tidak dapat dipulihkan: Ubat antibakteria fluoroquinolone, termasuk CIFLOX[®] FILM COATED TABLET, telah dikaitkan dengan kesan sampingan yang sangat jarang tetapi serius, beberapa di antaranya berpanjangan (berterusan bulan atau

tahun), melumpuhkan atau berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Berhenti mengambil antibiotik fluoroquinolone dan segera hubungi pembekal penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai tanda-tanda kesan sampingan berikut:

- Tendon sakit atau bengkak, sering bermula di pergelangan kaki atau betis. Sekiranya ini berlaku, rehatlah yang menyakitkan sehingga anda dapat berjumpa dengan pakar perkhidmatan kesihatan anda.
- Sakit pada sendi anda atau bengkak di bahu, lengan atau kaki anda.
- Kesakitan atau sensasi yang luar biasa (seperti pin dan jarum berterusan, kesemutan, menggelitik, kebas atau terbakar), kelemahan pada badan anda, terutama pada kaki atau lengan, atau kesukaran berjalan.
- Keletihan teruk, kemurungan, kegelisahan, masalah dengan ingatan anda, atau masalah tidur yang teruk.
- Perubahan pada penglihatan, rasa, bau atau pendengaran anda.

Beritahu pakar penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai salah satu kesan di atas semasa atau tidak lama selepas mengambil fluoroquinolone ini bermakna anda harus menjauhinya pada masa depan. Anda dan pakar perkhidmatan kesihatan anda akan memutuskan untuk meneruskan rawatan dengan mempertimbangkan juga antibiotik dari kelas lain.

Tendonitis dan pecah tendon:

Kesakitan dan pembengkakan pada sendi dan keradangan atau pecah tendon jarang berlaku. Risiko anda meningkat jika anda berumur (di atas 60 tahun ke atas), telah menjalani pemindahan organ, mengalami masalah buah pinggang atau jika anda dirawat dengan kortikosteroid. Keradangan dan pecah tendon

mungkin berlaku dalam 48 jam pertama rawatan dan bahkan hingga beberapa bulan setelah menghentikan terapi CIFLOX[®] FILM COATED TABLET. Pada tanda pertama kesakitan atau keradangan tendon (contohnya di pergelangan kaki, pergelangan tangan, siki, bahu atau lutut), berhenti mengambil CIFLOX[®] FILM COATED TABLET, hubungi pakar penjagaan kesihatan anda dan berehat kawasan yang menyakitkan. Elakkan senaman yang tidak perlu kerana ini dapat meningkatkan risiko pecah tendon.

Neuropati periferai:

Anda mungkin jarang mengalami gejala kerosakan saraf (neuropati) seperti sakit, terbakar, kesemutan, kebas dan/ atau kelemahan terutama pada kaki dan/ atau tangan dengan lengan. Sekiranya ini berlaku, hentikan pengambilan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET dan maklumkan segera kepada pakar perkhidmatan kesihatan anda untuk mengelakkan perkembangan keadaan yang berpotensi tidak dapat dipulihkan.

Anda mungkin mengalami masalah kesihatan mental semasa mengambil/menggunakan antibiotik fluoroquinolone, termasuk CIFLOX[®] FILM COATED TABLET buat kali pertama. Dalam kes yang sangat jarang berlaku kemurungan atau masalah kesihatan mental telah membawa kepada pemikiran untuk membunuh diri dan tingkah laku yang mencederakan diri sendiri seperti percubaan membunuh diri. Jika anda mengalami reaksi sedemikian, hentikan mengambil/menggunakan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET dan maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan seperti cirit-birit, rasa

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

Ciprofloxacin 250mg, 500mg, 750mg

pening, sakit kepala, tiada selera, loya dan muntah. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk sebarang pernyataan.

Fluoroquinolones telah dilaporkan menyebabkan kesan sampingan yang serius yang melibatkan tendon, otot, sendi, dan saraf- dalam sebilangan kecil pesakit, kesan sampingan ini menyebabkan kecacatan berpanjangan atau kekal (sila rujuk bahagian Sebelum anda mula menggunakannya atau Perkara yang perlu diberi perhatian).

Jarang: Kemurungan (berpotensi membawa kepada pemikiran bunuh diri, percubaan bunuh diri, atau bunuh diri), atau halusinasi.

Sangat jarang: Reaksi psikotik yang berpotensi membawa kepada pemikiran bunuh diri, percubaan bunuh diri atau bunuh diri.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada keadaan panas dan lembap.

- Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh sila tanya doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- 250mg: Tablet bulat berwarna putih dengan huruf “Y” pada satu permukaan dan garis pada permukaan yang lain.
- 500mg: Tablet berbentuk bujur dan berwarna putih.
- 750mg: Tablet berbentuk bujur berwarna putih dengan huruf “YSP” pada satu permukaan dan nombor “750” pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ciprofloxacin hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Lactose

Starch

Sodium Starch Glycolate

Magnesium Stearate

Opadry II White

Purified Water

- Nombor MAL:

CIFLOX[®] FILM COATED TABLET

- 250mg: MAL13085048AZ
- 500mg: MAL13085047AZ
- 750mg: MAL13085049AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/01/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/2)241212/1389