

EDYFIL FILM COATED TABLET

Sildenafil (100mg, 50mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan EDYFIL FILM COATED TABLET.
2. Bagaimana EDYFIL FILM COATED TABLET berfungsi.
3. Sebelum menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET.
4. Cara menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET.
5. Semasa menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET.
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan EDYFIL FILM COATED TABLET.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan EDYFIL FILM COATED TABLET

EDYFIL FILM COATED TABLET merawat masalah mati pucuk, yang mana kegagalan untuk mencapai ataupun mengekalkan ketegangan zakar yang mencukupi untuk aktiviti seksual.

Bagaimana EDYFIL FILM COATED TABLET berfungsi

Sildenafil meningkatkan kesan Nitrik oksida (NO) dengan merencat enzim phosphodiesterase jenis 5 (PDE5) yang bertanggungjawab untuk penghasilan cGMP di corpus cavernosum. Peningkatan paras cGMP di corpus cavernosum akan menyebabkan otot licin mengendur dan pengaliran darah ke corpus cavernosum berlaku lalu menyebabkan penegangan zakar.

Sebelum menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET

-Bila tidak boleh menggunakan

EDYFIL FILM COATED TABLET tidak boleh diambil jika anda alah terhadap sebarang bahan kandungannya seperti yang tersenarai pada akhir risalah ini. Sila elakkan mengambil ubat ini jika anda sedang menggunakan sebarang keluaran Nitrik oksida, nitrat atau nitrik organik.

-Sebelum menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET

Beritahu doktor, jika anda alergic terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat mungkin terjejas oleh EDYFIL FILM COATED TABLET, atau boleh menjejaskan bagaimana ia berfungsi. Ini termasuk:

- *Cimetidine* (digunakan untuk merawat ulser).
- Ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat termasuk *ketoconazole* atau *itraconazole*
- Ubat yang digunakan untuk merawat HIV termasuk ritonavir.
- *Doxazosin* atau ubat-ubatan *alpha blocker* yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi atau masalah prostat.
- *Amlodipine* (ubat untuk merawat tekanan darah tinggi).

Cara menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET

-Berapa banyak harus digunakan

Dos cadangan adalah 50mg diambil apabila perlu, sekurang-kurangnya 1 jam sebelum aktiviti seksual. Dos maksimum sehari adalah 100mg sehari. Sila ambil ubat ini mengikut arahan doktor.

-Bila perlu digunakan

EDYFIL FILM COATED TABLET perlu diambil mengikut masa yang dinasihatkan oleh doktor.

-Berapa lama perlu digunakan

EDYFIL FILM COATED TABLET perlu diambil mengikut preskripsi doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor anda atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakannya. Anda tidak boleh mengambil EDYFIL FILM COATED TABLET lebih daripada sekali sehari.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sila dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda rasa, anda atau orang lain telah mengambil dos EDYFIL FILM COATED TABLET yang berlebihan.

Semasa menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET

-Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati dengan pengambilan alkohol semasa menggunakan EDYFIL FILM COATED TABLET. Alkohol boleh menjejaskan keupayaan untuk ereksi untuk sementara waktu. Elakkan minum alkohol dalam kuantiti yang banyak sebelum aktiviti seksual.

Jika anda rasa pening, merasa penat atau tidak sihat semasa pengambilan EDYFIL FILM COATED TABLET, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

EDYFIL FILM COATED TABLET tidak menjamin perlindungan daripada penyakit kelamin seperti jangkitan HIV. Langkah-langkah perlindungan perlu diambil seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan umumnya adalah sementara dan ringan. Kesan sampingan mungkin berlaku dengan peningkatan dos yang diambil. Kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan adalah sakit kepala dan kemerah-merahan. Kesan sampingan lain yang biasa dilaporkan adalah pening, penglihatan kabur atau sensitif terhadap cahaya, penglihatan sementara yang tidak normal terhadap warna, jantung berdebar, rinitis dan ketidakcernaan. Kesan sampingan lain yang mungkin berlaku termasuk hipersensitiviti seperti ruam kulit, denyutan jantung yang laju dan tidak normal, tekanan darah rendah, hilang kesedaran, pendarahan hidung, muntah, sakit mata, mata merah, dan ereksi yang berpanjangan dan menyakitkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan keadaan lembap.

-Pelupusan

Sila rujuk ahli farmasi mengenai langkah yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi atau yang telah melepasi tarikh luput. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Edyfil Film Coated Tablet 100mg:

Tablet berbentuk elip yang bewarna biru, sebelah dicetak dengan "E10" dan sebelah lagi dicetak dengan garisan.



Edyfil Film Coated Tablet 50mg:

Tablet berbentuk elip yang bewarna biru, sebelah dicetak dengan "E5" dan sebelah lagi dicetak dengan garisan.



-Bahan-bahan kandungan

-Bahan Aktif:

Sildenafil Citrate

-Bahan tidak Aktif:

Microcrystalline Cellulose

Croscarmellose Sodium

Dicalcium Phosphate

Magnesium Stearate

Hydroxypropyl Cellulose

Opadry Blue

-Nombor MAL

Edyfil Film Coated Tablet 100mg -
MAL16125030AZ

Edyfil Film Coated Tablet 50mg -
MAL16125031AZ

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3, 5, 7, 12 & 14, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/07/2026

Serial number

NPRA(R2/1)240314/1225