

AA-ISDN 10mg Tab

Isosorbide Dinitrate

Apa kandungan risalah ini

Risalah ini mengandungi jawapan untuk sesetengah persoalan yang biasa ditanya tentang AA-ISDN. Bagaimanapun ia tidak mengandungi semua maklumat tentang AA-ISDN.

Ia juga tidak boleh mengambil alih tugas doktor atau ahli farmasi anda.

Semua ubat-ubatan mempunyai risiko dan manfaatnya sendiri. Doktor anda akan menentukan risiko tentang AA-ISDN keatas manfaatnya yang akan membawa kepada anda

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan mengenai pengambilan ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Sila simpan risalah ini bersama-sama dengan ubat ini.

Anda mungkin perlu membacanya semula.

Apa kegunaan ubat ini

AA-ISDN adalah ubat preskripsi yang mengandungi bahan aktif isosorbide dinitrate. AA-ISDN bertindak melegakan sakit jantung iskemia yang dikaitkan dengan usaha angina kronik.

Bagaimana ubat ini berfungsi

Bahan aktif AA-ISDN adalah dinitrate isosorbide berasal dari keluarga nitrat. Ia berfungsi dengan mengurangkan permintaan jumlah bekalan oksigen miokardial, justeru itu mengurangkan beban jantung memperolehi nafas udara.

Sebelum penggunaan

Bila anda tidak dibenarkan ambil

Jika anda alah kepada sama ada dinitrate isosorbide atau mana-mana bahan-bahan kandungan ubat ini..

Sebelum mula pengambilan

Pengambilan ubat-ubatan lain

Sebelum mengambil AA-ISDN, doktor anda perlu tahu:

- Kemungkinan anda mengalami sebarang keadaan perubatan lain, terutamanya jika terdapat sebarang penyakit jantung yang terlibat;
- Berapa banyak jumlah alkohol anda mengambil, atau jika anda seorang perokok;
- Sama ada anda merancang untuk hamil, sedang hamil atau menyusui bayi;
- Jika anda terdapat sebarang alahan berkenaan dengan isonitrate atau nitrat lain.
- Mana-mana preskripsi lain atau over-the-kaunter ubat yang anda sedang mengambil, khususnya Avanafil, Sildenafil, Tadalafil atau Vardenafil.

Bagaimana untuk ambil

Jangan kunyah tablet apabila mengambil, tapi telan seluruh tablet dengan air. Bagi tablet Sublingual, ia tidak perlu dikunyah, dihancurkan, atau ditelan, kerana tablet jenis ini berfungsi dengan lebih cepat apabila diserap melalui mulut. Letakkan tablet bawah lidah dan biarkan ia dibubuh di sana. Jangan makan, minum, asap, atau menggunakan chewing tobacco ketika tablet dilarutkan.

Berapa banyak untuk diambil

Julat dos yang disyorkan adalah dari 5mg kepada 30mg, 4 kali sehari dan diselaraskan mengikut terapeutik dan tindak balas keberkesanan. Doktor anda mungkin menukar dos kerana terdapat pelbagai perbezaan antara pesakit dan sensitiviti terhadap isosorbide dinitrate.

Bila untuk diambil

AA-ISDN perlu diambil mengikut arahan doktor atau berdasarkan kepada label yang disertakan bersama dengan ubat ini.

Berapa lama untuk diambil

Jangan menambah atau mengurangkan jumlah AA-ISDN anda, atau kepada mereka yang dibawa jagaan anda jika anda seorang penjaga melainkan jika diberitahu oleh doktor anda dan jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berunding dengan doktor anda terlebih dahulu.

Jika anda terlupa untuk ambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat kembali kecuali jika sudah hampir tiba masa untuk dos yang seterusnya. Dalam keadaan sedemikian, terus mengambil dos yang berikutnya mengikut jadual waktu. Jangan gandakan dos ubat ini.

Jika anda ambil terlalu banyak (terlebih dos)

Gejala yang mungkin muncul termasuk: curahan, sakit kepala, loya, pening. Hubungi doktor anda atau jabatan kecemasan pada hospital terdekat walaupun anda mungkin tidak berasa sakit.

Dalam masa penggunaan

Perkara yang harus dilakukan

Jika anda mengambil ubat ini untuk jangka masa yang panjang, ia adalah sangat penting bahawa doktor anda memeriksa kemajuan anda pada lawatan tetap untuk memastikan bahawa ubat ini berfungsi dengan betul. Ujian darah mungkin diperlukan untuk memeriksa jika terdapatnya kesan yang tidak diinginkan.

Perkara yang dilarang

JANGAN mengambil alkohol apabila menggunakan ubat ini.

Perkara yang perlu berhati-hati

Ubat ini boleh menyebabkan sakit kepala. Elakkan diri dari tugas yang berpotensi merbahaya, seperti memandu kereta atau mengendalikan mesin yang berbahaya, sehingga anda pasti bahawa ubat ini tidak menjejaskan kecerdasan mental anda atau koordinasi fizikal.

Jangan cuba untuk mengambil Sildenafil, Tadalafil atau Vardenafil, atau mengambil alkohol tanpa kebenaran doktor, ini adalah kerana ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang rumit.

Jenis nitrat ini digunakan untuk mengurangkan jumlah serangan angina dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ia tidak akan melegakan serangan yang telah pun bermula kerana ia berfungsi terlalu perlahan.

Ia adalah sangat penting bahawa anda TIDAK berhenti mengambil ubat ini tanpa terlebih dahulu berunding dengan doktor anda.

Kesan sampingan

Anda mungkin mengalami beberapa kesan sampingan seperti:

Sakit kepala. Ini adalah kesan sampingan yang paling biasa. Walau bagaimanapun, kekerapan sakit kepala akan berkurangan dengan terapi yang berterusan

tanpa gangguan. Anda mungkin mempertimbangkan meminta doktor anda jika ubat ini boleh diambil bersama dengan makanan kerana ini boleh mengurangkan keterukan sakit kepala.

Flushing, perasaan lemah atau episod pening fana juga boleh berlaku sekali-sekala.

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang teruk atau luar biasa, (muntah berterusan, loya, kegelisahan contohnya), peluhan dan roboh atau jika anda mengalami reaksi alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Selepas menggunakan ubat ini

Penyimpanan

Anda diingatkan supaya menyimpan AA-ISDN dan semua ubat-ubatan dengan selamat jauh dari kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas bulan dan tahun yang ditulis seperti di bekas EXP (tarikh luput).

Simpan AA-ISDN pada suhu 30°C.

Pembuangan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan lebih tablet yang tinggal jika anda dibertitahu oleh doktor anda memberitahu untuk berhenti mengambilnya, atau ubat ini telah melepasi tarikh luputnya

Perihal Produk

Bagaimana rupa ubat ini?

Tablet 5mg berwarna merah jambu, berbentuk bulat, rata permukaan, tepi tablet serong, ukiran 5 di satu belah, dan kosong disebelah.

10 mg tablet adalah putih, bulat, serong tepi dan rata sebelah, lain cembung. Garis terukir lebih 10 pada sisi rata, sisi cembung kosong.

Bahan Kandungan

Tablet 5mg mengandungi dinitrate isosorbide dan bahan-bahan bukan perubatan seperti berikut: laktosa monohydrate,

microcrystalline selulosa, croscarmellose sodium, magnesium stearat, Silikon Dioxida Kollodial, D&C Aluminium Lake 30%.

Tablet 10mg mengandungi dinitrate isosorbide dan bahan-bahan bukan perubatan seperti berikut: laktosa monohydrate, microcrystalline selulosa, croscarmellose sodium, magnesium stearat.

Nombor Pendaftaran Malaysia

AA-ISDN 10mg tab
(MAL19984739ACRZ)

Pengilang

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston Toronto Ontario
M9L 1T9 Canada

Pemegang Hak kuasa Pemasaran

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya

Tarikh semakan

27 Jul 2023

Nombor Siri

NPRA(R2/2)221206/993