

AA-PERPHENAZINE TABLET

Perphenazine (4mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan AA-Perphenazine
2. Bagaimana AA-Perphenazine berfungsi
3. Sebelum menggunakan AA-Perphenazine
4. Cara menggunakan AA-Perphenazine
5. Semasa menggunakan AA-Perphenazine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AA-Perphenazine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apa kegunaan AA-Perphenazine

AA-Perphenazine digunakan untuk rawatan gejala gangguan psikotik terutamanya untuk menenangkan individu yang mempunyai psikotik hiperaktif atau mudah teruja. Ubat ini boleh merawat gangguan tingkah laku dan juga boleh berfungsi sebagai pencegahan atau melegakan loya dan muntah-muntah yang disebabkan oleh terapi kanser.

Bagaimana AA-Perphenazine berfungsi

AA-Perphenazine adalah ubat preskripsi yang mengandungi bahan aktif, perphenazine. Ia berfungsi dengan mengekalkan jumlah bahan semula jadi tertentu di dalam otak, membantu menurunkan keterujaan yang tidak normal di dalam otak.

Sebelum menggunakan AA-Perphenazine

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah kepada perphenazine, atau mana-mana kandungan ubat ini.
- Jika anda mengambil ubat yang mengantuk.
- Jika anda mengalami gangguan penyakit sel darah atau kerosakan hati.

- Sebelum menggunakan AA-Perphenazine

Sebelum anda mula mengambil AA-Perphenazine, doktor anda perlu tahu:

- Apa-apa masalah perubatan lain yang anda mungkin mengalami termasuk masalah penyalahgunaan alkohol, penyakit jantung dan saluran darah, sakit dada.
- Sama ada anda merancang untuk hamil, sedang hamil atau menyusui bayi;
- Jika anda mempunyai sejarah sawan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain, jika anda mengambilnya baru-baru ini, atau jika anda mula mengambil ubat baru, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi.
- Opiates, barbiturates (sedatif)
- Atropine (rawatan keracunan racun serangga)
- Guanethidine (ubat tekanan darah tinggi)
- Epinephrine (rawatan alahan yang mengancam nyawa)

Cara menggunakan AA-Perphenazine

- Berapa banyak harus digunakan

Mengawal hiperaktif/keterujaan: Jumlah Dos harian yang disyorkan kepada individu yang mampu berjalan dengan biasa tidak melebihi 6 tablet. Bergantung kepada situasi, doktor anda mungkin memberi anda

dos lebih daripada 6 tablet setiap hari buat sementara waktu, terutamanya pada peringkat awal.

Untuk kawalan keadaan akut, suntikan akan diberi setiap 6 jam, tetapi terapi oral harus dimulakan serta-merta.

Jangan sekali-kali menambah atau mengurangkan dos AA-Perphenazine anda, atau kepada mereka dibawah jagaan anda melainkan jika diarah oleh doktor anda.

Kawalan loya dan muntah:

Dos harian 2 hingga 6 tablet boleh diberikan dalam jumlah yang dibahagikan. Kanak-kanak: Dos orang dewasa yang lebih rendah boleh diberikan kepada kanak-kanak lebih daripada umur 12 tahun. Dos untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun belum ditentukan.

- Bila perlu digunakan

AA-Perphenazine perlu diambil mengikut arahan doktor atau label ubat ini. Tablet perlu ditelan bersama air tanpa mengunyahnya.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda juga diingatkan bahawa jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat, melainkan jika ia sudah hampir masa untuk dos seterusnya seperti yang telah dijadualkan. Dalam keadaan seperti ini, abaikan dos yang terlepas. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala-gejala terlebih dos:

- Mengantuk, pening

AA-PERPHENAZINE TABLET

Perphenazine (4mg)

- Sentakan otot
- Pergerakan berulang atau memutar
- Leher senget
- Geletar
- Pengeluaran air liur
- Masalah menelan
- Gangguan pada cara anda berjalan

Hubungi doktor anda atau hospital jabatan kecemasan terdekat walaupun anda tidak merasa sebarang kesakitan atau ketidakselesaian.

Semasa menggunakan AA-Perphenazine

- Perkara yang perlu dilakukan
Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan AA-Perphenazine.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi AA-Perphenazine dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandangkan penggunaan AA-Perphenazine akan menyebabkan rasa mengantuk, anda perlu berhati-hati semasa memandu atau beroperasi mesin berbahaya. Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak dijangka.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan mengambil perphenazine mungkin berbeza daripada individu ke individu. Sesetengah kesan sampingan lebih cenderung terhadap seseorang yang mempunyai sesetengah masalah perubatan. Misalnya, individu dengan penyakit jantung atau ketumbuhan kelenjar adrenal mungkin mengalami tekanan darah rendah yang teruk berikutan dos perphenazine yang disyorkan.

Kesan-kesan sampingan yang mungkin dihadapi ialah:

- Reaksi tingkah laku
Mengantuk, agitasi, teruja, susah tidur, bermimpi aneh, menerukkan gejala psikotik; dan kekeliruan
- Gejala Extrapyramidal
Ketegangan, wajar tanpa ekspresi, geletar, air liuh meleleh, mengheret kaki, susah menelan, *tardive dyskinesia* (menjelir lidah, mengembungkan pipi, mengerutkan bibir, mengunyah)
- Sistem saraf autonomi
Mulut kering, pengsan, hidung sumbat, takut cahaya, penglihatan kabur, anak mata mengecil
- Gastrosus
Berubah selera makan, kerengsaan gastrik, sembelit, loya, muntah-muntah.
- Sistem endokrin
Nafsu seks berubah, haid tidak teratur, ujian kehamilan positif palsu, ejakulasi tertangguh, pembesaran dada di kalangan lelaki, penambahan berat badan
- Kulit
Gatal-gatal, ruam, lidah bengkak, bengkak bawah kulit, keradangan

kulit, warna pigmen kulit tidak normal.

- Kesan kardiovaskular
Penurunan tekanan darah, denyutan jantung cepat, perubahan pada ujian ECG.
- Reaksi alahan
Demam, asma,
- Hati
Jaundis (Kekuningan kulit dan mata putih)
- Gangguan kencing
Pengekalan air kencing, air kencing yang tidak terkawal.
- Neuroleptic Malignant Syndrome
Demam tinggi, ketegangan otot, gangguan mental, nadi dan tekanan darah tidak tetap

Jika anda mengalami ketidakselesaian lain apabila mengambil ubat ini, beritahu doktor anda secepat mungkin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

- Penyimpanan
Jauhkan dari capaian kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak di bekas.

Simpan AA-Perphenazine di bawah suhu 30° C.

- Pelupusan
Sekiranya anda masih mempunyai baki lebihan ubat ini selepas berhenti mengambillannya atas arahan doktor

AA-PERPHENAZINE TABLET

Perphenazine (4mg)

atau ubat ini telah melepasi tarikh luputnya, sila rujuk kepada ahli farmasi untuk langkah seterusnya yang perlu diambil.

Nombor Siri

NPRA(R4/1)120820/00117

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, bentuk bulat dwicembung, bersalut filem, terukir 4 pada satu permukaan dan kosong pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif: Perphenazine

Bahan tidak aktif: Magnesium Stearate, Lactose Monohydrate, Microcrystalline Cellulose, Starch, Hydroxypropyl Methylcellulose, Polyethylene Glycol, Titanium Dioxide, Purified Water, Carnauba Wax.

- Nombor MAL

AA-Perphenazine 4mg Tablet
MAL19984737ACRZ

Pengilang

Apotex Incorporated,
150 Signet Drive, Weston,
Ontario, Canada
M9L 1T9

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP

6/9/2024