

APO-Carvedilol 6.25mg and 25mg Tablets

Carvedilol

Apa kandungan risalah ini

1. Apakah kegunaan Apo-Carvedilol
2. Bagaimana Apo-Carvedilol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Apo-Carvedilol
4. Cara menggunakan Apo-Carvedilol
5. Semasa menggunakan Apo-Carvedilol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Carvedilol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apa kegunaan ubat ini

APO-CARVEDILOL digunakan untuk merendahkan hipertensi (tekanan darah tinggi), merawat sakit dada (angina) dan merawat kegagalan jantung.

Bagaimana ubat ini berfungsi

APO-CARVEDILOL tergolong dalam kelas ubat-ubat yang dipanggil “beta-blockers/alpha blockers”. Ubat ini bertindak dengan menyekat aktiviti sesetengah bahan kimia (hormon) pada bahagian jantung dan saluran darah dan mempengaruhi kadar degupan jantung dan kadar kerja jantung.

Sebelum penggunaan***Bila anda tidak dibenarkan ambil***

Anda tidak boleh mengambil ubat ini sekiranya anda sedang hamil atau bercadang untuk hamil melainkan diberi kebenaran oleh doktor anda.

Jangan gunakan APO-CARVEDILOL jika anda alergic dengannya atau sebarang komponen dalam formulasinya (lihat senarai komponen pada bahagian terakhir seksyen ini). Jika anda berasa kurang sihat selepas mengambil ubat ini, maklumkan doktor anda dengan segera.

Sebelum mula pengambilan

Beritahu Doktor Anda

- Tentang semua kondisi perubatan anda, termasuklah masalah pada jantung, buah pinggang atau organ hati yang lepas-lepas, asma atau kesulitan pernafasan;
- Jika anda sedang menghidap penyakit kencing manis, masalah tiroid, fenomena Raynaud (kesejukan/kekejangan otot pada bahagian tangan atau kaki) atau kekejangan pada bahagian kaki semasa bersenam;
- Jika anda menghidap atau pernah mendapat psoriasis (tompok bersisik kemerahan pada bahagian kulit);
- Jika anda berjumpa doktor lain selain doktor jantung anda untuk merawat penyakit lain, sila beritahu doktor tersebut bahawa anda sedang mengambil APO-CARVEDILOL;
- Jika anda sedang hamil atau bercadang untuk hamil, atau sedang menyusukan anak.

Pengambilan ubat-ubatan lain

Beritahu Doktor Anda

- Sebarang ubat-ubatan (dengan perskripsi atau tidak) yang anda sedang ambil, terutamanya anti-hipertensif, digoksin, insulin, hipoglisemik, ubat-ubatan untuk perut, “tricyclic antidepressants”, clonidine dan rifampin;
- Jika anda mengubah jumlah mana-mana ubat lain yang sedang anda ambil;

Bagaimana untuk ambil***Berapa banyak untuk diambil***

Anda ditekankan supaya mengambil APO-CARVEDILOL mengikut arahan doktor anda dengan tepat. Doktor anda akan menentukan berapa tablet yang perlu anda ambil setiap hari, bila dan juga berapa lama. Doktor anda mungkin perlu menambah atau mengurangkan jumlah dos anda.

Anda perlu menelan tablet ubat dengan air. Jangan kunyah atau pecahkan tablet ini.

Bila untuk diambil

Ambil tablet ini pada masa yang sama setiap hari. Anda perlu mengambil APO-CARVEDILOL bersama makanan.

Berapa lama untuk diambil

JANGAN hentikan pengambilan APO-CARVEDILOL tanpa merujuk kepada doktor anda terlebih dahulu.

Jika anda lupa untuk ambil

Jika anda terlupa satu dos, ambilnya sebaik sahaja anda teringat semula. Jika boleh, ambil dos seterusnya pada waktu yang ditetapkan, tetapi jangan ambil 2 dos dalam selang masa kurang daripada 6 jam.

Jika anda terlupa lebih daripada 2 dos, hubungi doktor anda untuk arahan selanjutnya. Jangan mulakan semula pengambilan APO-CARVEDILOL sebelum menjumpai doktor anda.

Jika anda ambil terlalu banyak (terlebih dos)

Jika anda ada mengambil ubat ini lebih daripada apa yang disyorkan, hubungi doktor anda atau bahagian kecemasan pada hospital yang berdekatan serta-merta. Tunjukkan botol ubat ini kepada dan ubat-ubat lain yang sedang anda ambil kepada doktor anda.

Dalam masa penggunaan***Perkara yang harus dilakukan***

Tiada

Perkara yang dilarang

Tiada

Perkara yang perlu berhati-hati

Jika anda mengalami pening-pening atau kelesuan dalam pengambilan ubat ini, jangan memandu atau kemudi sebarang peralatan mesin.

Anda perlu lebih berhati-hati pada awal pengambilan atau perubahan pengambilan dos APO-CARVEDILOL.

APO-CARVEDILOL tidak boleh diambil dengan minuman alkohol.

APO-Carvedilol 6.25mg and 25mg Tablets

Carvedilol

Kesan sampingan

Sesetengah pesakit boleh mendapat kesan sampingan yang tidak diingini daripada pengambilan APO-CARVEDILOL. Pening-pening, sakit kepala, dan keletihan adalah salah satu daripada kesan sampingan yang paling biasa dan paling kerap didapati pada awal penggunaan atau perubahan dos APO-CARVEDILOL. Simptom-simptom ini selalunya akan hilang selepas pengambilan yang berterusan. Jika tidak, malah menjadi bertambah teruk, sila maklumkan kepada doktor anda. Kesan sampingan lain adalah masalah berkenaan perut seperti cirit-birit, sembelit, mual dan muntah-muntah, reaksi alergi seperti ruam dan panas atau gatal-gatal pada kulit, sakit pada bahagian tepi badan, kerap membuang air kecil, masalah pernafasan seperti semput, sesak nafas dan hidung tersumbat, murung, masalah tidur, mulut kering, kadar degupan jantung yang perlahan, pening-pening ketika berdiri, pengsan, sejuk pada tangan dan kaki, bengkak pada bahagian badan, pertambahan berat badan, mati pucuk, penglihatan kabur, kekejangan ketika bersenam. Jika anda menghidap fenomena Raynaud (kesejukan pada tangan atau kaki beserta perubahan dalam warna) dan peningkatan simptom kesejukan/kekejangan otot mungkin berlaku. Psoriasis (kulit bersisik) may mungkin berlaku jika anda sudah mempunyai psoriasis, ia mungkin menjadi lebih teruk. Jika anda mempunyai kencing manis anda mungkin menjadi kurang peka terhadap simptom hipoglisemia. Anda perlu menjaga kadar glukos dalam darah dengan teliti. Beritahu doktor anda jika anda menyedari sebarang perubahan yang nyata. Jika anda memakai kanta lekap, anda boleh mengalami kekeringan pada mata sepanjang pengambilan ubat ini.

Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan yang luarbiasa, maklumkan kepada doktor anda dengan segera, terutamanya jika anda mendapat pening kepala, bengkak pada buku lali, keletihan atau sesak nafas selepas dos anda dinaikkan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my [Public-> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan**Penyimpanan**

Anda diingatkan supaya menyimpan APO-CARVEDILOL dan semua ubat-ubat lain jauh daripada kanak-kanak. Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada bekas ini. Simpan APO-CARVEDILOL bawah 30°C).

Pelupusan

Sekiranya anda masih mempunyai lebihan ubat ini selepas anda hentikan pengambilannya atas arahan doktor atau kerana anda dapati ubat ini telah melepasi tarikh luputnya, sila rujuk kepada ahli farmasi anda tentang langkah yang perlu diambil.

Perihal Produk**Bagaimana rupa ubat ini**

APO-CARVEDILOL 6.25mg: Setiap satunya berbentuk bujur, berwarna putih, bersalut saput dan berukir perkataan 'APO' pada satu permukaan dan '6.25' pada permukaan yang lain. Ubat ini mengandungi 6.25 mg carvedilol.

Terdapat di dalam botol berisi 30 tablet.

APO-CARVEDILOL 25mg: Setiap satunya berbentuk bujur, berwarna putih, bersalut saput, dan berukir 'APO' pada satu permukaan dan 'C25' pada permukaan yang lain. Ubat ini mengandungi 25 mg carvedilol. Terdapat dalam botol berisi 30 tablet.

Bahan Kandungan

APO-CARVEDILOL (carvedilol) terdapat dalam bentuk 6.25 mg dan 25 mg tablet bujur putih. Carvedilol ialah bahannya yang aktif. Bahan bukan ubat lain ialah: laktos monohidrat, mikrokristalline selulosa, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hidroksiethyl selulosa, polyethylene glycol dan titanium dioksida.

Nombor Pendaftaran Malaysia

Apo-Carvedilol 6.25mg tab (MAL 06111374ARZ)

Apo-Carvedilol 25mg tab (MAL 06111375ARZ)

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston Toronto Ontario
M9L 1T9 Canada

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya

Tarikh Semakan

10th Dec 2018