

APO-MOMETASONE FUROATE AQUEOUS NASAL SPRAY 50MCG/METERED SPRAY

Mometasone Furoate (50 µg/spray)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Apo-Mometasone
2. Bagaimana Apo-Mometasone berfungsi
3. Sebelum menggunakan Apo-Mometasone
4. Cara menggunakan Apo-Mometasone
5. Semasa menggunakan Apo-Mometasone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Mometasone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Apo-Mometasone

Apo-Mometasone digunakan untuk keadaan berikut:

- Rawatan gejala rinitis bermusim (sepanjang tahun) dan rinitis perenial (keradangan pada lapisan dalam hidung)
- Rawatan polip hidung (ketumbuhan yang lembut dan tidak mendatangkan kesakitan pada lapisan dalam saluran hidung)
- Rawatan rinosinusitis akut (keradangan pada saluran hidung)
- Pencegahan simptom rinitis alergi bermusim (keradangan pada lapisan dalam hidung disebabkan oleh simptom alergi)

Bagaimana Apo-Mometasone berfungsi

Apo-Mometasone tergolong dalam kumpulan kortikosteroid. Ia berfungsi dengan mengurangkan keradangan pada kawasan yang terjejas, melegakan simptom masalah yang dinyatakan di atas.

Sebelum menggunakan Apo-Mometasone

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna produk ini jika anda:

- alah kepada mometasone furoate, atau kepada sebarang isi kandungan

dalam ubat ini. (sila rujuk kepada **Maklumat Lanjut**)

- mempunyai jangkitan dalam hidung yang belum dirawat
- dalam situasi di mana hidung anda baru menjalani operasi atau mempunyai sebarang kecederaan
- dikesan mempunyai tuberkulosis
- mempunyai jangkitan seperti jangkitan kulat, bakteria, jangkitan viral sistemik atau *herpes simplex*.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Apo-Mometasone jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Apo-Mometasone jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Sebelum anda mula menggunakan Apo-Mometasone, doktor anda perlu tahu jika anda mempunyai sebarang keadaan perubatan lain, terutamanya yang disebutkan di atas (Rujuk apabila anda tidak perlu menggunakannya).

- Jika mengambil ubat-ubat lain


Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat-ubatan boleh menyebabkan komplikasi apabila diambil bersama-sama dengan Apo-mometasone, termasuk CYP3A inhibitors, produk yang mengandungi cobicistat.


Cara menggunakan Apo-Mometasone

- Cara mengguna


1. Bukakan penutup botol.



2. Bagi penggunaan penyembur untuk kali pertama, 'sediakan botol terlebih dahulu dengan menekan ke arah bawah pada bahu aplikator menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, dan disokong dengan ibu jari dibahagian bawah botol. Tekan kebawah dan lepaskan pam (10) kali atau sehingga kabus yang halus dihasilkan. Penyembur telah sedia untuk digunakan. Penyembur mungkin akan disimpan lama dan tidak digunakan sehingga 2 minggu. Jika tidak digunakan sehingga lebih 2 minggu, 'sediakan penyembur sebanyak dua (2) kali sehingga kabus halus dihasilkan.




3. Hembus melalui hidung perlahan-lahan untuk membersihkan lubang hidung. Tutup sebelah lubang hidung, tunduk sedikit sambil mengekalkan botol dalam kedudukan menegak, masukkan muncung penyembur ke dalam lubang hidung yang sebelah lagi berhati-hati.




4. Bagi setiap semburan, tekan ke arah bawah pada bahu aplikator menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, dan disokong dengan ibu jari

dibahagian bawah botol. Sembur sambil menarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan menutup mulut.



5. Hembus melalui mulut anda. Ulangi langkah 4 untuk semburan kedua pada lubang hidung yang sama.



6. Ulangi langkah 3 hingga langkah 5 pada lubang hidung yang sebelah lagi.

7. Selepas guna, bersihkan muncung penyembur dengan kain bersih atau tisu dan tutup penyembur dengan penutupnya.

Bersihkan muncung penyembur

Adalah penting untuk membersihkan semburan hidung anda dengan kerap; jika tidak ia mungkin tidak berfungsi dengan betul.

1. Bukakan penutup botol dan keluarkan muncung penyembur dengan perlahan.

2. Bersihkan muncung penyembur dan penutup botol dengan air suam dan bilas di bawah air paip mengalir. **JANGAN SESEKALI MASUKKAN PIN ATAU BENDA YANG TAJAM KE DALAM LUBANG MUNCUNG PENYEMBUR UNTUK KELUARKAN BENDA YANG TERSUMBAT KERANA INI AKAN MEROSAKKAN MUNCUNG PENYEMBUR DAN MENAKIBATKAN ANDA TIDAK DAPAT DOS UBAT YANG TEPAT.**

3. Biarkan kering di tempat yang suam.

4. Pasang balik muncung penyembur pada botol dan tutup penyembur dengan penutupnya. Penyembur hendaklah disediakan sebanyak dua (2) kali sehingga kabus halus dihasilkan apabila pertama kali menggunakannya selepas dibersihkan.

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Bagi rawatan gejala rinitis bermusim (sepanjang tahun) dan rinitis perenial (keradangan pada lapisan dalam hidung); **Dewasa:** Dos biasa yang dicadangkan untuk pencegahan dan rawatan adalah dua semburan (50 mcg/semburan) pada setiap lubang hidung setiap hari (jumlah dos 200 mcg).

Setelah simpoms menjadi terkawal, kurangkan dos kepada satu semburan pada setiap lubang hidung (jumlah dos 100 mcg) untuk penyelenggaraan. **Kanak-kanak antara usia 3 hingga 11 tahun:** Dos yang biasa diberikan ialah satu semburan ke dalam setiap lubang hidung sekali sehari (jumlah dos 100 mcg). Pengambilan kepada kanak-kanak haruslah dibantu oleh orang dewasa.

Bagi rawatan polip hidung (Ketumbuhan yang lembut dan tidak mendatangkan kesakitan pada lapisan dalam saluran hidung), **Dewasa:** Dos biasa yang dicadangkan adalah dua semburan (50 mcg/semburan) pada setiap lubang hidung dua kali sehari (jumlah dos 400 mcg). Setelah simpoms menjadi terkawal, kurangkan dos kepada dua semburan pada setiap lubang hidung setiap hari (jumlah dos 200 mcg) dicadangkan.

Rawatan rinosinusitis akut (keradangan pada saluran hidung), **Dewasa:** Dos biasa yang dicadangkan untuk rinosinusitis akut adalah dua semburan (50 mcg/semburan) pada setiap lubang hidung dua kali sehari (jumlah dos 400 mcg).

Jika tiada perubahan dilihat selepas 15 hari penggunaan dengan pengambilan dua kali sehari, disarankan untuk mendapatkan terapi alternatif. Jika simptom bertambah teruk, hubungi doktor atau farmasi untuk bantuan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Apo-Mometasone

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Apo-Mometasone.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.	• Kerengsaan dalam hidung • Ulser dalam hidung • Kerengsaan dalam tekak	mengandungi 50 mcg <i>Mometasone furoate</i>.
- <u>Perkara yang tidak boleh dilakukan</u>	Lain-lain kesan sampingan yang biasa (jarang) berlaku termasuk:	- <u>Bahan-bahan kandungan</u>
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.		- Bahan aktif Mometasone Furoate
Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.	• Tindakbalas hipersensitif termasuk tindakbalas <i>anaphylactic</i>, bengkak pada permukaan bawah kulit dan kesukaran untuk bernafas.	- Bahan tidak aktif <i>Benzalkonium Chloride Solution, Citric Acid, Glycerin, Microcrystalline Cellulose and Carboxymethyl-cellulose Sodium, Polysorbate 80, Purified Water, Sodium Citrate</i>.
Jangan berkongsi Apo-Mometasone dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.	• Galukoma, peningkatan tekanan di dalam mata, katarak • Luka pada lapisan dalam hidung • Gangguan rasa dan bau	
JANGAN sembur ubatan ini pada mata anda, sembur dalam lubang hidung anda saja.	Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.	- <u>Nombor MAL</u> MAL18016032AZ
Jangan gunakan pin atau benda tajam untuk menusuk hujung botol kerana ini boleh merosakkan hujung botol dan menyebabkan anda tidak mendapat dos ubatan yang betul.		Pengilang Apotex Inc.-Richmond Hill Site 380 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, Ontario, Canada L4C 5H2.
- <u>Perkara yang perlu diberi perhatian</u>	Kamu boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].	Pemegang Pendaftaran Produk Pharmaforte (M) Sdn Bhd, 2, Jalan PJU 3/49, Sunway Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
<u>Memandu dan menggunakan jentera</u>	Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Mometasone	
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.	- <u>Penyimpanan</u>	Tarikh kemaskini RiMUP 2/7/2025
Kesan-kesan sampingan Seperti ubat-ubatan lain, Apo-Mometasone boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.	Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.	Nombor Siri NPRA (R2/1)250701/1497
Kesan-kesan sampingan yang sangat biasa berlaku dengan penggunaan ubat semburan hidung kortikosteroid termasuk:	Simpan bawah 30°C dan lindungi daripada cahaya. Jangan bekukan ubat ini.	
• Hidung berdarah	- <u>Pelupusan</u>	
Kesan sampingan biasa termasuk	Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.	
• Sakit tekak • Sakit kepala • Hidung berdarah • Rasa pedih dalam hidung	Maklumat lanjut	
- <u>Rupa dan warna produk</u>	Apo-Mometasone adalah alat semburan hidung yang memberikan 140 semburan. Setiap semburan memberikan kabus tidak berbau, yang	